

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de marzo de 2026

Según los Avisos Meteorológicos N° 074 y 076, entre el miércoles 04 y el viernes 06 de marzo, se registrarían lluvias, de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, en la selva; mientras que, en la costa continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, acompañada de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde además se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Estas condiciones serían favorables para las variedades de vid para pisco debido a que estimularían la acumulación de azúcares en las bayas o frutos.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en algunas localidades de la costa central, como Pacarán (Lima) y Quinistaquillas (Tacna) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/dec; mientras que en localidades de la selva norte como San Antonio (San Martín) se registrarían lluvias entre 100 y 150 mm/dec. La alta humedad ambiental no sería favorable para conservar el buen estado fitosanitario en los viñedos que estarán más expuestos al ataque de plagas como "filoxera".



Próxima Actualización 13 de marzo de 2026

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento


3° DÉCADA DE FEBRERO DE 2026 (Del 21 al 28)

Durante la tercera década de febrero el desarrollo fenológico de la vid continuó siendo favorable durante las fases reproductivas y de maduración.

En la costa central, en la localidad de Pacarán (Lima) continuó la etapa de foliación o reposo vegetativo, en tanto que, en localidades de la costa sur como Tacama (Ica) continuó la etapa de maduración de la vid variedad Petit Verdot.

En la costa sur, en la localidad de Quinistaquillas (Moquegua) continuó la etapa de fructificación, en tanto que, en localidades como Calana y Calientes (Tacna) continuó la etapa de maduración en las variedades Negra corriente y Barbera, respectivamente.

En todas las localidades, el estado del cultivo fue bueno según los reportes de los observadores fenológicos.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 28 de febrero de 2026; asimismo muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 31,5°C y 21°C; respectivamente. La persistencia de las temperaturas cálidas en la franja costera, en particular en la costa central, fue favorable para la maduración final de la vid de mesa y para pisco.

En la costa sur, las temperaturas promedio fueron 31,5°C y 21,3°C para la máxima y la mínima, respectivamente. La temperatura diurna cálida fue favorable para la etapa de maduración de las variedades para pisco y derivados en las localidades de la costa sur, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

En la selva norte, se presentaron valores de temperatura máxima y mínima de 32,5°C y 21,8°C, respectivamente. La temperatura cálida registrada en algunas localidades de la selva norte baja como San Antonio (San Martín) fue favorable para el desarrollo de la vid regional que es cultivada en la región.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 36,2°C y 18,8°C para la temperatura máxima y mínima, respectivamente. El registro de temperaturas cálidas, en la costa sur, fue favorable para la etapa de maduración de la variedad Petit Verdot para pisco, la conversión de azúcares en los frutos se vio favorecida por la temperatura cálida en la vid para pisco.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	01/09/2025	Foliación	24/12/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2024	Maduración	12/02/2026	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	12/09/2025	Fructificación	02/01/2026	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	04/09/2025	Maduración	21/01/2026	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	01/09/2025	Maduración	07/02/2026	BUENO