

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 12 al 21 de marzo de 2026

Según el Aviso Meteorológico N° 084, entre el domingo 15 y el martes 17 de marzo, se espera el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa sur. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente en horas de la tarde. El incremento de la radiación ultravioleta podría reducir la calidad de los frutos durante la cosecha debido a que podría provocar manchado y ruptura de los frutos durante la maduración.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en algunas localidades de la costa central, como Pacarán (Lima) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/dec. En otras localidades de la franja costera también se registrarían lluvias entre ligeras y moderadas que podrían aumentar los ataques de "filoxera" en los viñedos mal conducidos y con deficiencias en la aplicación de fertilizantes y abonos foliares.



Próxima Actualización 25 de marzo de 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento


1ª DÉCADA DE MARZO DE 2026 (Del 01 al 10)

Durante la primera década de marzo el desarrollo fenológico en el cultivo de vid fue favorable en la franja costera.

En la costa central, en la localidad de Pacarán (Lima) continuó la etapa de foliación o reposo vegetativo, en tanto que, en localidades de la costa sur como Tacama (Ica) continuó la etapa de maduración de la vid variedad Petit Verdot.

En la costa sur, en las localidades de Quinistaquillas (Moquegua), Calana y Calientes (Tacna) se observó la etapa de maduración en las variedades Negra corriente y Barbera. La temperatura cálida y la buena radiación solar fueron favorables para la acumulación de azúcar en los frutos de vid.

En todas las localidades, el estado del cultivo fue bueno según los reportes de los observadores fenológicos.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 10 de marzo de 2026; asimismo muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 30,6°C y 20°C; respectivamente. La temperatura cálida registrada en la costa central y sur fue favorable para la etapa de reposo vegetativo o foliación en los viñedos de la costa central que ya fueron cosechados.

En la costa sur, las temperaturas promedio fueron 31,2°C y 18,6°C para la máxima y la mínima, respectivamente. La disminución de la temperatura diurna habría retrasado ligeramente la etapa de maduración de las variedades para pisco y derivados en las localidades de la costa sur, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

En la selva norte, se presentaron valores de temperatura máxima y mínima de 31,7°C y 22,1°C, respectivamente. La temperatura cálida registrada en algunas localidades de la selva norte baja como San Antonio (San Martín) fue favorable para el desarrollo de la vid regional que es cultivada en la región.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 36,4°C y 15,8°C para la temperatura máxima y mínima, respectivamente. El registro de temperaturas cálidas, en la costa sur, fue favorable para la etapa de maduración de la variedad Petit Verdot para pisco, la conversión de azúcares en los frutos se vio favorecida por la temperatura cálida en las variedades Negra corriente y Quebranta.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	01/09/2025	Foliación	24/12/2025	Bueno
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2024	Maduración	12/02/2026	Bueno
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	12/09/2025	Maduración	22/02/2026	Bueno
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	04/09/2025	Maduración	21/01/2026	Bueno
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	01/09/2025	Maduración	07/02/2026	Bueno