

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 de marzo al 02 de abril de 2026

Según los Avisos Meteorológicos N° 103 y 109, entre el martes 24 y el jueves 26 de marzo, se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva; y entre el jueves 26 y el sábado 28 de marzo continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa, de ligera a moderada acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h; además del aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 32 km/h, principalmente durante la tarde.; el incremento de la velocidad del viento aumentaría la evapotranspiración y la demanda de riego del cultivo; además de mayores reportes de "arañita roja"

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en algunas localidades de la costa central, como Pacarán (Lima) y Quinistaquillas (Moquegua) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec. El incremento de la humedad ambiental y la acumulación en la zona radicular podría provocar pudrición en la zona de raíces, además de limitar el desarrollo del cultivo.



Próxima Actualización 07 de abril de 2026

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Dirección de Agrometeorología
Telf: [511] 614-1413

Consultas y Sugerencias
serviciosagrodinamicos@senamhi.gob.pe

Etapas de crecimiento

2° DÉCADA DE MARZO DE 2026 (Del 11 al 20)

En el desarrollo fenológico de la vid influyó favorablemente la elevación de la temperatura diurna durante la segunda década de marzo.

En algunas localidades de la costa central como Pacarán (Lima) las condiciones atmosféricas no tendrían mayor impacto debido a que los viñedos están en etapa de reposo vegetativo como la variedad Quebranta que se cultiva en esta localidad de la costa central.

En cuanto a lo observado en la costa sur, en el departamento de Moquegua, en la localidad de Quinistaquillas, y en el departamento de Tacna, en las localidades de Calana y Calientes, las condiciones continuaron siendo favorables para la etapa final de maduración.

Según los reportes de los observadores agrometeorológicos el estado del cultivo fue bueno en todas las localidades observadas.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 20 de marzo de 2026; asimismo muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa norte, la vid para mesa se cultiva principalmente en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad; en estos departamentos la temperatura cálida fue favorable para las diversas etapas de desarrollo fenológico de la uva de mesa. La temperatura osciló entre valores de 32,9°C y 23,2°C para la temperatura máxima y mínima, respectivamente; estos valores también fueron favorables para la etapa de maduración.

En la costa central, se registraron valores de temperatura máxima y de temperatura mínima de 29,9°C y 20,2°C, respectivamente. La ligera elevación de la temperatura asociada a vientos fuertes aumentó los requerimientos de riego en variedades de uva para exportación.

En la costa sur, las temperaturas promedio fueron 30,7°C y 19,1°C para la máxima y la mínima, respectivamente. La disminución de la temperatura diurna habría retrasado ligeramente la etapa de maduración de las variedades para pisco y derivados en las localidades de la costa sur, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 35°C y 16,6°C para la temperatura máxima y mínima, respectivamente. El registro de temperaturas cálidas, en la costa sur, fue favorable para la etapa de maduración de la variedad Petit Verdot para pisco, sin embargo, la presencia de días nublados y ligeras precipitaciones podría favorecer mayores reportes de problemas fitosanitarios asociados a la alta humedad ambiental y radicular.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	01/09/2025	Foliación	24/12/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2024	Maduración	12/02/2026	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	12/09/2025	Maduración	22/02/2026	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	04/09/2025	Maduración	21/01/2026	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	01/09/2025	Maduración	07/02/2026	BUENO