VOL II
EDICIÓN XXVII

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID

Pronóstico Agrometeorológico

Del 03 al 12 de octubre de 2023

Según el aviso meteorológico N° 217, entre el viernes 6 al sábado 7 de octubre, continuaría el incremento de la temperatura diurna en la selva de moderada a fuerte intensidad. Además, se esperaría el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40km/h. las precipitaciones ligeras

En la localidad de Magdalena (Cajamarca), se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/dec, mientras que en la localidad de San Antonio (San Martín) se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec, estas condiciones podrían favorecer la incidencia de plagas y enfermedades como prodiplosis y mildiú, respectivamente.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas con el cultivo de vid.



Próxima Actualización 13 de octubre de 2023

Tomar en cuenta

* Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Etapas de crecimiento

3° DÉCADA DE SETIEMBRE DE 2023 (21 al 30)

Se presentaron condiciones favorables para el cultivo de vid durante la tercera década de setiembre.

En la costa central, en la localidad de Tacama (Ica) el cultivo continuó en etapa de foliación o reposo vegetativo, mientras que, en la localidad de Pacarán (Lima) se inició la etapa de aparición del amento.

En la sierra sur, en las localidades de Quinistaquillas (Moquegua) y Calana se observó la etapa de hinchazón de yemas y en la localidad de Calientes (Tacna) se inició la etapa de apertura de yemas; el estado del cultivo fue bueno en todas las localidades de observación.

En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín) continuó en la etapa de foliación. Las condiciones fueron favorables para el rebrote vegetativo del cultivo, reportándose en estado bueno en esta estación de monitoreo fenológico.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 30 de setiembre de 2023;asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima

En la costa sur, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 25,8°C y 15,1°C, respectivamente, y anomalías de precipitación fueron positivas (331,4). Las condiciones térmicas permanecieron cálidas y habrían continuado favorables para el desarrollo del cultivo de vid para pisco debido a la acumulación de grados día.

En la sierra sur occidental se presentó temperaturas máximas y mínimas promedio de 23,3°C y 6,6°C, respectivamente, y se registraron anomalías de precipitación de -4,1%. Estas condiciones meteorológicas provocaron algunos brotes de oidiosis y favorecieron las etapas de apertura e hinchazón de yemas.

En la selva norte, se presentó temperaturas máximas y mínimas promedio de 33,5°C y 20,6°C, respectivamente, y anomalías de precipitación inferiores a lo normal (-75,1%), donde la estación San Antonio (San Martín) presentó condiciones térmicas diurnas y nocturnas cálidas de 33,5°C y 20,6°C, respectivamente, y anomalías de precipitación de -75,1%. Estas condiciones meteorológicas fueron favorables para la etapa de foliación o reposo vegetativo en algunas localidades de la selva norte.

En la localidad de Tacama (Ica), se reportó temperatura máxima y mínima de 31,4°C y 12,2°C, respectivamente. El ligero aumento de la temperatura fue favorable durante la etapa de foliación o reposo vegetativo del cultivo.

Gráfico 1: Régimen de precipitación y temperaturas extremas en CO-Tacama
Cultivo: Vid Petit Verdot
Campaña Agrícola 2023-2024



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	1/01/2004	Aparición del amento	24/09/2023	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	14/03/1905	Foliación	14/03/2023	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	20/04/1992	Hinchazón de yemas	15/09/2023	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	01/07/2018	Apertura de yemas	14/09/2023	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	10/08/1940	Hinchazón de yemas	19/08/2023	BUENO
SAN MARTIN	CO San Antonio	-76.4072	-6.412740	467	VID	Borgoña	15/03/1993	Foliación	09/06/2023	BUENO