

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de noviembre de 2023

Según el aviso meteorológico N° 231, entre el martes 07 y el miércoles 08 de noviembre, se presentaría el incremento de la temperatura diurna en la selva. Además, se esperaría el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía, la ocurrencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Estas condiciones serían favorables para la etapa de maduración en el cultivo de vid criolla en la selva norte.

En la costa central, en la localidad de Pacarán (Lima) se registraría lluvias entre 10 y 25 mm/dec; la probabilidad de precipitaciones en la costa central serían favorables para la etapa de fructificación; en tanto que, en la localidad de San Antonio (San Martín), se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec, estas precipitaciones no tendrían mayor impacto durante la etapa de fructificación en el cultivo de vid.



Próxima Actualización 15 de noviembre de 2023

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

3º DÉCADA DE OCTUBRE DE 2023 (21 al 31)

Durante la tercera década de octubre se presentaron condiciones favorables para el cultivo de vid.

En la costa central, en la localidad de Tacama (Ica) se inició la etapa de aparición del amento, mientras que, en la localidad de Pacarán (Lima) se inició la etapa de fructificación.

En la sierra sur, en la localidad de Quinistaquillas (Moquegua) continuó la etapa de aparición del amento y en las localidades de Calana y Calientes (Tacna) se observó la etapa de floración; el estado del cultivo fue bueno en todas las localidades de observación.

En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín) continuó en la etapa de foliación. Las condiciones fueron favorables para el rebrote vegetativo del cultivo y las condiciones meteorológicas fueron favorables para el cultivo de vid.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 31 de octubre de 2023; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa sur, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 27,1°C y 16,1°C, respectivamente, y anomalías de precipitación fueron negativas (-0,6). El incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de maduración en el cultivo de vid para pisco debido a que el fruto acumuló mayor cantidad de azúcares.

En la sierra sur occidental, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 21,6°C y 6,9°C, respectivamente, y la precipitación estuvo muy por encima de sus valores promedio. Estas condiciones meteorológicas provocaron algunos brotes de oidiosis y favorecieron las etapas de aparición del amento y floración.

En la selva norte, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 32°C y 20,1°C, respectivamente, y anomalías de precipitación inferiores a lo normal (-29,7%), donde la estación San Antonio (San Martín) presentó condiciones térmicas diurnas y nocturnas cálidas de 33,4°C y 20,8°C, respectivamente, y anomalías de precipitación de -20,6%. Estas condiciones no tuvieron mayor impacto en el cultivo de vid y fueron favorables para conservar el buen estado fitosanitario.

En la localidad de Tacama (Ica), se reportó temperatura máxima y mínima de 32°C y 13,8°C, respectivamente. El ligero aumento de la temperatura fue favorable durante la etapa de foliación o reposo vegetativo del cultivo.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	21/09/2023	Fructificación	30/10/2023	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2023	Aparición del amento	19/10/2023	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	07/10/2023	Floración	15/10/2023	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	21/09/2023	Floración	19/10/2023	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	09/09/2023	Aparición del amento	11/10/2023	BUENO
SAN MARTIN	CO San Antonio	-76.4072	-6.412740	467	VID	Borgoña	20/02/2023	Foliación	09/06/2023	BUENO