VOL III
EDICIÓN IV

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID

Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de febrero de 2024

Según los avisos meteorológicos N° 038 y 040, entre el miércoles 14 y el jueves 15 de febrero, continuarían las lluvias de moderada a extrema intensidad en la selva; mientras que entre el jueves 15 y el sábado 17 de febrero, se registraría el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa. Estas condiciones anómalas podrían provocar la caída de frutos durante la etapa de maduración y el retraso de la maduración para las variedades de mesa.

Según el pronóstico decadal, en la costa central y sur, en las localidades de Pacarán (Lima) y Quinistaquillas (Moquegua) se registrarían precipitaciones entre 25 y 50 mm/dec; en tanto que, en la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín) se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec. El aumento de las precipitaciones provocaría mayor incidencia de Prodiplosis en los tallos y brotes de la vid.



Próxima Actualización 23 de febrero de 2024

Tomar en cuenta

* Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Siempre con el pueblo
BICENTENARIO PERÚ 2024

Etapas de crecimiento

1° DÉCADA DE FEBRERO DE 2024 (Del 01 al 10)

El desarrollo fenológico del cultivo de vid fue favorable durante la primera década de febrero.

En la costa central, en la localidad de Tacama (Ica) continuó la etapa de maduración, mientras que en la localidad de Pacarán (Lima) continuó la etapa de reposo vegetativo o foliación.

En la sierra sur, en las localidades de Quinistaquillas (Moquegua) Calientes y Calana (Tacna) continuó la etapa de maduración.

En la selva norte, continuó la etapa de reposo vegetativo o foliación, en la localidad de San Antonio (San Martín). Las condiciones meteorológicas fueron favorables para el desarrollo fenológico del cultivo de vid de mesa y para pisco.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 10 de febrero de 2024; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Siempre con el pueblo
BICENTENARIO PERÚ 2024

Impactos del clima

En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 30,8°C y 21,6°C, respectivamente. La temperatura fue muy superior a sus valores promedio, estas condiciones fueron favorables para la etapa de maduración en la localidad de Tacama (Ica), sin embargo, la sobre exposición de los frutos a temperatura elevada aumenta su deterioro y la pérdida de azúcares.

En la costa sur, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 32°C y 21,1°C, respectivamente y precipitaciones superiores al promedio. El incremento de la temperatura fue favorable para la maduración de los frutos y la acumulación de azúcares para el cultivo de vid en la costa sur.

En la selva norte, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 30,8°C y 20,5°C, respectivamente, y anomalías de precipitación superiores a lo normal; la temperatura media fue similar a la década anterior, sin embargo, las precipitaciones estacionales favorecieron la conservación de la humedad del suelo durante la etapa de reposo vegetativo o foliación en la selva norte.

En la localidad de Tacama (Ica), se reportó temperatura máxima y mínima de 35,4°C y 18,6°C, respectivamente. El incremento de la temperatura diurna fue favorable para la etapa de maduración de variedades para pisco como la variedad Petit Verdot, sin embargo, para evitar la pérdida de azúcares en estas variedades se recomienda colocar bajo sombra la cosecha hasta llevarla a refrigeración.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	21/09/2023	Foliación	28/12/2023	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2023	Maduración	18/01/2024	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	07/10/2023	Maduración	30/12/2023	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	21/09/2023	Maduración	25/12/2023	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	09/09/2023	Maduración	14/01/2023	BUENO
SAN MARTIN	CO San Antonio	-76.4072	-6.412740	467	VID	Borgoña	20/02/2023	Foliación	10/12/2023	BUENO