VOL IV
EDICIÓN XIV

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID

Pronóstico Agrometeorológico

Del 22 al 31 de mayo de 2025

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, continuarían las condiciones de clima seco en la franja costera; estas condiciones además de la disminución de la temperatura en la costa serían los factores condicionantes para el cultivo de vid durante la etapa de foliación o reposo vegetativo del cultivo y podrían ser favorables para algunas labores culturales como la poda y la aplicación de fertilizantes foliares.

En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín) se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec este volumen de precipitaciones estaría dentro de lo esperado para esta temporada del año y sería favorable para conservar la humedad del suelo, realizar la aplicación de fertilizantes y la disminución de la cantidad de agua evapotranspirada por el cultivo.



Próxima Actualización 04 de junio de 2025

Tomar en cuenta

Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Dirección de Agrometeorología
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413
Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi
Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

Etapas de crecimiento

2° DÉCADA DE MAYO DE 2025 (Del 11 al 20)

Durante la segunda década de mayo el desarrollo fenológico fue favorable para el cultivo de vid en etapa de reposo vegetativo en la costa.

En la costa central, en las localidades de Pacarán (Lima) y Tacama (Ica) continuó la etapa de foliación o reposo vegetativo; en las variedades para pisco, la disminución de la temperatura diurna contribuyó a que la vid disminuya su metabolismo hasta entrar en etapa de foliación o reposo vegetativo.

En la sierra sur, en las localidades de Quinistaquillas (Moquegua) y Calana y Calientes (Tacna) los cambios observados en la fenología del cultivo de vid contribuyeron al inicio de la etapa de foliación o reposo vegetativo. Se observaron condiciones similares en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

En la localidad de San Antonio (San Martín) continuó la etapa de aparición de yemas. La temporada de estiaje o disminución de las precipitaciones fue favorable para el cultivo de vid.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas y puntos de observación fenológica.

Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 20 de mayo de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima

En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 25,5°C y 16,2°C, respectivamente. El inicio de la etapa de foliación o reposo vegetativo en la costa central fueron favorables para el cultivo y para la realización de labores de poda y control fitosanitario.

En la costa sur, las temperaturas máximas y mínimas promedio fueron de 26,2°C y 14,8°C, respectivamente. Se observó una mayor disminución se la temperatura nocturna durante la etapa de foliación.

En la selva norte, se registraron valores de temperatura máxima y mínima de 32°C y 21,8°C; estos rangos de temperatura fueron favorables para el brotamiento de las yemas florales en la vid regional.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 31,2°C y 12,2°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. La disminución de la temperatura y la ocurrencia de lluvias localizadas fueron favorables para la etapa de foliación o reposo vegetativo en el cultivo de vid en el valle de Ica.

Gráfico 1: Régimen de precipitación y temperaturas extremas en CO-Tacama
Cultivo: Vid Petit Verdot
Campaña Agrícola 2024 - 2025



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	29/08/2024	Foliación	04/01/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2023	Foliación	28/04/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	06/09/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	06/09/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	28/08/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO
SAN MARTIN	CO San Antonio	-76.4072	-6.412740	467	VID	Borgoña	20/02/2024	Aparición de yemas	03/04/2025	BUENO