

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de junio al 02 de julio de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 216, entre el miércoles 25 y el viernes 27 de junio, se presentaría el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa. Este incremento podría generar eventos aislados de levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se esperaría cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, especialmente en horas nocturnas y por la mañana; acentuando la sensación de frío y el descenso de temperatura, principalmente en distritos cercanos al litoral. Estas condiciones meteorológicas pronosticadas podrían provocar mayores infecciones de filoxera en los viñedos de la costa central y sur, así como, aumentar los reportes de ataques de araña roja en las variedades de vid para mesa en la costa norte.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en la localidad de San Antonio (San Martín) se prevén precipitaciones entre 50 y 75 mm/dec. Estas precipitaciones serían favorables para conservar la humedad en el suelo y favorecerían las etapas de floración y fructificación en el cultivo de uva regional en la selva norte.



Próxima Actualización 03 de julio de 2025

Tomar en cuenta

Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

2ª DÉCADA DE JUNIO DE 2025 (Del 11 al 20)

Durante la segunda década de junio las condiciones de desarrollo fenológico fueron favorables para la etapa de reposo vegetativo o foliación en la costa.

En la costa central, en localidades como Pacarán (Lima) y Tacama (Ica) los viñedos continuaron en reposo vegetativo para variedades de vid como negra corriente y Quebranta.

En la costa sur, no se reportaron mayores problemas durante la etapa de reposo vegetativo en localidades como Quinistaquillas (Moquegua) para la variedad criolla y Calana y Calientes (Tacna) para las variedades Quebranta, Italia y negra corriente.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 20 de junio de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 23,7°C y 16,8°C, respectivamente. La temperatura entre valores normales en la costa central y no tuvieron mayor impacto en las labores de poda y control fitosanitario.

En la costa sur, las temperaturas máximas y mínimas promedio fueron de 24°C y 13,1°C, respectivamente. La ligera disminución de la temperatura fue favorable para la aparición de infecciones causadas por oidiosis.

En la selva norte, se registraron valores de temperatura máxima y mínima de 30,8°C y 21,5°C; las condiciones continuaron siendo favorables para el cultivo de vid.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 27,6°C y 11,6°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. La disminución de la temperatura no tuvo mayor impacto en las condiciones durante la etapa de reposo vegetativo o foliación en los viñedos de la costa durante la segunda década de junio.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	29/08/2024	Foliación	04/01/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2023	Foliación	28/04/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	06/09/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	06/09/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	28/08/2024	Foliación	28/04/2025	BUENO