VOL IV
EDICIÓN XX

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID

Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 de julio al 02 de agosto de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 255, entre el sábado 26 y el domingo 27 de julio, se presentaría el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad, en la costa norte y centro. Este incremento podría generar eventos aislados de levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se esperaría cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, especialmente en horas nocturnas y primeras horas de la mañana; acentuando la sensación de frío y el descenso de la temperatura, principalmente en distritos cercanos al litoral. Las condiciones previstas podrían aumentar las infecciones de plagas y la dispersión de ácaros como "arañita roja"y pulgones entre otros vectores de enfermedades causadas por virus.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, continuarían las condiciones de clima seco en la costa y podrían extenderse hacia la zona andina central y sur. En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín) se prevén precipitaciones entre 25 y 50 mm/dec; la disminución de las precipitaciones, propia de la estación, sería favorable para conservar la humedad del suelo y la renovación de los brotes florales y vegetativos en la costa central y sur.



Próxima Actualización 05 de agosto de 2025

Tomar en cuenta

Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413
Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi
Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

Etapas de crecimiento

2° DÉCADA DE JULIO DE 2025 (Del 11 al 20)

Durante la segunda década de julio, las condiciones de desarrollo fenológico fueron favorables para el cultivo de vid.

En la costa central, en variedades para pisco como Quebranta e Italia las condiciones fenológicas continuaron normales durante la etapa de reposo vegetativo en localidades como Pacarán (Lima) y Tacama (Ica). No se registraron condiciones que alteraran la etapa fenológica.

En la costa sur, las condiciones en localidades como Quinistaquillas (Moquegua) y Calana y Calientes (Tacna) la etapa de reposo vegetativo continuo sin mayores inconvenientes durante la primera década de julio.

En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín), continuó la etapa de fructificación en el cultivo de vid regional.

Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 20 de julio de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima

En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 21,7ºC y 15,2ºC; respectivamente. La ocurrencia de temperaturas inferiores al promedio fue favorable para el reposo vegetativo de las vides en las localidades de la costa central.

En la costa sur, las temperaturas máximas y mínimas promedio tuvieron valores de 22,8ºC y 12,2ºC y fueron favorables para el cultivo de vid. La disminución de la temperatura fue favorable para la acumulación de horas frío (HF) que favorecerá la formación de brotes vegetativos y florales en la vid.

En la selva norte, las temperaturas máximas y mínimas de 29,6ºC y 18,5ºC; respectivamente. Los valores normales para la variable temperatura fueron favorables para la etapa de fructificación en la localidad de San Antonio (San Martín).

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 27,6°C y 6,4°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. La acumulación de horas frío continuó siendo positiva durante la segunda década de julio, estas condiciones fueron favorables durante la etapa de reposo vegetativo de las vides en la costa central.

Gráfico 1: Régimen de precipitación y temperaturas extremas en CO-Tacama
Cultivo: Vid Petit Verdot
Campaña Agrícola 2024 - 2025



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	29/08/2024	Reposo vegetativo	04/01/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2023	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	06/09/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	06/09/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	28/08/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
SAN MARTÍN	CO San Antonio	-76.4072	-6.41274	467	VID	Borgoña	03/04/2025	Fructificación	01/06/2025	BUENO