VOL IV
EDICIÓN XXII

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID

Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de agosto de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 276, entre el jueves 14 y el viernes 15, se registraría un descenso de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la selva, debido al ingreso del décimo noveno friaje del año. Este evento estaría acompañado de cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. La ocurrencia de vientos fuertes podría provocar la caída de frutos en las plantas de vid regional en la selva norte.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, las condiciones de clima seco continuarían en la costa y podrían extenderse hacia la zona andina sur. En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín) se prevén precipitaciones entre 25 y 50 mm/dec; estas condiciones previstas serían favorables para conservar la humedad del suelo durante la etapa de fructificación en el cultivo de vid de mesa.



Próxima Actualización 25 de agosto de 2025

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en lasactividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413
Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi
Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

Etapas de crecimiento

1° DÉCADA DE AGOSTO DE 2025 (Del 01 al 10)

El principal cambio en la fenología para el cultivo de vid se registró en la localidad de San Antonio (San Martín).

En la costa central, la ocurrencia de vientos fuertes durante la semana pasada tuvo influencia en un mayor reporte de enfermedades causadas por la diseminación de insectos por la tormenta de arena (paraca).

En la costa sur, en localidades como Quinistaquillas (Moquegua), Calana y Calientes (Tacna) se presentaron condiciones limitantes para la aplicación de labores agrícolas como la poda y la fertilización debido a la tormenta de arena que afectó la costa central y sur durante la etapa de reposo vegetativo.

En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín), se registró el inicio de la etapa de fructificación en el cultivo de vid regional.

Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 10 de agosto de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima

En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 23,5ºC y 14,5ºC; respectivamente. La temperatura estaría dentro de los valores normales para la estación y sería favorable para el reposo vegetativo en el cultivo de vid en la costa central.

En la costa sur, las temperaturas máximas y mínimas promedio tuvieron valores de 23,1ºC y 14,9ºC, estos valores estuvieron entre el rango de la temperatura favorable para el reposo vegetativo de la vid entre los meses de abril y agosto de acuerdo a lo señalado en la Ficha Técnica Agroclimática (Senamhi, 2021).

En la selva norte, las temperaturas máximas y mínimas de 32,1ºC y 20,8ºC; respectivamente. Los valores normales para la variable temperatura fueron favorables para la etapa de fructificación en la localidad de San Antonio (San Martín).

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 29°C y 7,8°C para la temperatura máxima y mínima, respectivamente. A consecuencia de los vientos fuertes registrados durante los últimos 10 días, se habrían registrado dificultadas para la realización de labores agrícolas en los viñedos de la costa central y sur para las variedades pisqueras.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	Vid	Quebranta	29/08/2024	Reposo vegetativo	04/01/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	Vid	Petit Verdot	07/10/2023	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	Vid	Negra corriente	06/09/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	Vid	Barbera	06/09/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	Vid	Negra corriente	28/08/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
SAN MARTÍN	CO San Antonio	-76.4072	-6.41274	467	Vid	Borgoña	03/04/2025	Maduración	02/08/2025	BUENO