VOL IV
EDICIÓN XXIII

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID

Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de agosto al 02 de setiembre de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 294, entre el lunes 25 y el miércoles 27 de agosto, descendería la temperatura nocturna de moderada a fuerte intensidad en la selva central y sur. Este fenómeno estaría asociado al ingreso del vigésimo friaje del año, el cual afectaría principalmente a estas regiones. Asimismo, se esperarían ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h. Las condiciones meteorológicas previstas podrían provocar mayor incidencia de oidiosis en viñedos de la selva norte para el cultivo de vid regional.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, las condiciones de clima seco continuarían en la costa y podrían extenderse hacia la localidad de San Antonio (San Martín) en la selva norte occidental donde se prevén precipitaciones entre 50 y 75 mm/dec. El volumen de precipitación previsto sería favorable para conservar la humedad necesaria en el suelo para el enraizamiento de las vides.



Próxima Actualización 03 de setiembre de 2025

Tomar en cuenta

Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413
Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi
Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

Etapas de crecimiento

2° DÉCADA DE AGOSTO DE 2025 (Del 11 al 20)

El desarrollo fenológico en el cultivo de vid fue normal para la estación de invierno y estiaje en la selva.

En la costa central, los vientos fuertes o "paracas" que se registraron entre el 23 y 24 de agosto, conforme al Aviso Meteorológico N° 285, habría provocado mayor incidencia de filoxera y arañita roja en los viñedos de la costa central y sur.

En la costa sur, en localidades como Quinistaquillas (Moquegua) y Calana y Calientes (Tacna) la ocurrencia de vientos fuertes habría retrasado labores culturales como podas y fertilizaciones, además de aumentar la evapotranspiración de los viñedos.

En la selva norte, en la localidad de San Antonio (San Martín), continuaron las etapas de fructificación en el cultivo de vid regional.

Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 20 de agosto de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima

En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 23ºC y 14,1ºC; respectivamente. La temperatura estaría dentro de los valores normales para la estación y sería favorable para el reposo vegetativo en el cultivo de vid en la costa central.

En la costa sur, las temperaturas máximas y mínimas promedio tuvieron valores de 23,7ºC y 12ºC, estos valores estuvieron entre el rango de la temperatura favorable para el reposo vegetativo de la vid, la temperatura máxima estuvo por encima de sus valores normales y la temperatura mínima ligeramente superior.

En la selva norte, las temperaturas máximas y mínimas tuvieron valores de 32,4ºC y 18,2ºC, respectivamente. La temperatura máxima y mínima fue superior a los valores normales y fueron favorables para la etapa de fructificación en la localidad de San Antonio (San Martín).

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 29°C y 7,2°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. Los vientos fuertes o "paraca" con arena habrían provocado mayor presencia de filoxera y arañita roja que afectaron los tallos y retrasaron las labores de poda y fertilización.

Gráfico 1: Régimen de precipitación y temperaturas extremas en CO-Tacama
Cultivo: Vid Petit Verdot
Campaña Agrícola 2025 - 2026



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	Vid	Quebranta	29-08-24	Reposo vegetativo	04-01-25	Bueno
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	Vid	Petit Verdot	07-10-23	Reposo vegetativo	28-04-25	Bueno
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	Vid	Negra corriente	06-09-24	Reposo vegetativo	28-04-25	Bueno
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	Vid	Barbera	06-09-24	Reposo vegetativo	28-04-25	Bueno
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	Vid	Negra corriente	28-08-24	Reposo vegetativo	28-04-25	Bueno
SAN MARTÍN	CO San Antonio	-76.4072	-6.41274	467	Vid	Borgoña	03-04-25	Maduración	02-08-25	Bueno