

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de setiembre al 02 de octubre de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 336, entre el martes 23 y el jueves 25 de setiembre, se presentará el incremento de la velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad con velocidades cercanas a los 50 km/h debido al ingreso del vigésimo segundo friaje. Estas condiciones podrían aumentar el estrés hídrico de las vides en localidades de la selva norte como San Antonio (San Martín).

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, se presentaría cielo despejado en la franja costera. Estas condiciones serían favorables para la fase de floración y las etapas de aparición e hinchazón de yemas en localidades de Pacarán (Lima), Tacama (Ica), Quinistaquillas (Moquegua) y Calana y Calientes (Tacna).



Próxima Actualización 03 de octubre de 2025

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Etapas de crecimiento

2º DÉCADA DE SETIEMBRE DE 2025 (Del 11 al 20)

En la segunda década de setiembre se observó la fase de floración en la mayoría de localidades de observación reportadas.

En costa central, en la localidad de Pacarán (Lima) se inició la etapa de apertura de yemas, en tanto que, en la localidad de Tacama (Ica) continuó el reposo vegetativo de las variedades de mesa y para pisco como Quebranta, Torontel e Italia.

De manera similar en costa sur, en localidades como Quinistaquillas (Moquegua) y Calana (Tacna) se inició la etapa de hinchazón de yemas; en tanto que, en la localidad de Calientes (Tacna) se inició la etapa de apertura de yemas.

En todas las localidades, el estado del cultivo fue bueno según los reportes de los observadores fenológicos.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 20 de setiembre de 2025; asimismo muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Impactos del clima




En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 24.6°C y 14.1°C; respectivamente. El ligero incremento de la temperatura diurna fue favorable para la etapa de hinchazón de yemas en la localidad de Pacarán (Lima).

En la costa sur, las temperaturas promedio máxima de 25.1°C y mínima de 12.6°C, respectivamente. El aumento de la temperatura fue favorable para las etapas de apertura de yemas en la localidad de Calientes (Tacna) y para la etapa de hinchazón de yemas en las localidades de Quinistaquillas (Moquegua) y Calana (Tacna).

En la selva norte, la temperatura máxima y mínima entre valores de 27.3°C y 16.8°C, respectivamente. El ligero incremento de la temperatura fue favorable para la etapa de reposo vegetativo en el cultivo de vid regional en la localidad de San Antonio (San Martín).

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 31.6°C y 7.6°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. La elevación de la temperatura aumentó las necesidades de riego en el cultivo de vid de mesa en la costa central, sin embargo, en variedades para pisco estas condiciones retrasaron la emisión de yemas.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	Vid	Quebranta	01/09/2025	Apertura deyemas	14/09/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	Vid	Petit Verdot	07/10/2024	Reposo vegetativo	28/04/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	Vid	Negra corriente	12/09/2025	Hinchazón de yemas	12/09/2025	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	Vid	Barbera	04/09/2025	Hinchazón de yemas	04/09/2025	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	Vid	Negra corriente	01/09/2025	Apertura de yemas	13/09/2025	BUENO
SAN MARTÍN	CO San Antonio	-76.4072	-6.41274	467	Vid	Borgoña	03/04/2025	Maduración	02/08/2025	BUENO