

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN COSTA

Del 26 de agosto al 01 de setiembre del 2025



**Subdirección de Predicción Agrometeorológica -SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM**

**Plantaciones de mango en
fructificación
Motupe - Lambayeque**

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:


Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2I-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PIURA

En la estación San Miguel, se estableció el cultivo de algodón de la variedad IPA el 03-05-2025. El cultivo continuo en la fase de formación de bellota, presentando buen estado. Durante el período, las temperaturas registraron en la máxima 28.44 °C y una mínima de 16.73°C inferiores a la semana previa, favorables para el desarrollo del cultivo.



Algodón en formación de bellota, estación San Miguel


SAN MIGUEL																				
MONITOREO DEL CULTIVO DE ALGODÓN																				
ESTACIÓN SAN MIGUEL VALLE DEL BAJO PIURA: FASES FENOLÓGICAS DE ALGODÓN VAR. IPA																				
ESTACIÓN	variedad	FASES FENOLÓGICAS	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA	
SAN MIGUEL	IPA	EMERGENCIA													32.7	19.9	26.3	0	3.5.2025	
25.4.2025 (siembra)		APARICION DE TERCERA HOJA VERDADERA													32.4	20.2	26.3	0	14.05.2025	
		APARICION DE QUINTA HOJA VERDADERA													31.5	19.3	26.3	0	20.05.2025	
		BOTON FLORAL													30	20.8	25.4	0	4.6.2025	
		FLORACIÓN													30.5	19.3	25.4	0	2.7.2025	
		FORMACIÓN DE BELLOTA													26.5	15.7	24.9	0	9.7.2025	
		APERTURA DE BELLOTA																		
		MADURACIÓN																		



ALGODON

PIURA

En la estación El Partidor, las plantaciones de arroz de la variedad Valor, instaladas el 10/06/2025, se encontraron en elongación del tallo presentado estado bueno, debido a que las condiciones térmicas fluctuaron entre 16.99°C y 29.96°C, que promovieron el crecimiento vegetativo del arrozal.



Cultivo de arroz en elongación del tallo, estación El Partidor

VALLE SAN LORENZO MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ																
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN
PARTIDOR	SAN LORENZO	SIEMBRA													27.8	18.5
variedad VALOR		EMERGENCIA														
		PLANTULA													31.1	18.4
		MACOLLAJE													29.3	17.4
		ELONGACION DEL TALLO													27.2	17.4
		PANOJA														
		DESARROLLO DE PANOJA														
		FLORACIÓN														
		MADURACIÓN LECHOSA														
		MADURACIÓN PASTOSA														
		MADURACIÓN CORNEA														


ARROZ

PIURA

En la zona de monitoreo de Chulucanas, los cultivos de mango Edward continuaron en la fase de fructificación con estado bueno, favorecido por condiciones térmicas de 16.21°C en la mínima y 31.43°C en la máxima. Por otro lado, en la zona de Bigote, los mangos de variedad criollo también continuaron en fructificación con estado bueno, influenciado por las condiciones térmicas presentando buen estado. Sin embargo, algunas plantaciones aún vienen reportando la fase de floración y cuajado.




Plantaciones de mango Edward en fructificación



VALLE ALTO PIURA																				
MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO																				
ESTACIÓN CHULUCANAS: FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO EDWARD																				
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX	T.MIN	T.MED	pp	
CHULUCANAS	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO													25.1.2025	36	17.4	26.7	0	
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES														25.3.2025	36.6	20.4	28.5	0
		FLORACIÓN														29.5.2025	32	18.8	25.4	0
		CUAJADO														18.6.2025	28	16.6	22.3	0.1
		FRUCTIFICACIÓN														16.7.2025	32.6	16.4	24.5	0
		MADURACIÓN																		

VALLE ALTO PIURA																				
MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO																				
ESTACION BIGOTE: FASES FENOLOGICAS DEL MANGO CRIOLLO																				
ESTACION	ZONA	FASES FENOLOGICAS	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX	T.MIN	T.MED	pp	
BIGOTE	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO													21.1.2025					
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES														1.2.2025				
		FLORACION														20.5.2025				
		CUAJADO														17.6.2025				
		FRUCTIFICACION														16.7.2025				
		MADURACION																		





Plantaciones de mango criollo en fructificación



LAMBAYEQUE

En la zona de Jayanca, las temperaturas máximas se registraron por encima de lo normal, mientras que las mínimas se mantuvieron dentro de sus rangos habituales. Asimismo, se reportó ausencia total de precipitaciones. Estas condiciones, especialmente las temperaturas nocturnas, favorecieron la floración del mango Kent para la campaña 2025-2026. Por su parte, en la zona de monitoreo de Pasabar, las plantaciones de mango de la variedad Kent presentaron buen estado sanitario, asociado a temperaturas máximas promedio de 30,2°C y mínimas de 13,9°C.




ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
PASABAR	CASCAJAL	KENT	REPOSO VEGETATIVO													35.4	22.4	184.6	28.9	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													31.3	18.0	22.0	24.7	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													30.5	17.1	1.2	23.8	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													31.1	14.3	0.0	22.7	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																	
			FRUCTIFICACIÓN																	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.

ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
JAYANCA	JAYANCA	KENT	REPOSO VEGETATIVO													35.0	21.8	36.3	28.4	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													29.3	17.9	2.1	23.6	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													28.0	16.8	0.0	22.4	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													28.7	15.7	0.0	22.2	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																	
			FRUCTIFICACIÓN																	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



LAMBAYEQUE

En la estación de Tongorrape, las plantaciones de mango de la variedad Kent se observaron en estado de floración. A lo largo de la semana, se registraron temperaturas promedio de 29.9 °C como máxima y 12.7 °C como mínima.




Cultivo de mango en floración, estación Tongorrape

ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
TONGORRAPE	TONGORRAPE	KENT	REPOSO VEGETATIVO													33.9	21.0	156.4	27.4	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													30.1	17.0	31.4	23.6	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													28.8	15.9	0.1	22.4	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													29.4	13.3	0.0	21.4	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																	
			FRUCTIFICACIÓN																	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.


MANGO

ANCASH

En la estación Buena Vista, las condiciones climáticas continuaron favorables para los cultivos de mango variedad CRIOLLO y ciruelo variedad ROJA que continuaron en fructificación. Durante la semana, las temperaturas registraron en la máxima 24.83°C y en la mínima 14.21°C, valores entre sus normales climáticas que promovieron crecimiento vegetativo y reproductivo.



Mango criollo en fase de fructificación en la estación Buena Vista



Ciruelo en fructificación en la estación Buena Vista

DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA DE CASMA
MONITOREO DEL CULTIVO DEL CIRUELO
ESTACIÓN: BUENA VISTA - FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO (VARIEDAD ROJA).

ESTACIÓN	ZONA	FASES	INICIO	FENOLOGÍA									CLIMA			
				AÑO 2025									T. MÁX	T. MÍN	PP	T. MED
				Ener	Febr	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agost	Sept				
BUENA VISTA	TUSO	ASISTE														
		HECHAZON DE YEMAS	03 de Abril - 07 de Mayo										29.96	18.07	0.70	24.01
		APERTURA DE YEMAS	08 de Mayo - 27 de Mayo										27.03	16.21	0.00	21.62
		BOTÓN FLORAL	28 de Mayo - 31 de Mayo										26.95	16.25	0.00	21.60
		FLORACIÓN	01 de Junio - 22 de Junio										25.17	17.20	0.10	21.19
		FRUCTIFICACIÓN	23 de Junio - A la fecha										25.26	15.13	0.10	20.19
		MADURACIÓN														

DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA DE CASMA
MONITOREO DEL CULTIVO DEL MANGO
ESTACIÓN: BUENA VISTA - FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO (VARIEDAD CRIOLLO).

ESTACIÓN	ZONA	FASES	INICIO	FENOLOGÍA									CLIMA			
				AÑO 2025									T. MÁX	T. MÍN	PP	T. MED
				Ener	Febr	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agost	Sept				
BUENA VISTA	TUSO	ASISTE														
		SPROTAMIENTO	01 de Abril - 12 de Mayo										29.73	17.90	0.70	23.81
		FLORACIÓN	13 de Mayo - 22 de Junio										26.03	16.83	0.10	21.43
		CUAJADO	23 de Junio - 04 de Agosto										25.31	15.48	0.10	20.39
		FRUCTIFICACIÓN	05 de Agosto - A la fecha										25.17	14.54	0.00	19.86
		MADURACIÓN														




MANGO

CIRUELO

ANCASH

En la zona de Huarney, las condiciones climáticas son favorables para el cultivo de alfalfa variedad HORTUS 1001 que continuo en desarrollo vegetativo temprano con estado bueno. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas de 22.11°C y mínimas de 15.23°C, valores sobre sus normales climáticas para su temporada.




Cultivo de alfalfa en desarrollo vegetativo temprano

DISTRITO DE OCROS														
MONITOREO DEL CULTIVO DE ALFALFA														
ESTACIÓN: OCROS _ FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ALFALFA														
ESTACIÓN	ZONA	FASES	FENOLOGIA								CLIMA			
			INICIO	FINAL	AÑO 2025						T. MAX	T. MIN	PP	T.MED
					JUL.	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.				
OCROS	SIERRA	CORTE												
		Emergencia											0.00	
		Brotamiento											0.00	
		Desarrollo Vegetativo Temprano											0.00	
		Desarrollo Vegetativo Medio											0.00	
		Desarrollo Vegetativo Tardío											0.00	
		Boton Floral												
		Floracion												
		Maduración												

PASTOS

LIMA

En la Estación Alcantarilla, el maíz variedad NK-252 se encuentra en la fase de aparición de hojas y presenta buen desarrollo. Este comportamiento se debe a las condiciones térmicas diurnas y nocturnas habituales de la zona, las cuales, junto con el manejo de riegos y fertilización, han contribuido al buen desarrollo de la planta.




Cultivo de maíz en aparición de hojas en la estación Alcantarilla

ESTACIÓN	FASES FENOLÓGICAS	Inicio	Final	Días	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
ALCANTARILLA	EMERGENCIA															
	APARICIÓN DE HOJAS	10/08/2025														
	PANOJA															
	ESPIGA															
	MADURACIÓN LECHOSA															
	MADURACIÓN PASTOSA															
	MADURACIÓN CÓRNEA															

MAIZ

ICA

El cultivo de vid (Tacama) continua en etapa de reposo vegetativo para variedades de piscos y vinos, mientras que para variedades de exportación continuaron en fructificación, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas registraron valores entorno a su climatología, con temperaturas entre 9.7°C a 26.8°C. que favorecen al cultivo.




Cultivo de Vid en reposo vegetativo en la estación Tacama

VALLE DE ICA																						
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID																						
ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLÓGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
LAS VIÑAS	TINGUIÑA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													26.8	9.7	0	18.3	0°C	10°C	0° - 10°C.	
		HINCHAZON DE YEMAS																		5°C	15°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS																		10°C	20°C	15° - 20°C.
		APARICION DEL AMENTO																		20°C	25°C	18° - 25°C.
		FLORACION																		15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION																		18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACIÓN																		20°C	35°C	25° - 30°C.

VID

ICA

En la estación Huamani, el cultivo de palto variedad FUERTE continuo en floración con desarrollo bueno, debido a las condiciones térmicas diurnas entre sus normales, con temperaturas de 24.4°C que favorecen al desarrollo del cultivo, como también los riegos oportunos que benefician la humedad del suelo logrando así una mejor polinización y cuajado.



Palto en floración la estación Huamani


VALLE DE LOS MOLINOS MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTA ESTACIÓN HUAMANI: FASES FENOLÓGICAS DE PALTA FUERTE																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc.Alta	T.Optima	
HUAMANI	LOS MOLINOS CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													24.6	9.9	0.0	17.25	10°C	35°C	15°C a 25°C	
		FOLIACIÓN													24.4	10.1	0.0	17.25	15°C	35°C	20°C a 28°C	
		FLORACION													24.4	9.1	0.0	16.75	15°C	30°C	22°C a 28°C	
		FRUCTIFICACION																		15°C	30°C	22°C a 28°C
		MADURACION																		15°C	30°C	22°C a 28°C



PALTO

ICA

El cultivo de ciruelo var. Roja en la estación Rio Grande (Ica) continuo en la fase de floración, las condiciones térmicas diurnas cálidas y nocturnas frías a su normal son óptimas para el cultivo. Con rangos de temperaturas que oscilan entre los 10.4°C a 28.1°C.



Cultivo de ciruelo en floración


VALLE DE RIO GRANDE																						
MONITOREO DEL CULTIVO CIRUELO																						
ESTACIÓN RIO GRANDE: FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc.Alta	T.Optima	
RIO GRANDE	PALPA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													29.8	13.6	0.0	21.7	0°C	10°C	0° - 10°C.	
		HINCHAZON DE YEMAS														28.9	11.0	0.0	20.0	5°C	20°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS														28.8	9.8	0.0	19.3	10°C	25°C	15° - 20°C.
		BOTO FLORAL														29.0	9.8	0.0	19.4	12°C	28°C	18° - 22°C.
		FLORACION														28.1	10.4	0.0	19.3	15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION																		18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACION																		20°C	35°C	25° - 30°C.



CIRUELO

AREQUIPA

En la estación Camaná, el cultivo de frijol de la variedad Canario se encontro en cosecha, registrando un rendimiento de 1,500 kg/ha. Las temperaturas máximas y mínimas se mantuvieron dentro de los rangos normales, lo que favoreció el desarrollo adecuado de las actividades de recolección.



Frijol en cosecha

VALLE DE CAMANA MONITOREO DEL CULTIVO DE FRIJOL ESTACIÓN CO CAMANA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE FRIJOL CANARIO PRECOZ Siembra: 16/04/2025 Cosecha: 29/08/2025 Producción: 1,500 kg/ha.																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
CO CAMANA	VALLE DE CAMANA	EMEGENCIA	22/04/25	07/05/25											24.0	15.5	0.0	19.8	10.0	39	30.0
		HOJAS PRIMARIAS	08/05/25	13/05/25											23.3	17.1	0.0	19.8			
		PRIMERA HOJA TRIFOLIADA	14/05/25	21/05/25											23.1	16.5	0.0	20.2			
		TERCERA HOJA TRIFOLIADA	22/05/25	08/06/25											22.5	16.0	0.0	19.8			
		BOTÓN FLORAL	09/06/25	16/06/25											21.3	15.6	9.0	19.3			
		FLORACION	17/06/25	30/06/25											20.3	15.1	9.4	18.4			
		FORMACION DE VAINAS	01/07/25	22/07/25											21.2	15.5	0.0	17.7			
		LLENADO DE VAINAS	23/07/25	31/07/25											20.1	15.4	0.0	18.4			
		MADURACIÓN	01/08/25												19.9	15.1	0.9	17.8			




FRIJOL

AREQUIPA

En La Joya se instaló el cultivo de maíz variedad amiláceo (trasplante el 14/07/2025), continuo en la fase de aparición de hojas con estado bueno y el cultivo de cebollas var. Americana en maduración inicial. En el periodo las temperaturas tanto diurnas como nocturnas estuvieron más frías de lo habitual. Condiciones ambientales ralentizan el crecimiento del maíz.



Cebolla en aparición de hojas estación La Joya



Cebolla en maduración en la estación La Joya

IRRIGACIÓN LA JOYA - SAN ISIDRO																					
MONITOREO DEL CULTIVO DE MAÍZ																					
ESTACIÓN MAP LA JOYA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO																					
Siembra: 14/07/2025.																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	T. Máx	T. Min.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
HUASACACHE	SIERRA MEDIA	EMERGENCIA																			
		APARICIÓN DE HOJAS	26/07/25												26.3	7.7	0.0	17.0			
		PANOJA																			
		ESPIGA																			
		MADURACIÓN LECHOSA																			
		MADURACIÓN PASTOSA																			
		MADURACIÓN Córnea																			


IRRIGACIÓN LA JOYA - SAN ISIDRO																					
MONITOREO DEL CULTIVO DE CEBOLLA																					
ESTACIÓN MAP LA JOYA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE CEBOLLA VARIEDAD ROJA AREQUIPEÑA																					
Trasplante: 08/04/2025																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
MAP LA JOYA	IRRIGACIÓN	APARICIÓN DE HOJAS	10/04/25	20/07/25											26.9	9.9	0.5	18.4	5.0	30.0	
		FORMACIÓN DE BULBO	21/07/25	17/08/25											27.7	8.1	0.0	17.9			
		MADURACIÓN INICIAL	18/08/25												24.8	7.0	0.0	15.9			
		MADURACIÓN COMPLETA																			

MAIZ

CEBOLLA

TACNA

En la zona La Yarada, las condiciones climáticas continuaron favorables para las plantaciones de olivo variedad SEVILLANA que continuo en la aparición de racimos florales con estado bueno. Durante el periodo, las temperaturas diurnas registraron 19.6°C y nocturnas de 14.2°C favorables para el avance de la campaña del olivar. La temperatura mínima con anomalía positiva, favoreció la persistencia de la plaga *Orthezia olivícola*, afectando un 10 % de infección, especialmente en las hojas.



Cultivo de olivo en aparición de racimos florales en la estación La Yarada

MONITOREO OLIVO ZONA DE PRODUCCIÓN LA YARADA																						
ESTACIÓN	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TERMICO		
	FASES	INICIO	FINAL	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	TMáx	Tmín	Pp.	Tmed.	TC-Baja	TC-Alta	T. Óptima
CP LA YARADA VARIEDAD SEVILLANA Cosecha maduración completa: 1ra. cosecha 19-26/05/25 Rdto. : 1,000 kg/ha. 2da. cosecha 23/06/25-02/07/25 Rdto. : 808 kg/ha 3ra. cosecha 04/08/25-31/08/25 Rdto. : Evaluación	INDUCCION FLORAL (03 DIAS)	01/08/2025	03/08/2025													20.2	14.2	0.0	17.2	12	25	15 - 18
	DIFERENCIACION FLORAL (04 DIAS)	04/08/2025	07/08/2025													20.1	14.4	0.0	17.3	12	25	14 - 18
	APARICION RACIMOS FLORALES (24 DIAS)	08/08/2025	31/08/2025													20.1	13.9	1.5	17.0	12	25	14 - 18
	HINCHAZON BOTON FLORAL																			12	25	14 - 18
	FLORACION																			15	30	23 - 25
	FRUCTIFICACION																			20	32	25 - 30
	MADURACION EN VERDE CLARO																			20	32	25 - 30
	MADURACION COMPLETA																			20	32	25 - 30
	REPOSO VEGETATIVO																			0	13	10 - 12