

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN COSTA

Del 16 al 22 de setiembre del 2025



**Subdirección de Predicción Agrometeorológica -SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM**

**Plantaciones de mango en
fructificación
Motupe - Lambayeque**

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:


Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2I-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PIURA

En la estación San Miguel, se estableció el cultivo de algodón de la variedad IPA el 03 de mayo de 2025. El cultivo se encontró en apertura de bellotas, presentando buen estado. Durante el periodo, las temperaturas registraron en la máxima 30.91 °C y una mínima de 17.46°C, favorables para el desarrollo del cultivo.



Algodón en apertura de bellota, estación San Miguel

SAN MIGUEL
MONITOREO DEL CULTIVO DE ALGODÓN

ESTACIÓN SAN MIGUEL VALLE DEL BAJO PIURA: FASES FENOLÓGICAS DE ALGODÓN VAR. IPA


ESTACIÓN	variedad	FASES FENOLÓGICAS	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA
SAN MIGUEL	IPA	EMERGENCIA													32.7	19.9	26.3	0	3.5.2025
25.4.2025 (siembra)		APARICION DE TERCERA HOJA VERDADERA													32.4	20.2	26.3	0	14.05.2025
		APARICION DE QUINTA HOJA VERDADERA													31.5	19.3	26.3	0	20.05.2025
		BOTON FLORAL													30	20.8	25.4	0	4.6.2025
		FLORACIÓN													30.5	19.3	25.4	0	2.7.2025
		FORMACIÓN DE BELLOTA													26.5	15.7	24.9	0	9.7.2025
		APERTURA DE BELLOTA													30.5	17.3	21.1	0	15.9.2025
		MADURACIÓN																	



ALGODON

PIURA

En la estación El Partidor, las plantaciones de arroz de la variedad Valor, instaladas el 10 de junio de 2025, se encontraron en panoja presentado estado bueno, debido a que se realizaron labores de riego; además, las condiciones térmicas fluctuaron entre 17.37°C y 32.9°C, que promovieron el crecimiento vegetativo del arrozal.



Cultivo de arroz en panoja, estación El Partidor

VALLE SAN LORENZO MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ																				
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA	
PARTIDOR	SAN LORENZO	SIEMBRA													27.8	18.5	23.15	0.005	10.6.2025	
variedad VALOR		EMERGENCIA																		
		PLANTULA													31.1	18.4	24.75	0	1.7.2025	
		MACOLLAJE													29.3	17.4	23.35	0	2.08.2025	
		ELONGACION DEL TALLO													33.2	17	25.1	0	7.9.2025	
		PANOJA													31.8	17.2	24.5	0	11.9.2025	
		DESARROLLO DE PANOJA																		
		FLORACIÓN																		
		MADURACIÓN LECHOSA																		
		MADURACIÓN PASTOSA																		
		MADURACIÓN CORNEA																		


ARROZ

PIURA

En la zona de monitoreo de Chulucanas, los cultivos de mango Edward continuaron en fructificación con estado bueno, favorecido por condiciones térmicas de 16.06°C en la mínima y 34.5°C en la máxima. Por otro lado, en la zona de Bigote, los mangos de variedad criollo, continuaron en fructificación con estado bueno, influenciado por las condiciones térmicas presentado buen estado. Asimismo, para las variedades Kent (retraso en su floración), estas condiciones estarían promoviendo la inducción floral.



Plantaciones de mango Edward en fructificación



VALLE ALTO PIURA																				
MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO																				
ESTACIÓN BIGOTE: FASES FENOLOGICAS DEL MANGO CRIOLLO																				
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLOGICAS	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX	T.MIN	T.MED	pp	
BIGOTE	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO													21.1.2025					
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES														1.2.2025				
		FLORACIÓN														20.5.2025				
		CUAJADO														17.6.2025				
		FRUCTIFICACIÓN														16.7.2025				
		MADURACIÓN																		



MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO																					
ESTACIÓN CHULUCANAS: FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO EDWARD																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX	T.MIN	T.MED	pp		
CHULUCANAS	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO														25.1.2025	36	17.4	26.7	0	
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES															25.3.2025	36.6	20.4	28.5	0
		FLORACIÓN															29.5.2025	32	18.8	25.4	0
		CUAJADO															18.6.2025	28	16.6	22.3	0.1
		FRUCTIFICACIÓN															16.7.2025	32.6	16.4	24.5	0
		MADURACIÓN																			



Plantaciones de mango criollo en fructificación


LAMBAYEQUE

En la zona de Pasabar, las temperaturas máximas y las mínimas se encontraron entre sus normales. Por otro lado, en la zona de Jayanca, las temperaturas máximas estuvieron por encima de lo normal, mientras que las mínimas se mantuvieron dentro de sus valores habituales. Estas condiciones climáticas nocturnas están favoreciendo la floración del mango Kent para la campaña 2025-2026. Sin embargo, las plantaciones continúan presentando una floración irregular y retrasada.



ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
PASABAR	CASCAJAL	KENT	REPOSO VEGETATIVO													35.4	22.4	184.6	28.9	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													31.3	18.0	22.0	24.7	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													30.5	17.1	1.2	23.8	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													32.4	15.1	0.2	23.7	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																	
			FRUCTIFICACIÓN																	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.

ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
JAYANCA	JAYANCA	KENT	REPOSO VEGETATIVO													35.0	21.8	36.3	28.4	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													29.3	17.9	2.1	23.6	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													28.0	16.8	0.0	22.4	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													30.0	16.1	0.0	23.1	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																	
			FRUCTIFICACIÓN																	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.




Fuente: okdiario.com

MANGO

LAMBAYEQUE

En la estación de Tongorrape, las plantaciones de mango de la variedad Kent se observaron en fase floración con estado bueno. En la semana, se registraron temperaturas promedio de 32.3 °C como máxima y 15.2 °C como mínima. Sin embargo, continúan evidenciado una floración irregular y retrasada para su temporada.



Cultivo de mango en floración, estación Tongorrape


ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
TONGORRAPE	TONGORRAPE	KENT	REPOSO VEGETATIVO													33.9	21.0	156.4	27.4	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													30.1	17.0	31.4	23.6	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													28.8	15.9	0.1	22.4	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													30.5	13.8	0.0	22.1	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																	
			FRUCTIFICACIÓN																	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



MANGO

LAMBAYEQUE

En la estación Puchaca, ubicada en el valle del río La Leche, las condiciones térmicas se han mantenido dentro de los valores habituales para la temporada, con temperaturas máximas de 29.1 °C y mínimas de 15.5°C. Estas condiciones favorecieron el desarrollo del cultivo de arroz, variedad La Puntilla, el cual presentó un estado general bueno. Adicionalmente, se realizaron riegos oportunos que contribuyeron al adecuado crecimiento del cultivo.



Cultivo de arroz en plántula, estación Puchaca

ARROZ



ESTACIÓN	CAMPAÑA 2025-2026				FENOLOGÍA		CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO *		
	VARIEDAD	SIEMBRA	TRASPLANTE	COSECHA	FASES	INICIO	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TC-Baja	TC-Alta	T.Óptima
PUCHACA	La Puntilla	3/08/2025	12/09/2025		EMERGENCIA	7/08/2025	27.1	15.2	0.0	21.2	16	33	25 - 31
					PLÁNTULA	17/08/2025	27.8	15.0	0.0	21.4			
					MACOLLAJE								
					ELONGACIÓN DEL TALLO						15		
					INICIO DE PANOJA								
					DESARROLLO DE PANOJA						20	38	
					FLORACIÓN						22	35	30 - 33
					MADURACIÓN LECHOSA						18	30	20 - 25
					MADURACIÓN PASTOSA								
					MADURACIÓN CÓRNEA								

ANCASH

En la estación Buena Vista, las condiciones climáticas continuaron favorables para los cultivos de mango variedad CRIOLLO y ciruelo variedad ROJA que continuaron en fructificación. Durante la semana, las temperaturas registraron en la máxima 27.40°C (entre sus normales) y en la mínima 14.22°C (ligeramente cálidas) que, aunados a riegos oportunos promovieron crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo.



Ciruelo en fructificación en la estación Buena Vista



Mango criollo en fase de fructificación en la estación Buena Vista


DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA CASMA																
MONITOREO DEL CULTIVO DEL MANGO																
ESTACIÓN: BUENA VISTA _ FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO (VARIEDAD CRIOLLO).																
ESTACIÓN	ZONA	FASES	INICIO	FENOLOGIA							CLIMA					
				AÑO 2025							T. MAX	T. MIN	PP	T.MED		
BUENA VISTA	USUD	AGOSTE														
		BROTAMIENTO	01 de Abril - 12 de Mayo										29.73	17.90	0.70	23.81
		FLORACIÓN	13 de Mayo - 22 de Junio										26.03	16.83	0.10	21.43
		CUAJADO	23 de Junio - 04 de Agosto										25.31	15.48	0.10	20.39
		FRUCTIFICACIÓN	05 de Agosto - A la Fecha										25.58	14.28	0.00	19.93
		MADURACIÓN														

DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA CASMA															
MONITOREO DEL CULTIVO DEL CIRUELO															
ESTACIÓN: BUENA VISTA _ FASES FENOLOGICAS DEL CIRUELO (VARIEDAD ROJA).															
ESTACIÓN	ZONA	FASES	INICIO	FENOLOGIA							CLIMA				
				AÑO 2025							T. MAX	T. MIN	PP	T.MED	
BUENA VISTA	USUD	AGOSTE													
		HINCHAZÓN DE YEMAS	03 de Abril - 07 de Mayo									29.96	18.07	0.70	24.01
		APERTURA DE YEMAS	08 de Mayo - 27 de Mayo									27.03	16.21	0.00	21.62
		BOTÓN FLORAL	28 de Mayo - 31 de Mayo									26.95	16.25	0.00	21.60
		FLORACIÓN	01 de Junio - 22 de Junio									25.17	17.20	0.10	21.19
		FRUCTIFICACIÓN	23 de Junio - A la fecha									25.45	14.85	0.10	20.15
		MADURACIÓN													



ANCASH

En la zona de Huarney, las condiciones climáticas son favorables para el cultivo de alfalfa variedad HORTUS 1001 que se encontró en brotamiento. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas de 22.60°C (ligeramente cálidas) y mínimas de 15.46°C (normales), que aunados a riegos fueron favorables para el desarrollo del pastizal.




Cultivo de alfalfa en brotamiento, estación Huarney

DISTRITO DE HUARMEY MONITOREO DEL CULTIVO DE ALFALFA														
ESTACIÓN: HUARMEY _ FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ALFALFA														
ESTACIÓN ZONA		FASES	FENOLOGIA								CLIMA			
			INICIO	FINAL	AÑO 2025									
JUL.	AGO.	SEPT.			OCT.	NOV.	DIC.	T. MAX	T. MIN	PP	T. MED			
HUARMEY	COSTA	CORTE												
		Emergencia												
		Brotamiento	16 de septiembre	A la fecha										
		Desarrollo Vegetativo Temprano									22.60	15.46	0.00	
		Desarrollo Vegetativo Medio												
		Desarrollo Vegetativo Tardío												
		Botón Floral												
		Floración												
		Maduración												



LIMA

En la Estación Alcantarilla, las variedades de maíz NK 252 y DEKALB 7508 están en la fase de aparición de hojas, con desarrollo general bueno aunque con una diferencia en el avance entre ellas. Este comportamiento se atribuye a las condiciones térmicas de la zona, que son cálidas durante el día y habituales por la noche, aunados a riegos. Estas condiciones, sumadas a la aplicación de riegos oportunos y la fertilización, particularmente en la variedad NK 252, han contribuido positivamente al desarrollo de las plantas.



Cultivo de maíz de la variedad DEKALB en aparición de hojas en la estación Alcantarilla




Cultivo de maíz de la variedad NK252 en aparición de hojas en la estación Alcantarilla

MONITOREO DEL CULTIVO DE MAÍZ													
ESTACIÓN ALCANTARILLA: FASES FENOLÓGICAS DEL MAÍZ AMARILLO var. NK525													
ESTACIÓN	FASES FENOLÓGICAS	Inicio	Final	Días	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
ALCANTARILLA	EMERGENCIA												
	APARICIÓN DE HOJAS	10/08/2025											
	PANOGIA												
	ESPIGA												
	MADURACIÓN LECHOSA												
	MADURACIÓN PASTOSA												
	MADURACIÓN CÓRNEA												

MONITOREO DEL CULTIVO DE MAÍZ													
ESTACIÓN ALCANTARILLA: FASES FENOLÓGICAS DEL MAÍZ AMARILLO var. DEKALB 7508													
ESTACIÓN	FASES FENOLÓGICAS	Inicio	Final	Días	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set
ALCANTARILLA	EMERGENCIA												
	APARICIÓN DE HOJAS												
	PANOGIA												
	ESPIGA												
	MADURACIÓN LECHOSA												
	MADURACIÓN PASTOSA												
	MADURACIÓN CÓRNEA												

LIMA

En la estación Huayán, las plantaciones de palto de la variedad Naval se encuentran en la fase de foliación, con estado bueno. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas promedio de 26.8 °C, consideradas cálidas para la zona, y mínimas de 13.4 °C, dentro de los rangos habituales. No obstante, se observa un bajo porcentaje de plantas en floración, además de una floración desuniforme y ligeramente retrasada, lo cual se atribuye principalmente a un manejo agronómico deficiente.



Cultivo de palto en foliación

DISTRITO DE HUARAL


MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTO

ESTACIÓN HUAYÁN: FASES FENOLÓGICAS DEL PALTO - var.NAVAL

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
HUAYÁN	COSTA	AGOSTE												
		FOLIACIÓN												
		FLORACIÓN												
		FRUCTIFICACIÓN												
		MADURACIÓN												

ICA

El cultivo de vid (Tacama) continua en su etapa de reposo vegetativo para variedades de piscos y vinos, mientras que para variedades de exportación se continúan con los raleos y despuentes. Las condiciones térmicas diurnas ligeramente cálidas a sus normales y nocturnas ligeramente frías, favorecen al desarrollo del racimo; mientras que las variedades viníferas se iniciaron en gran parte de los valles de la región con el inicio de la apertura de yemas.




Cultivo de Vid en reposo vegetativo en la estación Tacama

		VALLE DE ICA																			
		MONITOREO DEL CULTIVO DE VID																			
		ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLÓGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT																			
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGIA													CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
		FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima
LAS VIÑAS	TINGUIÑA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													29.3	10.3	0	19.8	0°C	10°C	0° - 10°C.
		HINCHAZON DE YEMAS																	5°C	15°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS																	10°C	20°C	15° - 20°C.
		APARICION DEL AMENTO																	20°C	25°C	18° - 25°C.
		FLORACION																	15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION																	18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACIÓN																	20°C	35°C	25° - 30°C.

VID

ICA

El cultivo de palto en Huamani (Ica) paso a su fase de floración final, las condiciones térmicas diurnas cálidas y nocturnas dentro de su normal mas los riegos continuos benefician a una mejor polinización y cuajado, están con rangos de temperatura entre 12.7°C a 28.3°C.



Palto en floración la estación Huamani


VALLE DE LOS MOLINOS MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTA ESTACIÓN HUAMANI: FASES FENOLÓGICAS DE PALTA FUERTE																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
HUAMANI	LOS MOLINOS CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													24.6	9.9	0.0	17.25	10°C	35°C	15°C a 25°C	
		FOLIACIÓN														24.4	10.1	0.0	17.25	15°C	35°C	20°C a 28°C
		FLORACION														28.3	12.7	0.0	20.50	15°C	30°C	22°C a 28°C
		FRUCTIFICACION																		15°C	30°C	22°C a 28°C
		MADURACION																		15°C	30°C	22°C a 28°C



PALTO

ICA

El cultivo de ciruelo de la estación Rio Grande (Ica) continua en la fase de fructificación con estado bueno. Las condiciones térmicas diurnas cálidas y nocturnas dentro de su normal, son propicias para el cultivo. Con rangos de temperaturas que oscilan entre los 11.6°C a 31.9°C.



Cultivo de ciruelo en fructificación


VALLE DE RIO GRANDE
MONITOREO DEL CULTIVO CIRUELO
ESTACIÓN RIO GRANDE: FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGIA													CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
		FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
RIO GRANDE	PALPA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													29.8	13.6	0.0	21.7	0°C	10°C	0° - 10°C.
		HINCHAZON DE YEMAS													28.9	11.0	0.0	20.0	5°C	20°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS													28.8	9.8	0.0	19.3	10°C	25°C	15° - 20°C.
		BOTO FLORAL													29.0	9.8	0.0	19.4	12°C	28°C	18° - 22°C.
		FLORACION													28.1	10.4	0.0	19.3	15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION													31.9	11.6	0.0	21.75	18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACION																	20°C	35°C	25° - 30°C.



AREQUIPA

En La Joya se instaló el cultivo de maíz variedad amiláceo (trasplante el 14/07/2025), continuo en la fase de aparición de hojas con estado bueno. En el periodo las temperaturas tanto diurnas como nocturnas estuvieron entre sus normales, favorables para el crecimiento vegetativo del cultivo.



Maíz en aparición de hojas estación La Joya

IRRIGACIÓN LA JOYA - SAN ISIDRO																					
MONITOREO DEL CULTIVO DE MAÍZ																					
ESTACIÓN MAP LA JOYA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO																					
Siembra: 14/07/2025.																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
HUASACACHE	SIERRA MEDIA	EMERGENCIA																			
		APARICIÓN DE HOJAS	26/07/25												27.1	8.0	0.0	17.5	5.0	30.0	
		PANOJA																			
		ESPIGA																			
		MADURACIÓN LECHOSA																			
		MADURACIÓN PASTOSA																			
		MADURACIÓN Córnea																			

MAIZ