

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN COSTA

Del 11 al 17 de noviembre del 2025



Subdirección de Predicción Agrometeorológica -SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Plantaciones de mango en
fructificación
Motupe - Lambayeque

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

ANCASH

En la estación Buena Vista, el cultivo del Mango (var. Criollo) continuó en fase de maduración, mientras que el de Ciruelo (var. Roja) en fase de fructificación, ambos con buen estado. Durante la semana, se registraron temperaturas máxima de 28.67 °C y mínima de 15.89 °C, aunado de riegos oportunos.



DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA CASMA
MONITOREO DEL CULTIVO DEL MANGO
ESTACIÓN: BUENA VISTA - FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO (VARIEDAD CRIOLLO).

ESTACIÓN	ZONA	FASES	INICIO	FENOLOGÍA												CLIMA			
				AÑO 2025												T. MAX	T. MIN	PP	T.MED
				Ener	Feb.	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
BUENA VISTA	USG0	AGOSTE														29.73	17.90	0.70	23.81
		BIOTAMIENTO	01 de Abril - 12 de Mayo													26.03	16.83	0.10	21.43
		FLORACIÓN	13 de Mayo - 22 de Junio													25.31	15.48	0.10	20.39
		CUAJADO	23 de Junio - 04 de Agosto													26.25	14.69	0.50	20.47
		FRUCTIFICACIÓN	05 de Agosto - 20 de Octubre													28.19	14.99	0.10	21.59
		MADURACIÓN	21 de Octubre - A la Fecha																

DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA CASMA
MONITOREO DEL CULTIVO DEL CIRUELO
ESTACIÓN: BUENA VISTA - FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO (VARIEDAD ROJA).

ESTACIÓN	ZONA	FASES	INICIO	FENOLOGÍA												CLIMA			
				AÑO 2025												T. MAX	T. MIN	PP	T.MED
				Ener	Feb.	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
BUENA VISTA	USG0	AGOSTE														29.96	18.07	0.70	24.01
		HIJACION DE YERBAS	03 de Abril - 07 de Mayo													27.03	16.21	0.00	21.62
		APERTURA DE YERBAS	08 de Mayo - 27 de Mayo													26.95	16.25	0.00	21.60
		BIOTÓN FLORAL	28 de Mayo - 31 de Mayo													25.17	17.20	0.10	21.19
		FLORACIÓN	01 de Junio - 22 de Junio													26.34	15.16	0.70	20.75
		FRUCTIFICACIÓN	23 de Junio - A la fecha																




Mango en fase de maduración



Ciruelo en fase final de fructificación

ANCASH

En la estación Huarmey, el cultivo de alfalfa (var. Hortus 901) se encontró en la fase de floración con estado regular. Durante la semana se registraron temperaturas máxima de 23,74 °C y mínimas de 15,80 °C (entre sus normales). No obstante, se evidencio un incremento en la presencia de dípteros que vienen ocasionado lesiones en la planta, atribuido principalmente por el manejo agronómico inadecuado.



DISTRITO DE HUARMEY											
MONITOREO DEL CULTIVO DE ALFALFA											
ESTACIÓN: HUARMEY _ FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ALFALFA											
ESTACIÓN ZONA		FASES	FENOLOGIA								
			INICIO	FINAL	AÑO 2025						
					JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
HUARMEY	COSTA	CORTE									
		Emergencia									
		Brotamiento									
		Desarrollo Vegetativo Temprano									
		Desarrollo Vegetativo Medio									
		Desarrollo Vegetativo Tardío									
		Boton Floral									
		Floracion									
		Maduración									





Estación Huarmey, alfalfa en floración



ANCASH

En la estación Huayán, el cultivo de palto (var. Naval) continuó en fase de floración, con buen estado. Durante la semana, se registró temperatura máxima de 26.4 °C y mínima de 13.8 °C, que juntos con riegos oportunos favorecieron el desarrollo de floración.



Estación Huayán, palto en floración


DISTRITO DE HUARAL
MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTO
ESTACIÓN HUAYÁN: FASES FENOLÓGICAS DEL PALTO - var.NAVAL

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
HUAYÁN	COSTA	AGOSTE												
		FOLIACIÓN												
		FLORACIÓN												
		FRUCTIFICACIÓN												
		MADURACIÓN												

PALTO

LIMA

En la estación Alcantarilla, el maíz (var. DEKALB 7508) se encontró en fase de panoja y el maíz (var. NK 252) en maduración lechosa. Durante la semana, se reportó temperatura máxima de 24°C y mínima de 13.6 °C, con estado bueno en ambos cultivos, debido al ligero incremento de la temperatura mínima que promovió el avance de las fases fenológicas de la planta.



Cultivo de maíz (var. DEKALB 7508) en panoja

MONITOREO DEL CULTIVO DE MAIZ
ESTACIÓN ALCANTARILLA: FASES FENOLÓGICAS DEL MAÍZ AMARILLO var. NK252

ESTACIÓN	FASES FENOLÓGICAS	Inicio	Final	Días	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ALCANTARILLA	EMERGENCIA															
	APARICIÓN DE HOJAS	10/08/2025														
	PANOJA															
	ESPIGA															
	MADURACIÓN LECHOSA															
	MADURACIÓN PASTOSA															
	MADURACIÓN Córnea															




Cultivo de maíz (var. NK 252) en maduración lechosa

MONITOREO DEL CULTIVO DE MAIZ
ESTACIÓN ALCANTARILLA: FASES FENOLÓGICAS DEL MAÍZ AMARILLO var. DEKALB 7508

ESTACIÓN	FASES FENOLÓGICAS	Inicio	Final	Días	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ALCANTARILLA	EMERGENCIA															
	APARICIÓN DE HOJAS															
	PANOJA															
	ESPIGA															
	MADURACIÓN LECHOSA															
	MADURACIÓN PASTOSA															
	MADURACIÓN Córnea															

El cultivo de vid en la estación Tacama inicio la fase de aparición del amento con condiciones térmicas diurnas cálidas y ligeramente frías en las nocturnas. Con temperaturas que oscilan entre los 12.2°C a 30.4°C, estas condiciones cálidas están acelerando el avance de las fases fenológicas. De la misma forma las parcelas de poda temprana se encuentran en floración y cuajado en buen estado. Mientras que las variedades de exportación temprana de los fundos del valle de Ica se encuentran en inicio de maduración y las variedades tardías en plena fructificación.





Cultivo de vid en aparición del amento

VALLE DE ICA																								
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID																								
ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLÓGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT																								
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc.Alta	T.Optima			
LAS VIÑAS	TINGUIÑA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													27.7	12.6	0	20.2	0°C	10°C	0° - 10°C.			
		HINCHAZON DE YEMAS														28.2	14.3	0	21.2	5°C	15°C	10° - 15°C.		
		APERTURA DE YEMAS														29.5	11.6	0	20.6	10°C	20°C	15° - 20°C.		
		APARICION DEL AMENTO														29.7	12.183	0	21.0	20°C	25°C	18° - 25°C.		
		FLORACION																		15°C	30°C	20° - 25°C.		
		FRUCTIFICACION																		18°C	35°C	22° - 28°C.		
		MADURACIÓN																	20°C	35°C	25° - 30°C.			



ICA

El cultivo de palto en Huamani (Ica) sigue en la fase de inicio de fructificación. Las condiciones térmicas diurnas estuvieron cálidas y nocturnas ligeramente frías, con registros de temperaturas que oscilan entre los 13.5°C a 29.8°C. Condiciones ambientales que favorecieron el desarrollo del cultivo y esto acompañado de los riegos oportunos semanales que influyen en el crecimiento y desarrollo del fruto.




Cultivo de vid en aparición de amento

VALLE DE LOS MOLINOS																						
MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTA																						
ESTACIÓN HUAMANI: FASES FENOLÓGICAS DE PALTA FUERTE																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
HUAMANI	LOS MOLINOS CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													25.1	10.5	0.0	17.8	10°C	35°C	15°C a 25°C	
		FOLIACIÓN														24.4	10.1	0.0	17.3	15°C	35°C	20°C a 28°C
		FLORACION														26.7	11.0	0.0	18.9	15°C	30°C	22°C a 28°C
		FRUCTIFICACION														28.9	13.0	0.0	20.9	15°C	30°C	22°C a 28°C
		MADURACION																		15°C	30°C	22°C a 28°C

ICA

El cultivo de ciruelo de la estación Rio Grande (Ica) se mantiene en su fase de fructificación final. Las condiciones térmicas presentan temperaturas diurnas cálidas y nocturnas ligeramente frías, óptimas para el desarrollo del cultivo. Se tuvo temperaturas que oscilan entre los 13.1°C a 32.5°C.




Estación Rio Grande, ciruelo en fructificación final

VALLE DE RIO GRANDE																						
MONITOREO DEL CULTIVO CIRUELO																						
ESTACIÓN RIO GRANDE: FASES FENOLOGICAS DEL CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLOGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
RIO GRANDE	PALPA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													29.8	13.6	0.0	21.7	0°C	10°C	0° - 10°C.	
		HINCHAZON DE YEMAS														28.9	11.0	0.0	20.0	5°C	20°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS														28.8	9.8	0.0	19.3	10°C	25°C	15° - 20°C.
		BOTO FLORAL														29.0	9.8	0.0	19.4	12°C	28°C	18° - 22°C.
		FLORACION														28.1	10.4	0.0	19.3	15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION														31.6	12.7	0.0	22.1	18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACION																	20°C	35°C	25° - 30°C.	



AREQUIPA

En la estación Camaná, el cultivo de arroz (var. IR-43) se encontró en macollaje con estado bueno. Las condiciones ambientales favorecen el desarrollo del cultivo.




Estación Camaná, cultivo de arroz en macollaje

VALLE DE CAMANA																						
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ																						
ESTACIÓN CO CAMANA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVOS DE ARROZ VARIEDAD IR43																						
Transplante: 27 de octubre del 2025																						
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Óptima	
CO CAMANA	VALLE DE CAMANA	EMERGENCIA														0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	39	30.0
		PLÁNTULA	27/10/25	07/11/25												22.6	17.0	0.0	19.8			
		MACOLLAJE	08/11/25													22.9	16.8	0.0	19.9			
		ELONGACIÓN DE TALLO																		12.0	39	28.0
		INICIO DE PANOJA																				
		DESARROLLO DE PANOJA																				
		FLORACIÓN																		15.0	39	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA																				
		MADURACIÓN PASTOSA																		12.0	39	30.0
		MADURACIÓN Córnea																				

ARROZ

AREQUIPA

En la estación C.O Aplao, el cultivo de arroz (var. Tinajones) continuó en fase de macollaje, favorecido por las condiciones ambientales que registraron valores entorno a su climatología y los riegos oportunos que vienen promoviendo un mayor desarrollo vegetativo.



Estación Aplao, arroz en macollaje

VALLE DE MAJES MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ ESTACIÓN CO APLAO: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ VARIEDAD TINAJONES Siembra: 24/10/2025																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Óptima
CO APLAO	VALLE DE MAJES	EMERGENCIA													0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	39	30.0
		PLÁNTULA	24/10/25	31/10/25											28.5	12.8	0.0	20.6			
		MACOLLAJE	01/11/25												28.9	13.2	0.0	21.1			
		ELONGACIÓN DE TALLO																	12.0	39	28.0
		INICIO DE PANOJA																			
		DESARROLLO DE PANOJA																			
		FLORACIÓN																	15.0	39	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA																			
		MADURACIÓN PASTOSA																	12.0	39	30.0
		MADURACIÓN CÓRNEA																			

ARROZ