

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN COSTA

Del 24 de febrero al 02 marzo del 2026



Subdirección de Predicción Agrometeorológica -SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Plantaciones de mango en
fructificación
Motupe - Lambayeque

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PIURA

En la zona de monitoreo de Morropón, el cultivo de arroz continúa en fase de macollaje y presenta un buen estado. Su desarrollo ha sido favorecido por condiciones cálidas de temperatura y por las precipitaciones registradas durante el periodo, además de las labores de riego realizadas.




ALTO PIURA																				
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ																				
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA	
MORROPON	ALTO PIURA	SIEMBRA													32	22.8	27.4	0	21.1.2026	
variedad TINAJONES		EMERGENCIA													28	23.8	25.9	1.2	26.1.2026	
		PLANTULA													30	23	26.5	1.4	14.2.2026	
		MACOLLAJE													31.8	22	26.9	3.5	23.2.2026	
		ELONGACION DEL TALLO																		
		PANOJA																		
		DESARROLLO DE PANOJA																		
		FLORACIÓN																		
		MADURACIÓN LECHOSA																		
		MADURACIÓN PASTOSA																		
		MADURACIÓN CORNEA																		



Estación Morropón, cultivo de arroz en macollaje

PIURA

En el valle de San Lorenzo y Morropón, los frutales de mango de las variedades Kent, Edward y criollo se encuentran culminando su etapa productiva y entrando en reposo vegetativo. En la zona de monitoreo de Bigote (Morropón) se realizan las últimas cosechas de la temporada, observándose una menor cantidad de fruta respecto a la semana anterior. Asimismo, las temperaturas elevadas registradas durante el periodo favorecieron la rápida maduración del fruto.



Estación Chulucanas, cultivo de reposo vegetativo

VALLE ALTO PIURA MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO ESTACIÓN CHULUCANAS: FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO EDWARD																
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX
CHULUCANAS	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO													25.1.2025	36
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES													25.3.2025	36.6
		FLORACIÓN													29.5.2025	32
		CUAJADO													18.6.2025	28
		FRUCTIFICACIÓN													16.7.2025	32.6
		MADURACIÓN														
																T.MIN
																T.MED
																pp

VALLE ALTO PIURA MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO ESTACIÓN BIGOTE: FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO CRIOLLO																
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX
BIGOTE	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO													23.2.2026	
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES														
		FLORACIÓN														
		CUAJADO														
		FRUCTIFICACIÓN													16.7.2025	
		MADURACIÓN													1.11.2025	
																T.MIN
																T.MED
																pp




Estación Bigote, cultivo de mango en cosecha



MANGO

LAMBAYEQUE

En la estación Pasabar, el cultivo de mango (var. Kent) continuó en fase fenológica de fructificación, las condiciones ambientales de lluvias (109.2) han retrasado la ejecución de las labores agrícolas y las últimas cosechas de la campaña 2025-2026, además de dificultar el acceso a las plantaciones. Asimismo, han generado un ambiente propicio para la presencia de antracnosis, lo que ha reducido los volúmenes destinados a la exportación y aumentado el porcentaje de fruta descartada.




ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
PASABAR	CASCAJAL	KENT	REPOSO VEGETATIVO													35.4	22.4	184.6	28.9	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													31.3	18.0	22.0	24.7	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													30.5	17.1	1.2	23.8	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													32.8	15.5	0.2	24.1	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO													33.8	16.9	3.7	25.4	
			FRUCTIFICACIÓN													33.9	19.6	365.9	26.7	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



MANGO

LAMBAYEQUE

En la estación Tongorrape, el cultivo de mango (var. Kent) presentó buen estado y continuó en la fase de fructificación. Durante la semana las lluvias han retrasado la ejecución de las labores agrícolas y las últimas cosechas de la campaña 2025-2026, además de dificultar el acceso a las plantaciones. Asimismo, han generado un ambiente propicio para la presencia de antracnosis, lo que ha reducido los volúmenes destinados a la exportación y aumentado el porcentaje de fruta descartada.



ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2025-2026												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
TONGORRAPE	TONGORRAPE	KENT	REPOSO VEGETATIVO													33.9	21.0	156.4	27.4	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES													30.1	17.0	31.4	23.6	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL													28.8	15.9	0.1	22.4	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN													30.8	14.2	0.0	22.5	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO													31.5	15.6	6.9	23.6	
			FRUCTIFICACIÓN													32.1	18.2	187.1	25.2	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.




Cultivo de mango en fructificación



LAMBAYEQUE

En la estación Lambayeque, se registraron temperaturas máximas promedio de 31,5 °C y mínimas de 23.4 °C, condiciones que han favorecido el desarrollo fisiológico del cultivo de arroz variedad Tinajones, actualmente en fase de elongación de tallos.




ESTACIÓN	CAMPAÑA 2025-2026				FENOLOGÍA		CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO *		
	VARIEDAD	SIEMBRA	TRASPLANTE	COSECHA	FASES	INICIO	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TC-Baja	TC-Alta	T.Óptima
LAMBAYEQUE	Valor	27/11/2025	6/01/2025		EMERGENCIA	29/11/2025	26.0	17.9	0.0	21.9	16	33	25 - 31
					PLÁNTULA	2/12/2025	27.2	18.7	3.9	23.0			
					MACOLLAJE	29/01/2026	29.5	21.8	8.8	25.6			
					ELONGACIÓN DEL TALLO	19/02/2026	31.7	23.2	18.5	27.5			
					INICIO DE PANOJA						15		
					DESARROLLO DE PANOJA						20	38	
					FLORACIÓN						22	35	30 - 33
					MADURACIÓN LECHOSA						18	30	20 - 25
					MADURACIÓN PASTOSA								
					MADURACIÓN CÓRNEA								

ARROZ

ICA

El cultivo de vid en la CO Tacama inició la fase de maduración en las variedades viníferas, mientras que las variedades destinadas a exportación se encuentran en la etapa final de cosecha en las zonas altas, medias y bajas del valle, como Parcona, Los Aquijes, Santiago y Ocucaje. Las anomalías de temperatura máxima por encima de lo normal y la humedad relativa han favorecido el incremento de enfermedades como el oídio, lo que podría afectar la calidad del fruto y causar daños en hojas y tallos de las plantas




VALLE DE ICA																													
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID																													
ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLOGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT																													
FENOLOGIA																													
ESTACION	ZONA	FASIS FENOLOGICAS												CLIMA								REQUERIMIENTO TERMICO							
			Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PR	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima								
LAS VIÑAS	TINGUÑA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO														27.7	12.6	0	20.2	0°C	10°C	0° - 10°C.							
		HINCHAZON DE YEMAS															28.2	14.3	0	21.2	5°C	15°C	10° - 15°C.						
		APERTURA DE YEMAS															29.5	11.6	0	20.6	10°C	20°C	15° - 20°C.						
		APARICION DEL AMENTO															29.6	12.8	0	21.2	20°C	25°C	18° - 25°C.						
		FLORACION															31.6	14.2	0	22.9	15°C	30°C	20° - 25°C.						
		FRUCTIFICACION															31.4	16.3	2.1	23.9	18°C	35°C	22° - 28°C.						
		MADURACION														33.8	19.5	9.5	26.7	20°C	35°C	28° - 30°C.							



Cultivo de vid en maduración

ICA

El cultivo de palto en Huamán (Ica) se encuentra en fase de plena maduración. Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas superiores a lo normal podrían limitar el crecimiento del fruto y favorecer la incidencia de plagas y enfermedades. Asimismo, estas condiciones incrementan el requerimiento hídrico del cultivo, por lo que los riegos continuos resultan favorables para evitar el estrés hídrico y asegurar un adecuado desarrollo productivo del fruto.




VALLE DE LOS MOLINOS
MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTA
ESTACIÓN HUAMANI: FASES FENOLÓGICAS DE PALTA FUERTE

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CUMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
HUAMANI	LOS MOLINOS CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													25.1	10.5	0.0	17.8	10°C	35°C	15°C a 25°C
		FOLIACIÓN													24.4	10.1	0.0	17.3	15°C	35°C	20°C a 28°C
		FLORACIÓN													26.7	11.0	0.0	18.9	15°C	30°C	22°C a 28°C
		FRUCTIFICACIÓN													30.1	14.1	0.0	22.1	15°C	30°C	22°C a 28°C
		MADURACIÓN													30.2	18.9	20.4	24.6	15°C	30°C	22°C a 28°C

Cultivo de palto en maduración

ICA

El cultivo de ciruelo en la estación Río Grande (Ica) pasó a la fase de inicio de maduración. Las anomalías de temperatura máxima por encima de lo normal han incrementado la demanda hídrica y acelerado el avance de la fase fenológica, lo que podría afectar la calidad y el calibre del fruto.




VALLE DE RIO GRANDE																						
MONITOREO DEL CULTIVO CIRUELO																						
ESTACIÓN RIO GRANDE: FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima	
RIO GRANDE	PALPA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													29.8	13.6	0.0	21.7	0°C	10°C	0° - 10°C	
		HINCHAZON DE YEMAS													28.9	11.0	0.0	20.0	5°C	20°C	10° - 15°C	
		APERTURA DE YEMAS													28.8	9.8	0.0	19.3	10°C	25°C	15° - 20°C	
		BOTO FLORAL													29.0	9.8	0.0	19.4	12°C	28°C	18° - 22°C	
		FLORACION													28.1	10.4	0.0	19.3	15°C	30°C	20° - 25°C	
		FRUCTIFICACION													33.0	16.0	9.2	24.5	18°C	35°C	22° - 28°C	
		MADURACION													36.5	17.5	0.0	27.0	20°C	35°C	25° - 30°C	



Estación Río Grande, ciruelo en fructificación

AREQUIPA

En la estación Camaná, el cultivo de arroz (var. IR-43) se encontró en la fase de maduración cornea. Durante la semana, las temperaturas máximas y mínimas se presentaron sobre su normal, favorables para secado del grano del arroz.




Estación Camaná, cultivo de arroz en maduración pastosa

VALLE DE CAMANA
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ
ESTACIÓN CO CAMANA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVOS DE ARROZ VARIEDAD IR43
Transplante: 27 de octubre del 2025

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx.	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
CO CAMANA	VALLE DE CAMANA	EMERGENCIA													20.6	15.3	0.0	17.9	10.0	39	30.0
		PLÁNTULA	27/10/25	07/11/25											22.3	16.7	0.0	19.5			
		MACOLLAJE	08/11/25	23/12/25											24.0	17.5	0.0	20.8			
		ELONGACIÓN DE TALLO	24/12/25	10/01/26											25.9	19.0	0.0	22.5	12.0	39	28.0
		INICIO DE PÁNJOA	11/01/26	20/01/26											26.4	19.8	0.0	23.1			
		DESARROLLO DE PÁNJOA	21/01/26	27/02/26											27.2	20.9	0.0	24.0			
		FLORACIÓN	28/01/26	07/02/26											27.6	20.9	0.0	24.2	15.0	39	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA	08/02/26	17/02/26											27.8	21.9	0.0	24.9			
		MADURACIÓN PASTOSA	18/02/26	23/02/26											28.3	22.2	0.0	25.3	12.0	39	30.0
		MADURACIÓN CORNEA	24/02/26												28.9	22.6	0.0	25.7			


AREQUIPA

En la estación C.O. Aplao, el cultivo de arroz (var. Tinajones) se encontró en fase de maduración córnea. Durante la semana, las temperaturas cálidas favorecieron el proceso de secado del grano, permitiendo el avance de esta etapa fenológica y contribuyendo a la disminución de la humedad del cultivo previa a la cosecha.



VALLE DE MAJES
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ
ESTACIÓN CO APLAO: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ VARIEDAD TINAJONES
Siembra: 24/10/2025

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLÓGICA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx.	T. Min.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
CO APLAO	VALLE DE MAJES	EMERGENCIA																			
		PLÁNTULA	24/10/25	31/10/25																	
		PAJALAJE	01/11/25	08/12/25																	
		ELONGACIÓN DE TALLO	09/12/25	08/01/26																	
		INICIO DE PANAJA	09/01/26	12/01/26																	
		DESARROLLO DE PANAJA	13/01/26	18/01/26																	
		FLORACIÓN	19/01/26	07/02/26																	
		MADURACIÓN LECHOSA	08/02/26	22/02/26																	
		MADURACIÓN PASTOSA	23/02/26	28/02/26																	
		MADURACIÓN Córnea	01/03/26																		



Estación Aplao, arroz en maduración córnea