

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN COSTA

Del 03 al 09 de marzo del 2026



Subdirección de Predicción Agrometeorológica -SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Plantaciones de mango en
fructificación
Motupe - Lambayeque

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PIURA

En la estación Morropón, el cultivo de arroz continuó en fase de macollaje, con buen estado. Su crecimiento fue influenciado por las condiciones cálidas de temperatura entre 22.9°C a 33.0°C, y un valor registrado de precipitación acumulada en el mes de 19.7 mm.

ALTO PIURA
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA
MORROPON	ALTO PIURA	SIEMBRA													32	22.8	27.4	0	21.1.2026
variedad TINAJONES		EMERGENCIA													28	23.8	25.9	1.2	26.1.2026
		PLANTULA													30	23	26.5	1.4	14.2.2026
		MACOLLAJE													31.8	22	26.9	3.5	23.2.2026
		ELONGACION DEL TALLO																	
		PANOJA																	
		DESARROLLO DE PANOJA																	
		FLORACIÓN																	
		MADURACIÓN LECHOSA																	
		MADURACIÓN PASTOSA																	
		MADURACIÓN CORNEA																	




Estación Morropón, cultivo de arroz en macollaje

ARROZ

PIURA

En la estación Partidor, el cultivo de arroz en la variedad Féron inició la fase de panoja. Las elevadas temperaturas entre 22.00°C y 32.00°C, influyeron en su rápido desarrollo. El cultivo se encuentra en buen estado.



VALLE SAN LORENZO
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Dic-25	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA
PARTIDOR	SAN LORENZO	SIEMBRA														35	19.2	27.1	0	20.12.2025
variedad FERON		EMERGENCIA														34	20	27	0	22.12.2025
		PLANTULA														34.3	18.9	26.6	0	30.12.2025
		MACOLLAJE														33.8	23.2	28.5	0	25.1.2026
		ELONGACIÓN DEL TALLO														30.6	22.6	26.6	18.4	14.2.2026
		PANOJA														29.6	22.8	26.2	3.5	4.3.2026
		DESARROLLO DE PANOJA																		
		FLORACIÓN																		
		MADURACIÓN LECHOSA																		
		MADURACIÓN PASTOSA																		
		MADURACIÓN CORNEA																		




Estación Partidor, cultivo de arroz en panoja al 25%

ARROZ

LAMBAYEQUE

En la estación Pasabar, el cultivo de mango (var. Kent) se encontró en reposo vegetativo, con buen estado. Se registraron temperaturas máximas promedio de 33.4 °C y mínimas de 21.7 °C, así como precipitaciones acumuladas de 1.8 mm. Estas condiciones fueron favorables, tomando en cuenta que las precipitaciones registradas en semanas anteriores favorecieron la disponibilidad de humedad en los suelos.



ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
PASABAR	CASCAJAL	KENT	REPOSO VEGETATIVO													33.5	21.8	2.9	27.6	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES																0.0	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL																0.0	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN																0.0	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																0.0	
			FRUCTIFICACIÓN																0.0	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.




LAMBAYEQUE

En la estación Tongorrape, el cultivo de mango (var. Kent) presentó buen estado y se encontró en reposo vegetativo. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas promedio de 31.9 °C y mínimas de 22.0 °C, así como precipitaciones acumuladas de 2.6 mm. Estas condiciones fueron favorables, tomando en cuenta que las precipitaciones registradas en semanas anteriores favorecieron la disponibilidad de humedad en los suelos.

ESTACIÓN TONGORRAPE

Comportamiento diario de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación



ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
TONGORRAPE	TONGORRAPE	KENT	REPOSO VEGETATIVO													31.9	22.0	11.6	27.0	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES															0.0	0.0	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL															0.0	0.0	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN															0.0	0.0	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO															0.0	0.0	
			FRUCTIFICACIÓN															0.0	0.0	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.




Cultivo de mango en reposo vegetativo

LAMBAYEQUE

En la estación de Jayanca, el cultivo de mango (var. Kent) se encontró en reposo vegetativo, manteniéndose en buen estado. Durante la semana se registró una temperatura máxima promedio de 34.0 °C y una mínima de 23.0 °C, sin ocurrencia de precipitaciones. Estas condiciones fueron favorables, tomando en cuenta que las precipitaciones registradas en semanas anteriores favorecieron la disponibilidad de humedad en los suelos.

ESTACIÓN JAYANCA

Comportamiento diario de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación




ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
JAYANCA	JAYANCA	KENT	REPOSO VEGETATIVO													34.1	23.1	0.0	28.6	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES																0.0	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL																0.0	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN																0.0	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																0.0	
			FRUCTIFICACIÓN																0.0	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



LAMBAYEQUE

En la estación Lambayeque, se registraron temperaturas máximas promedio de 30.9 °C y mínimas de 22.5 °C, registrándose una precipitación acumulada de 3,6 mm. Estas condiciones han favorecido el desarrollo fisiológico del cultivo de arroz var. Tinajones, el cual inició la fase de inicio de panoja, presentando un estado agronómico y fitosanitario favorable.




Cultivo de Arroz en inicio de panoja

ESTACIÓN	CAMPAÑA 2025-2026				FENOLOGÍA		CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO *		
	VARIEDAD	SIEMBRA	TRASPLANTE	COSECHA	FASES	INICIO	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TC-Baja	TC-Alta	T.Óptima
LAMBAYEQUE	Valor	27/11/2025	6/01/2025		EMERGENCIA	29/11/2025	26.0	17.9	0.0	21.9	16	33	25 - 31
					PLÁNTULA	2/12/2025	27.2	18.7	3.9	23.0			
					MACOLLAJE	29/01/2026	29.5	21.8	8.8	25.6			
					ELONGACIÓN DEL TALLO	19/02/2026	31.8	23.3	18.5	27.5	15	38	
					INICIO DE PANOJA	1/03/2026	30.8	22.5	3.6	26.7			
					DESARROLLO DE PANOJA								
					FLORACIÓN						22	35	30 - 33
					MADURACIÓN LECHOSA						18	30	20 - 25
					MADURACIÓN PASTOSA								
					MADURACIÓN CÓRNEA								

ARROZ

LAMBAYEQUE

En la estación Talla, se observaron temperaturas máximas superiores a lo normal (31.2 °C) y mínimas dentro de los rangos normales (22.8 °C), con una baja presencia de precipitaciones (3,6 mm). Bajo estas condiciones, el cultivo de arroz de la variedad El Valor, que continuó desarrollándose en la fase de inicio de panoja, mostrando un adecuado desarrollo fenológico y un buen estado general.




Cultivo de Arroz en inicio de panoja

ESTACIÓN	CAMPAÑA 2025-2026				FENOLOGÍA		CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO *		
	VARIEDAD	SIEMBRA	TRASPLANTE	COSECHA	FASES	INICIO	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TC-Baja	TC-Alta	T.Óptima
TALLA	VALOR	22/11/2025	31/12/2025		EMERGENCIA	24/11/2025	29.0	18.6	0.0	23.8	16	33	25 - 31
					PLÁNTULA	1/12/2025	27.8	17.5	1.3	22.7			
					MACOLLAJE	3/01/2026	29.7	20.9	21.3	25.3			
					ELONGACIÓN DEL TALLO	31/01/2026	30.8	22.2	18.2	26.5	15		
					INICIO DE PANOJA	23/02/2026	31.5	22.8	5.4	27.1			
					DESARROLLO DE PANOJA								
					FLORACIÓN								
					MADURACIÓN LECHOSA						18	30	20 - 25
					MADURACIÓN PASTOSA								
					MADURACIÓN CÓRNEA								

ICA

El cultivo de vid en la CO-Tacama pasó a la fase de fin de maduración en variedades viníferas. Las anomalías de temperatura máxima estuvieron sobre lo normal, generando el incremento de enfermedades como el oídio, pudiendo causar una menor calidad del fruto y afectar a las hojas y tallos de las plantas.




Cultivo de vid en maduración

VALLE DE ICA																						
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID																						
ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLÓGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
LAS VIÑAS	TINGUIÑA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													27.7	12.6	0	20.2	0°C	10°C	0° - 10°C.	
		HINCHAZON DE YEMAS														28.2	14.3	0	21.2	5°C	15°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS														29.5	11.6	0	20.6	10°C	20°C	15° - 20°C.
		APARICION DEL AMENTO														29.6	12.8	0	21.2	20°C	25°C	18° - 25°C.
		FLORACION														31.6	14.2	0	22.9	15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION														31.4	16.3	2.1	23.9	18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACIÓN														33.8	19.1	9.5	26.5	20°C	35°C	28° - 30°C.

ICA

El cultivo de palto en Huamani (Ica) continuó en plena maduración, con condiciones térmicas diurnas y nocturnas por encima de lo normal, lo que podría limitar el crecimiento del fruto y propiciar mayor incidencia de plagas y enfermedades, así como un mayor requerimiento hídrico para el desarrollo fruto. Los riegos continuos son favorables para evitar el estrés hídrico de la planta.



VALLE DE LOS MOLINOS
MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTA
ESTACIÓN HUAMANI: FASES FENOLÓGICAS DE PALTA FUERTE


ESTACION HUAMANI: FASES FENOLOGICAS DE LA FUENTE																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TERMICO			
ESTACION	ZONA	FASES FENOLOGICAS	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
HUAMANI	LOS MOLINOS CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													25.1	10.5	0.0	17.8	10°C	35°C	15°C a 25°C	
		FOLIACION														24.4	10.1	0.0	17.3	15°C	35°C	20°C a 28°C
		FLORACION														26.7	11.0	0.0	18.9	15°C	30°C	22°C a 28°C
		FRUCTIFICACION														30.1	14.1	0.0	22.1	15°C	30°C	22°C a 28°C
		MADURACION														30.3	19.0	20.4	24.6	15°C	30°C	22°C a 28°C



Cultivo de palto en maduración

ICA

En la estación Río Grande (Ica), el cultivo de ciruelo continuó en su fase de plena maduración. Se presentaron anomalías de temperatura máxima sobre lo normal, que oscilaron entre los 18.7°C y 36.0°C, causando mayor necesidad hídrica y aceleramiento de la fase fenológica, obteniendo menor calidad y calibre del fruto.



VALLE DE RIO GRANDE
MONITOREO DEL CULTIVO CIRUELO
ESTACIÓN RIO GRANDE: FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO

ESTACION RIO GRANDE: FASES FENOLOGICAS DEL CICLO DE VIDA VARIEDAD CRIOLLO																						
FENOLOGIA														CLIMA				REQUERIMIENTO TERMICO				
ESTACION	ZONA	FASES FENOLOGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
RIO GRANDE	PALPA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													29.8	13.6	0.0	21.7	0°C	10°C	0° - 10°C	
		HINCHAZON DE YEMAS														28.9	11.0	0.0	20.0	5°C	20°C	10° - 15°C
		APERTURA DE YEMAS														28.8	9.8	0.0	19.3	10°C	25°C	15° - 20°C
		BOTO FLORAL														29.0	9.8	0.0	19.4	12°C	28°C	18° - 22°C
		FLORACION														28.1	10.4	0.0	19.3	15°C	30°C	20° - 25°C
		FRUCTIFICACION														33.0	16.0	9.2	24.5	18°C	35°C	22° - 28°C
		MADURACION														35.8	18.9	0.0	27.4	20°C	35°C	25° - 30°C




Estación Río Grande, ciruelo en maduración



AREQUIPA

En la estación Camaná, el cultivo de arroz (var. IR-43) se encontró en la fase de maduración córnea. Durante la semana, las temperaturas máximas se presentaron sobre su normal, mientras que la temperatura mínima y las precipitaciones estuvieron con valores normales. Las condiciones ambientales favorecieron el desarrollo del cultivo.




Estación Camaná, cultivo de arroz en maduración córnea al 100%

VALLE DE CAMANA																					
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ																					
ESTACIÓN CO CAMANA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVOS DE ARROZ VARIEDAD IR43																					
Transplante: 27 de octubre del 2025																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
CO CAMANA	VALLE DE CAMANA	EMERGENCIA													20.6	15.3	0.0	17.9	10.0	39	30.0
		PLÁNTULA	27/10/25	07/11/25											22.3	16.7	0.0	19.5			
		MACOLLAJE	08/11/25	23/12/25											24.0	17.5	0.0	20.8			
		ELONGACIÓN DE TALLO	24/12/25	10/01/26											25.9	19.0	0.0	22.5	12.0	39	28.0
		INICIO DE PANOJA	11/01/26	20/01/26											26.4	19.8	0.0	23.1			
		DESARROLLO DE PANOJA	21/01/26	27/01/26											27.2	20.9	0.0	24.0			
		FLORACIÓN	28/01/26	07/02/26											27.6	20.9	0.0	24.2	15.0	39	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA	08/02/26	17/02/26											27.8	21.9	0.0	24.9			
		MADURACIÓN PASTOSA	18/02/26	23/02/26											28.3	22.2	0.0	25.3	12.0	39	30.0
		MADURACIÓN CÓRNEA	24/02/26												28.3	21.2	0.0	24.7			

ARROZ

AREQUIPA

En la estación Aplao, el cultivo de arroz (var. Tinajones) continuo en fase de maduración pastosa. Durante la semana, las temperaturas máximas y mínimas presentaron valores superiores a su normal, mientras que las precipitaciones estuvieron con valores normales. Las condiciones ambientales favorecieron el desarrollo del cultivo.



Estación Aplao, cultivo de arroz en maduración pastosa al 45%

		VALLE DE MAJES													MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ						
		ESTACIÓN CO APLAO: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ VARIEDAD TINAJONES													Siembra: 24/10/2025						
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx	T. Min.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
CO APLAO	VALLE DE MAJES	EMERGENCIA													27.2	9.6	0.0	18.4	10.0	39	30.0
		PLÁNTULA	24/10/25	31/10/25											29.1	12.5	0.0	20.8			
		MACOLLAJE	01/11/25	08/12/25											29.4	14.1	0.0	21.8			
		ELONGACIÓN DE TALLO	09/12/25	08/01/26											30.5	15.7	0.0	23.1	12.0	39	28.0
		INICIO DE PANOJA	09/01/26	12/01/26											30.5	17.5	3.3	24.0			
		DESARROLLO DE PANOJA	13/01/26	18/01/26											29.8	18.6	3.3	24.2			
		FLORACIÓN	19/01/26	07/02/26											30.7	19.3	3.3	25.0	15.0	39	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA	08/02/26	28/03/26											31.3	20.5	8.0	25.9			
		MADURACIÓN PASTOSA	01/03/26												31.6	18.3	0.0	25.0	12.0	39	30.0
		MADURACIÓN Córnea																			