

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN COSTA

Del 10 al 16 de marzo del 2026



Subdirección de Predicción Agrometeorológica -SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Plantaciones de mango en
fructificación
Motupe - Lambayeque

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PIURA

En la estación Morropón, el cultivo de arroz continuó en fase de macollaje, con buen estado. Su crecimiento fue influenciado por las condiciones cálidas de temperatura entre 23.4°C a 32.6°C, y un valor registrado de precipitación mensual acumulada de 139.9 mm, los riegos quedaron suspendidos.




Cultivo de arroz en macollaje

ALTO PIURA
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA
MORROPON	ALTO PIURA	SIEMBRA													32	22.8	27.4	0	21.1.2026
variedad TINAJONES		EMERGENCIA													28	23.8	25.9	1.2	26.1.2026
		PLANTULA													30	23	26.5	1.4	14.2.2026
		MACOLLAJE													31.8	22	26.9	3.5	23.2.2026
		ELONGACION DEL TALLO																	
		PANOJA																	
		DESARROLLO DE PANOJA																	
		FLORACIÓN																	
		MADURACIÓN LECHOSA																	
		MADURACIÓN PASTOSA																	
		MADURACIÓN CORNEA																	

PIURA

En la estación Partidor, el cultivo de arroz en la variedad Ferón continuó en fase de panoja. Las elevadas temperaturas entre 23.00°C y 32.60°C influyeron en su rápido desarrollo. El cultivo se encuentra en buen estado.



VALLE SAN LORENZO
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Dic-25	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA
PARTIDOR	SAN LORENZO	SIEMBRA														35	19.2	27.1	0	20.12.2025
variedad FERON		EMERGENCIA														34	20	27	0	22.12.2025
		PLANTULA														34.3	18.9	26.6	0	30.12.2025
		MACOLLAJE														33.8	23.2	28.5	0	25.1.2026
		ELONGACION DEL TALLO														30.6	22.6	26.6	18.4	14.2.2026
		PANOJA														29.6	22.8	26.2	3.5	4.3.2026
		DESARROLLO DE PANOJA																		
		FLORACIÓN																		
		MADURACIÓN LECHOSA																		
		MADURACIÓN PASTOSA																		
		MADURACIÓN CORNEA																		




Cultivo de arroz en panoja al 80%

ARROZ

LAMBAYEQUE

En la estación Pasabar, el cultivo de mango (var. Kent) continuó en reposo vegetativo, con buen estado. Se registraron temperaturas máximas promedio de 33.2°C y mínimas de 22.1°C (ambas por encima de su valor normal), así como precipitaciones acumuladas de 62.4 mm. Estas condiciones han sido favorables; además, las precipitaciones registradas en semanas anteriores han contribuido a una adecuada disponibilidad de humedad en los suelos.




ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMin.	Pp.	TMed.	
PASABAR	CASCAJAL	KENT	REPOSO VEGETATIVO													33.4	21.9	65.3	27.6	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES																0.0	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL																0.0	13 - 18 TMin.
			FLORACIÓN																0.0	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																0.0	
			FRUCTIFICACIÓN																0.0	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



LAMBAYEQUE

En la estación Tongorrape, el cultivo de mango var. Kent presentó buen estado y se encontró en reposo vegetativo. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas de 32.4°C y mínimas de 21.8°C, así como precipitaciones acumuladas de 17.3 mm. Estas condiciones han sido favorables; además, las precipitaciones registradas en semanas anteriores han contribuido a una adecuada disponibilidad de humedad en los suelos.




ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
TONGORRAPE	TONGORRAPE	KENT	REPOSO VEGETATIVO													32.2	21.9	28.9	27.0	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES															0.0		24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL															0.0		13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN															0.0		30 - 33 TMáx.
			CUAJADO															0.0		
			FRUCTIFICACIÓN															0.0		27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



Cultivo de mango en reposo vegetativo

LAMBAYEQUE

En la estación de Jayanca, el cultivo de mango var. Kent se encontró en reposo vegetativo, manteniéndose en buen estado. Durante la semana se registró una temperatura máxima promedio de 33.8 °C y una mínima de 22.9 °C, así como precipitaciones acumuladas de 23.2 mm. Estas condiciones han sido favorables; además, las precipitaciones registradas en semanas anteriores han contribuido a una adecuada disponibilidad de humedad en los suelos.



ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
JAYANCA	JAYANCA	KENT	REPOSO VEGETATIVO													34.0	23.0	23.2	28.5	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES																0.0	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL																0.0	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN																0.0	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																0.0	
			FRUCTIFICACIÓN																0.0	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.




LAMBAYEQUE

En la estación Lambayeque, se registraron temperaturas máximas promedio de 30.6 °C y mínimas de 22.4 °C, condiciones que han favorecido el desarrollo fisiológico del cultivo de arroz var. El Valor, el cual inició la fase de desarrollo de panoja. Asimismo, se registró una precipitación acumulada de 0,9 mm, y el cultivo presenta un estado agronómico y fitosanitario favorable.

ESTACIÓN LAMBAYEQUE

Comportamiento diario de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación




Cultivo de arroz en desarrollo de panoja

ARROZ

ESTACIÓN	CAMPAÑA 2025-2026				FENOLOGÍA		CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO *		
	VARIEDAD	SIEMBRA	TRASPLANTE	COSECHA	FASES	INICIO	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TC-Baja	TC-Alta	T.Óptima
LAMBAYEQUE	Valor	27/11/2025	6/01/2025		EMERGENCIA	29/11/2025	26.0	17.9	0.0	21.9	16	33	25 - 31
					PLÁNTULA	2/12/2025	27.2	18.7	3.9	23.0			
					MACOLLAJE	29/01/2026	29.5	21.8	8.8	25.6			
					ELONGACIÓN DEL TALLO	19/02/2026	31.8	23.3	18.5	27.5	15		
					INICIO DE PANOJA	1/03/2026	30.8	22.3	4.5	26.6			
					DESARROLLO DE PANOJA	13/03/2026	30.6	22.9	0.0	26.8	20	38	
					FLORACIÓN						22	35	30 - 33
					MADURACIÓN LECHOSA						18	30	20 - 25
					MADURACIÓN PASTOSA								
					MADURACIÓN Córnea								

LAMBAYEQUE

En la estación Talla se observaron temperaturas máximas dentro de lo normal (30.3 °C) y mínimas por encima de los rangos normales (22.3 °C), con una baja presencia de precipitaciones (4,0 mm). Bajo estas condiciones, el cultivo de arroz var. El Valor, que inició la fase de floración, muestra un adecuado desarrollo fenológico y un buen estado general.




Cultivo de arroz en floración

ESTACIÓN	CAMPAÑA 2025-2026				FENOLOGÍA		CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO *		
	VARIEDAD	SIEMBRA	TRASPLANTE	COSECHA	FASES	INICIO	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TC-Baja	TC-Alta	T.Óptima
TALLA	VALOR	22/11/2025	31/12/2025		EMERGENCIA	24/11/2025	29.0	18.6	0.0	23.8	16	33	25 - 31
					PLÁNTULA	1/12/2025	27.8	17.5	1.3	22.7			
					MACOLLAJE	3/01/2026	29.7	20.9	21.3	25.3			
					ELONGACIÓN DEL TALLO	31/01/2026	30.8	22.2	18.2	26.5	15		
					INICIO DE PANOJA	23/02/2026	31.5	22.8	5.4	27.1	20	38	
					DESARROLLO DE PANOJA	9/03/2026	30.1	22.2	4.0	26.2	22	35	30 - 33
					FLORACIÓN	15/03/2026	31.4	22.6	0.0	27.0	18	30	20 - 25
					MADURACIÓN LECHOSA								
					MADURACIÓN PASTOSA								
					MADURACIÓN CÓRNEA								

ARROZ

ANCASH

En la estación Buena Vista, el cultivo del Mango var. Criollo y de Ciruelo var. Roja se encuentran en fase de maduración, realizándose cosechas en ambos cultivos. Se registraron temperaturas máxima de 31,87 °C y mínimas de 20,04 °C, con condiciones nocturnas y diurnas normales, además de precipitación de 0,60 mm./día, encontrándose los cultivos con buen estado.



Cultivo de mango
en maduración al
70%



Cultivo de ciruelo
en maduración al
100%

DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA DE CASMA
MONITOREO DEL CULTIVO DEL MANGO
ESTACIÓN: BUENA VISTA - FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO (VARIEDAD CRIOLLO).

ESTACIÓN	ZONA	FASES	FENOLOGIA																CLIMA				
			INICIO	AÑO 2025															T. MAX	T. MIN	PP	T.MED	
				Ener	Feb.	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agost	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ener	Feb.	Mar					
BUENA VISTA	COSTA	AGOSTE																					
		EBROTAMIENTO	01 de Abril - 12 de Mayo																	29.73	17.90	0.70	23.81
		FLORACIÓN	13 de Mayo - 22 de Junio																	26.03	16.83	0.10	21.43
		CUAJADO	23 de Junio - 04 de Agosto																	25.31	15.48	0.10	20.39
		FRUCTIFICACION	05 de Agosto - 20 de Octubre																	26.25	14.69	0.50	20.47
		MADURACIÓN	21 de Octubre - A la Fecha																	30.45	16.99	24.60	23.72

DISTRITO DE BUENA VISTA - CUENCA DE CASMA
MONITOREO DEL CULTIVO DEL CIRUELO
ESTACIÓN: BUENA VISTA - FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO (VARIEDAD ROJA).


ESTACIÓN	ZONA	FASES	FENOLOGIA																CLIMA			
			INICIO	AÑO 2025												T. MAX	T. MIN	PP	T.MED			
				Ener	Feb.	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov.	Dic.					Ener	Feb.	Mar
BUENA VISTA	COSTA	AGOSTE																				
		HINCHAZÓN DE YEMAS	03 de Abril - 07 de Mayo																29.96	18.07	0.70	24.01
		APERTURA DE YEMAS	08 de Mayo - 27 de Mayo																27.03	16.21	0.00	21.62
		BOTÓN FLORAL	28 de Mayo - 31 de Mayo																26.95	16.25	0.00	21.60
		FLORACIÓN	01 de Junio - 22 de Junio																25.17	17.20	0.10	21.19
		FRUCTIFICACIÓN	23 de Junio - 17 de Noviembre																26.34	15.16	0.70	20.75
		MADURACIÓN	18 de Noviembre - A la fecha																30.98	19.09	24.50	25.03

MANGO

CIRUELO

LIMA

En la estación Huayán, el cultivo de palto (var. Naval) continuó en fase de fructificación, con estado bueno. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas (32.2 °C) y mínimas (19.8 °C) superiores a su normal, condiciones que podrían intensificar la actividad fisiológica del cultivo y acelerar el desarrollo del fruto, siempre que exista adecuada disponibilidad de agua en el suelo; sin embargo, también podrían incrementar de manera significativa la evapotranspiración y la demanda hídrica, elevando el riesgo de estrés térmico e hídrico.




DISTRITO DE HUARAL

MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTO

ESTACIÓN HUAYÁN: FASES FENOLÓGICAS DEL PALTO - var.NAVAL


ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
HUAYÁN	COSTA	AGOSTE												
		FOLIACIÓN												
		FLORACIÓN												
		FRUCTIFICACIÓN												
		MADURACIÓN												



Cultivo de palto en fructificación al 100%

LIMA

En la estación Socsi Cañete, el cultivo de mandarina var. Murcott se encuentra finalizando la fase fenológica de fructificación. Se evidencia buen estado del cultivo frente a las variaciones de temperaturas máximas y mínimas.



Cultivo de mandarina en fructificación al 100%


MONITOREO DEL CULTIVO DE MANDARINA
ESTACIÓN CAÑETE: FASES FENOLÓGICAS DE LA MANDARINA - MURCOTT

ESTACIÓN	FASES FENOLÓGICAS	Inicio	Final	Días	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	Pp.	T. Optima
SOCSI CAÑETE	HINCHAZÓN DE BOTÓN FLORAL																22.5	12.8	0.0	28.0 - 10.0
	APERTURA DE BOTÓN FLORAL																24.3	14.6	0.0	28.0 - 10.0
	FLORACIÓN																25.0	15.3	0.0	28.0 - 10.0
	FRUCTIFICACIÓN	8/12/2025	A la fecha														28.0	17.3	0.0	30.0 - 10.0
	MADURACIÓN																			30.0 - 10.0

ICA

El cultivo de vid en la CO-Tacama pasó a la fase de fin de maduración en variedades viníferas. El incremento de la temperatura máxima sobre lo normal han generado el incremento de enfermedades como el oídio y podrían causar una menor calidad del fruto y afectar a las hojas y tallos de las plantas.

VALLE DE ICA
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID - PETIT VERDOT
ESTACIÓN TACAMA: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y
PRECIPITACIÓN



Cultivo de vid en maduración


VALLE DE ICA
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID
ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLÓGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGIA													CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
		REPOSO VEGETATIVO	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Óptima
LAS VIÑAS	TINGUIÑA CAMPAÑA 2025-2026	HINCHAZON DE YEMAS													27.7	12.6	0	20.2	0°C	10°C	0° - 10°C.
		APERTURA DE YEMAS													28.2	14.3	0	21.2	5°C	15°C	10° - 15°C.
		APARICION DEL AMENTO													29.5	11.6	0	20.6	10°C	20°C	15° - 20°C.
		FLORACION													29.6	12.8	0	21.2	20°C	25°C	18° - 25°C.
		FRUCTIFICACION													31.6	14.2	0	22.9	15°C	30°C	20° - 25°C.
		MADURACIÓN													31.4	16.3	2.1	23.9	18°C	35°C	22° - 28°C.
															33.8	18.9	9.5	26.4	20°C	35°C	28° - 30°C.

ICA

El cultivo de palto en Huamani (Ica) continuó en plena maduración, con condiciones térmicas diurnas y nocturnas por encima de lo normal, lo que podría limitar el crecimiento del fruto y propiciar mayor incidencia de plagas y enfermedades, así como un mayor requerimiento hídrico para el desarrollo del fruto. Los riegos continuos son favorables para evitar el estrés hídrico de la planta.

VALLE DE LOS MOLINOS
MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTO VARIEDAD FUERTE
ESTACIÓN HUAMANI: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN



VALLE DE LOS MOLINOS
MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTA
ESTACIÓN HUAMANI: FASES FENOLÓGICAS DE PALTA FUERTE

ESTACION HUAMANI: FASES FENOLOGICAS DE PALTA FUENTE																						
FENOLOGIA															CLIMA				REQUERIMIENTO TERMICO			
ESTACION	ZONA	FASES FENOLOGICAS	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
HUAMANI	LOS MOLINOS CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													25.1	10.5	0.0	17.8	10°C	35°C	15°C a 25°C	
		FOLIACIÓN														24.4	10.1	0.0	17.3	15°C	35°C	20°C a 28°C
		FLORACION														26.7	11.0	0.0	18.9	15°C	30°C	22°C a 28°C
		FRUCTIFICACION														30.1	14.1	0.0	22.1	15°C	30°C	22°C a 28°C
		MADURACION														30.3	19.0	20.4	24.6	15°C	30°C	22°C a 28°C




Cultivo de palto en maduración

ICA


En la estación Río Grande (Ica), el cultivo de ciruelo continuó en su fase de plena maduración. Se presentaron anomalías de temperatura máxima sobre lo normal, que oscilaron entre los 20.1°C y 34.4°C, causando mayor necesidad hídrica y aceleramiento de la fase fenológica, obteniendo menor calidad y calibre del fruto.

VALLE DE RIO GRANDE
MONITOREO DEL CULTIVO DE CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO
ESTACIÓN RIO GRANDE: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN



VALLE DE RIO GRANDE
MONITOREO DEL CULTIVO CIRUELO
ESTACIÓN RIO GRANDE: FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO

ESTACIÓN RIO GRANDE PALPA FASES FENOLOGICAS DEL CICLO DE VIDA VARIEDAD CICLO																							
		FENOLOGIA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLOGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima		
RIO GRANDE	PALPA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO														29.8	13.6	0.0	21.7	0°C	10°C	0° - 10°C.	
		HINCHAZON DE YEMAS															28.9	11.0	0.0	20.0	5°C	20°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS															28.8	9.8	0.0	19.3	10°C	25°C	15° - 20°C.
		BOTO FLORAL															29.0	9.8	0.0	19.4	12°C	28°C	18° - 22°C.
		FLORACION															28.1	10.4	0.0	19.3	15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION															33.0	16.0	9.2	24.5	18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACION															35.2	19.4	0.0	27.3	20°C	35°C	25° - 30°C.




Cultivo de ciruelo en maduración



AREQUIPA

En la estación Camaná, la cosecha del cultivo de arroz (var. IR-43) se realizó el 14/03/2026, con un rendimiento de 14,100 kg/Ha. Durante la semana, las temperaturas máximas se presentaron sobre su normal, mientras que la temperatura mínima y las precipitaciones estuvieron con valores normales. Las condiciones ambientales favorecieron la cosecha del cultivo.




Cultivo de arroz en cosecha

VALLE DE CAMANA MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ ESTACIÓN CO CAMANA: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVOS DE ARROZ VARIEDAD IR43 Transplante: 27 de octubre del 2025 Cosecha día 14/03/2026 Rendimiento: 14 100 kg./ha.																						
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima	
CO CAMANA	VALLE DE CAMANA	EMERGENCIA														20.6	15.3	0.0	17.9	12.0	39	30.0
		PLÁNTULA	27/10/25	07/11/25												22.3	16.7	0.0	19.5			
		MACOLLAJE	08/11/25	23/12/25												24.0	17.5	0.0	20.8			
		ELONGACIÓN DE TALLO	24/12/25	10/01/26												25.9	19.0	0.0	22.5			
		INICIO DE PANOJA	11/01/26	20/01/26												26.4	19.8	0.0	23.1	12.0	39	30.0
		DESARROLLO DE PANOJA	21/01/26	27/01/26												27.2	20.9	0.0	24.0			
		FLORACIÓN	28/01/26	07/02/26												27.6	20.9	0.0	24.2			
		MADURACIÓN LECHOSA	08/02/26	17/02/26												27.8	21.9	0.0	24.9			
		MADURACIÓN PASTOSA	18/02/26	23/02/26												28.3	22.2	0.0	25.3			
		MADURACIÓN CÓRNEA	24/02/26													28.3	20.6	0.0	24.4			

AREQUIPA

En la estación Aplao, el cultivo de arroz (var. Tinajones) inició la fase de maduración córnea. Durante la semana, las temperaturas máximas y mínimas presentaron valores superiores a su normal. Las condiciones ambientales favorecieron el desarrollo del cultivo.



Cultivo de arroz en maduración córnea al 20%

VALLE DE MAJES MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ ESTACIÓN CO APLAO: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ VARIEDAD TINAJONES Siembra: 24/10/2025																					
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx	T. Mín.	Pp.	T. med.	TC Baja	TC Alta	T. Optima
CO APLAO	VALLE DE MAJES	EMERGENCIA													27.2	9.6	0.0	18.4	10.0	39	30.0
		PLÁNTULA	24/10/25	31/10/25											29.1	12.5	0.0	20.8			
		MACOLLAJE	01/11/25	08/12/25											29.4	14.1	0.0	21.8			
		ELONGACIÓN DE TALLO	09/12/25	08/01/26											30.5	15.7	0.0	23.1	12.0	39	28.0
		INICIO DE PANOJA	09/01/26	12/01/26											30.5	17.5	3.3	24.0			
		DESARROLLO DE PANOJA	13/01/26	18/01/26											29.8	18.6	3.3	24.2			
		FLORACIÓN	19/01/26	07/02/26											30.7	19.3	3.3	25.0	15.0	39	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA	08/02/26	28/03/26											31.3	20.5	8.0	25.9			
		MADURACIÓN PASTOSA	01/03/26	11/03/26											31.5	18.4	0.0	25.0	12.0	39	30.0
		MADURACIÓN Córnea	12/03/26												31.4	18.6	0.0	25.0			

ARROZ