

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN COSTA

Del 17al 23 marzo del 2026



Subdirección de Predicción Agrometeorológica -SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Plantaciones de mango en
fructificación
Motupe - Lambayeque

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PIURA

En la zona de monitoreo de Morropón, el cultivo de arroz (variedad 'Mallares') continúa en fase de macollaje con buen estado. Su desarrollo se ha visto favorecido por condiciones cálidas, con temperaturas que oscilaron entre los 22.8 °C y 33.6 °C. Durante este periodo, se realizó un riego por gravedad el día 22, incluyendo abonado con sulfato de amonio; asimismo, el 23 de marzo se llevaron a cabo labores de deshierbe manual."



ALTO PIURA																			
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ																			
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLOGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	T.MAX	T.MIN	T.MED	PP	FECHA
MORROPON	ALTO PIURA	SIEMBRA													32	22.8	27.4	0	21.1.2026
variedad TINAJONES		EMERGENCIA													28	23.8	25.9	1.2	26.1.2026
		PLANTULA													30	23	26.5	1.4	14.2.2026
		MACOLLAJE													31.8	22	26.9	3.5	23.2.2026
		ELONGACION DEL TALLO																	
		PANOJA																	
		DESARROLLO DE PANOJA																	
		FLORACIÓN																	
		MADURACIÓN LECHOSA																	
		MADURACIÓN PASTOSA																	
		MADURACIÓN CORNEA																	





Estación Morropón, cultivo de arroz en macollaje

ARROZ

PIURA

En San Lorenzo, Morropón y El Bigote, los árboles de mango (variedades Kent, Edward y Criollo) están en su etapa de reposo vegetativo. En la semana las temperaturas entre 21°C y 35°C ha hecho que empiecen a brotar hojas nuevas.



Estación Chulucanas, cultivo en reposo vegetativo

VALLE ALTO PIURA
MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO
ESTACIÓN CHULUCANAS: FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO EDWARD

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX	T.MIN	T.MED	pp
CHULUCANAS	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO													25.1.2025	36	17.4	26.7	0
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES													5.3.2025	32	22.4	27.2	33
		FLORACIÓN																	
		CUAJADO																	
		FRUCTIFICACIÓN																	
		MADURACIÓN																	



Estación Bigote, cultivo en reposo vegetativo

VALLE ALTO PIURA
MONITOREO DEL CULTIVO DE MANGO
ESTACIÓN BIGOTE: FASES FENOLÓGICAS DEL MANGO CRIOLLO


ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	FECHA	T.MAX	T.MIN	T.MED	pp
BIGOTE	ALTO PIURA	REPOSO VEGETATIVO													11.2.2026				
		BROTAMIENTO-MAD. DE BROTES													2.3.2026				
		FLORACIÓN																	
		CUAJADO																	
		FRUCTIFICACIÓN																	
		MADURACIÓN																	



MANGO

LAMBAYEQUE

En la estación Pasabar, el cultivo de mango (var. Kent) continuó en fase fenológica de reposo vegetativo, favorecido por las condiciones cálidas propias de la temporada que favorecieron en el crecimiento de nuevas hojas.




ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TÉRMINO ÓPTIMO
PASABAR	CASCAJAL	KENT	REPOSO VEGETATIVO													34.2	22.0	65.8	28.1	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES																0.0	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL																0.0	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN																0.0	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																0.0	
			FRUCTIFICACIÓN																0.0	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



MANGO

LAMBAYEQUE

En la estación Tongorrape, el cultivo de mango (var. Kent) presentó buen estado y se encontró en la fase de reposo vegetativo. Durante la semana las temperaturas propias de la temporada favorecieron en el crecimiento de nuevas hojas.




ESTACIÓN	ZONA	VARIEDAD	FENOLOGÍA	CAMPAÑA DE MANGO 2026-2027												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO ÓPTIMO
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	
TONGORRAPE	TONGORRAPE	KENT	REPOSO VEGETATIVO													32.8	21.7	36.1	27.3	
			BROTAMIENTO - MAD. DE BROTES																0.0	24 - 27 TMed.
			PERIODO INDUCCIÓN FLORAL																0.0	13 - 18 TMín.
			FLORACIÓN																0.0	30 - 33 TMáx.
			CUAJADO																0.0	
			FRUCTIFICACIÓN																0.0	27 - 36 TMáx.
			MADURACIÓN																	30 - 33 TMáx.



MANGO

LAMBAYEQUE

En el valle Chancay-Lambayeque se registraron temperaturas máximas promedio de 31,6 °C y mínimas de 22,3 °C, condiciones que han favorecido el desarrollo fisiológico del cultivo de arroz, el cual se encuentra en la fase de desarrollo de panoja.




ESTACIÓN	CAMPAÑA 2025-2026				FENOLOGÍA		CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO *		
	VARIEDAD	SIEMBRA	TRASPLANTE	COSECHA	FASES	INICIO	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.	TC-Baja	TC-Alta	T.Óptima
LAMBAYEQUE	Valor	27/11/2025	6/01/2025		EMERGENCIA	29/11/2025	26.0	17.9	0.0	21.9	16	33	25 - 31
					PLÁNTULA	2/12/2025	27.2	18.7	3.9	23.0			
					MACOLLAJE	29/01/2026	29.5	21.8	8.8	25.6			
					ELONGACIÓN DEL TALLO	19/02/2026	31.8	23.3	18.5	27.5			
					INICIO DE PANOJA	1/03/2026	30.8	22.3	4.5	26.6	15		
					DESARROLLO DE PANOJA	13/03/2026	31.244	22.511	0.0	26.9	20	38	
					FLORACIÓN						22	35	30 - 33
					MADURACIÓN LECHOSA						18	30	20 - 25
					MADURACIÓN PASTOSA								
					MADURACIÓN Córnea								

ARROZ

ICA

En la estación Tacama, el cultivo de vid de variedades viníferas pasó a la fase de fin de maduración; por su parte, las variedades de exportación se encuentran en reposo vegetativo en las zonas altas, medias y bajas del valle (Parcona, Los Aquijes, Santiago y Ocucaje). Las anomalías de temperatura máxima sobre lo normal han generado un incremento de enfermedades como el oídio, lo que podría comprometer la calidad del fruto y afectar la sanidad de hojas y tallos.




VALLE DE ICA																						
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID																						
ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLÓGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT																						
FENOLOGIA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima	
LAS VIÑAS	TINGUIÑA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													27.7	12.6	0	20.2	0°C	10°C	0° - 10°C	
		HINCHAZON DE YEMAS														28.2	14.3	0	21.2	5°C	15°C	10° - 15°C
		APERTURA DE YEMAS														29.5	11.6	0	20.6	10°C	20°C	15° - 20°C
		APARICION DEL AUMENTO														29.6	12.8	0	21.2	20°C	25°C	18° - 25°C
		FLORACION														31.6	14.2	0	22.9	15°C	30°C	20° - 25°C
		FRUCTIFICACION														31.4	16.3	2.1	23.9	18°C	35°C	22° - 28°C
		MADURACIÓN														33.8	18.6	9.5	26.2	20°C	35°C	28° - 30°C



Cultivo de vid en maduración

ICA

En la zona de Huamani (Ica), el cultivo de palto se encuentra en plena fase de maduración. Las temperaturas diurnas y nocturnas por encima de lo normal podrían limitar el crecimiento y calidad del fruto, además de incrementar la incidencia de plagas y enfermedades. Debido al mayor requerimiento hídrico por el calor, el mantenimiento de riegos continuos es fundamental para evitar el estrés de las plantas y asegurar el desarrollo productivo.




VALLE DE LOS MOLINOS																						
MONITOREO DEL CULTIVO DE PALTA																						
ESTACIÓN HUAMANI: FASES FENOLÓGICAS DE PALTA FUERTE																						
FENOLOGIA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
HUAMANI	LOS MOLINOS CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													25.1	10.5	0.0	17.8	10°C	35°C	15°C a 25°C	
		FOLIACIÓN														24.4	10.1	0.0	17.3	15°C	35°C	20°C a 28°C
		FLORACION														26.7	11.0	0.0	18.9	15°C	30°C	22°C a 28°C
		FRUCTIFICACION														30.1	14.1	0.0	22.1	15°C	30°C	22°C a 28°C
		MADURACION														30.3	19.0	20.4	24.7	15°C	30°C	22°C a 28°C



Cultivo de palto en maduración

ICA

El ciruelo en Río Grande se encuentra en el inicio de su maduración. Su estado es variable debido a frutos de tamaño pequeño, lo que exige mantener riegos constantes para no afectar más su calidad. Mientras se gestiona esta demanda de agua, los productores avanzan con la recolección de la fruta en las parcelas listas




Estación Río Grande, ciruelo en fructificación

VALLE DE RIO GRANDE																						
MONITOREO DEL CULTIVO CIRUELO																						
ESTACIÓN RIO GRANDE: FASES FENOLÓGICAS DEL CIRUELO VARIEDAD CRIOLLO																						
FENOLOGIA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Tmax	Tmin	PP	Tmed	Tc. Baja	Tc. Alta	T.Optima	
RIO GRANDE	PALPA CAMPAÑA 2025-2026	REPOSO VEGETATIVO													29.8	13.6	0.0	21.7	0°C	10°C	0° - 10°C.	
		HINCHAZON DE YEMAS														28.9	11.0	0.0	20.0	5°C	20°C	10° - 15°C.
		APERTURA DE YEMAS														28.8	9.8	0.0	19.3	10°C	25°C	15° - 20°C.
		BOTO FLORAL														29.0	9.8	0.0	19.4	12°C	28°C	18° - 22°C.
		FLORACION														28.1	10.4	0.0	19.3	15°C	30°C	20° - 25°C.
		FRUCTIFICACION														33.0	16.0	9.2	24.5	18°C	35°C	22° - 28°C.
		MADURACION													35.1	19.4	0.0	27.3	20°C	35°C	25° - 30°C.	



AREQUIPA

En la estación CO-Aplao, el cultivo de arroz (var. Tinajones) continuo en fase de maduración córnea. Durante la semana, las temperaturas cálidas favorecieron el proceso de secado del grano, permitiendo el avance de esta etapa fenológica.



VALLE DE MAJES
MONITOREO DEL CULTIVO DE ARROZ
ESTACIÓN CO APLAO: FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ VARIEDAD TINAJONES
Siembra: 24/10/2025

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	FENOLOGÍA												CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
			INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	T. Máx	T. Min.	Pp.	T. med.	TC Bajo	TC Alta	T. Optima
CO APLAO	VALLE DE MAJES	EMERGENCIA													27.2	9.6	0.0	18.4	10.0	39	30.0
		PLÁNTULA	24/10/25	31/10/25											29.1	12.5	0.0	20.8			
		MACOLLAR	01/11/25	08/12/25											29.4	14.1	0.0	21.8			
		ELONGACIÓN DE TALLO	09/12/25	08/01/26											30.5	15.7	0.0	23.1	12.0	39	28.0
		INICIO DE PANOJA	09/01/26	12/01/26											30.5	17.5	3.3	24.0			
		DESARROLLO DE PANOJA	13/01/26	18/01/26											29.8	18.6	3.3	24.2			
		FLORACIÓN	19/01/26	07/02/26											30.7	19.3	3.3	25.0	15.0	39	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA	08/02/26	28/03/26											31.3	20.5	8.0	25.9			
		MADURACIÓN PASTOSA	01/03/26	11/03/26											31.5	18.4	0.0	25.0	12.0	39	30.0
		MADURACIÓN Córnea	12/03/26												30.9	18.2	0.0	24.5			



Estación Aplao, arroz en maduración córnea