

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 17 al 23 junio del 2025

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.



SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".


Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manítí, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración. Se registró promedios de temperatura máxima de 30.8°C y mínima de 23.9°C; las precipitaciones fueron bajo sus valores normales, con acumulados de 27.1mm. Las condiciones climáticas fueron adecuadas para el desarrollo del cultivo, sin incidencia de plagas ni enfermedades.



Estación Manítí, cacao en fase de maduración.



MANITÍ																											
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																											
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLOGÍCAS DE CACAO																											
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta			
		Reposo vegetativo																				18.0	21.0	32.0	35.0		
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06- 2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Manití, altitud 125msnm)	Botón Floral																			18.0	21.0	32.0	35.0			
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0			
		Fructificación																			18.0	21.0	32.0	35.0			
		Maduración	15/4/25																30.8	23.9	27.1	27.4	18.0	21.0	32.0	35.0	


CACAO

LORETO

En la estación Mazán, el cultivo de pijuayo (var. Rojo) se encuentra en fase de floración. Durante la semana, se registró promedios de temperaturas máxima de 30.8°C y mínimas de 24.0°C; las precipitaciones fueron bajo sus valores normales, con acumulados de 18.2 mm. Las condiciones climáticas fueron beneficiosas para el desarrollo del cultivo.



Estación Mazán, pijuayo en fase de floración.




		MAZAN MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJAYO ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJAYO																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																							
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb		T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	01/01/25	08/04/25														29.60	23.70	173.60	26.70	14.0	24.0	28.0	35.0
		Espata	09/04/25	04/05/25														31.70	24.40	31.5	28.10	14.0	24.0	28.0	35.0
		Inflorescencia	05/05/25	02/06/25														28.6	23.1	54.6	25.9	14.0	24.0	28.0	35.0
		Floración	03/06/25															30.8	24.0	18.2	27.4	14.0	24.0	28.0	35.0
		Fructificación																				14.0	24.0	28.0	35.0
		Maduración																				14.0	24.0	28.0	35.0

LORETO

En la estación Puerto Almendras, el cultivo de camu camu (var. HBK MC Vaugh) continuó en fase de maduración, encontrándose próximo a la cosecha. Durante la semana, se registró promedios de temperaturas máxima de 31.5°C y mínimas de 23.3°C; las precipitaciones estuvieron bajo sus valores normales, con acumulados de 28.2 mm.




Estación Puerto Almendras, camu camu en fase de maduración.



PUERTO ALMENDRAS																											
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU																											
ESTACIÓN PUERTO ALMENDRAS: FASES FENOLOGICAS CAMU CAMU																											
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLOGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta			
Puerto Almendras (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 14-05-2024)	Localidad de Puerto Almendras (río Nanay. Altitud 93msnm)	Reposo vegetativo	30/09/24	27/01/25														33	23.3	87.9	28.2	15.0	21.0	28.0	35.0		
		Hinchazón de yemas	28/01/25	30/01/25														32.5	23.2	139.9	27.8	15.0	21.0	28.0	35.0		
		Apertura de yemas florales	31/01/25	01/02/25														32.5	23.2	139.9	27.8	15.0	21.0	28.0	35.0		
		Botón floral	01/02/25	01/02/25														31.7	23.5	77.8	27.6	15.0	21.0	28.0	35.0		
		Floración	02/02/25	08/04/25														30.0	23.6	38.6	26.8	15.0	21.0	28.0	35.0		
		Fructificación	09/04/25	04/05/25														32.3	23.9	57.2	28.1	15.0	21.0	28.0	35.0		
		Maduración	05/05/25														31.50	23.30	28.20	27.40	15.0	21.0	28.0	35.0			

LORETO

En la estación San Roque, el cultivo de plátano (var. Bellaco) continuó en fructificación, desarrollándose adecuadamente. Durante la semana se registró promedios de temperaturas máxima de 31.9°C y mínimas de 23.0°C; las precipitaciones fueron inferiores a sus valores normales, alcanzando acumulados de 3.3mm.




Estación San Roque, plátano en fase de fructificación.

SAN ROQUE																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO																										
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta		
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 15-05-2023)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	22/05/23	30/09/23														31.5	22.9	154.9	27.2	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Crecimiento vegetativo	01/10/23	28/01/24															32.2	23.1	113.2	27.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Inflorescencia	29/01/24																34.0	23.4	0.1	28.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Floración																	35.2	24.2	17.5	29.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Fructificación	16/09/24																31.9	23.0	3.3	27.5	15.0	20.0	32.0	35.0
		Maduración																					15.0	20.0	32.0	35.0

PLÁTANO

AMAZONAS

En la estación El Palto, las temperaturas máximas (23.9°C) y mínimas (16.4°C) se mantuvieron dentro de los rangos normales, con un acumulado de precipitaciones de 26.4 mm, condiciones que favorecieron el desarrollo del café (var. Geisha), el cual continuó en fase de crecimiento vegetativo, presentando buen estado.




CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													26.2	16.8	1330.5	21.5
				HINCHAZÓN DE YEMAS																
				BOTÓN FLORAL																
				FLORACIÓN																
				FRUCTIFICACIÓN																
				MADURACIÓN																

SAN MARTÍN

En la estación Pacayzapa, el cultivo de café (var. Catimor) continuó con las cosechas finales, presentando buen estado. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas entre 30.6 y 25.0 °C (por debajo de su normal), y mínimas entre 20.0 y 17.8 °C, junto con precipitaciones acumuladas de 36.9 mm, lo que favoreció la maduración de los últimos granos. Se apreció alta incidencia de roya en variedades susceptibles. En algunas plantas se apreció botones florales.



Estación Pacayzapa, café en fase de maduración.



Estación Pacayzapa, café en fase de maduración.


MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMIC					
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2022)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0	
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2024	7/08/2024														31.3	24.4	17.4	7.7	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	8/08/2024	15/08/2024														31.6	24.5	17.4	24.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN	16/08/2024	9/09/2024														33.1	25.1	17.0	2.4	10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN	10/09/2024	5/01/2025														30.7	25.3	19.8	21.7	10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN	6/01/25															28.0	23.6	19.2	36.9	10.0	18.0	22.0	30.0

SAN MARTÍN

En la estación Pilluana, el cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración, realizándose labores de cosecha. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 35.0 y 28.2°C en la máxima, y entre 21.4 y 19.2°C en la mínima, ambas por encima de sus normales; además de precipitaciones con un acumulado de 11.2 mm, condiciones que favorecieron el desarrollo de las mazorcas. Se reportó mayor incidencia de enfermedades.



Estación Pilluana, cacao en fase de maduración.



MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO															34.8	28.0	21.2	46.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	11/01/2025	20/01/2025													36.2	28.9	21.6	1.4	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	21/01/2025	31/01/2025													34.9	28.1	21.2	50.1	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	1/02/2025	28/04/2025													33.2	26.7	20.1	26.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	29/04/2025														32.0	26.4	20.7	11.2	15.0	23.0	25.0	32.0


CACAO

SAN MARTÍN

En estación Pachiza, las plantaciones de cacao (var. CCN-51) continuaron en fase de maduración. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 34.8 y 33.8°C en la máxima y de 20.2 y 19.8°C en la mínima, además de escasas de lluvias (11.0 mm), condiciones que podrían afectar el normal desarrollo de las plantas.



Estación de Pachiza, cacao en fase de maduración.




MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+	
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO															35.7	27.9	20.1	40.8	15.0	23.0	25.0	32.0	
		BOTÓN FLORAL	14/01/2025	23/01/2025														36.1	28.1	20.0	47.8	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	24/01/2025	2/02/2025														35.5	27.9	20.2	51.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	3/02/2025	02/02025														35.5	27.8	20.0	45.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	03/05/2025															34.4	27.2	20.0	11.0	15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

En la estación Moyobamba (Alto Mayo), el cultivo de arroz (var. Valor) entraron a la fase de desarrollo de panoja, con buen estado. Las condiciones climáticas registraron temperaturas máximas entre 30.0 y 25.0°C, mínimas entre 20.2 y 18.6°C, y precipitaciones de 34.6 mm. Los días soleados que se presentaron en este periodo favorecieron la reproducción de las plantas.



Estación Moyobamba, arroz en fase de desarrollo de panoja.

MONITOREO ARROZ VALLE DEL ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tc baja	Top -	Top +	Tcalta	
Moyobamba	Alto Mayo (zna productor a, altitud 860 m, clima templado)	EMERGENCIA																			10.0	20.0	35.0	45.0	
		PLÁNTULA	12/04/2025	30/04/2025														29.0	24.7	20.4	73.2	16.0	25.0	28.0	35.0
		MACOLLAJE	1/05/2025	23/05/2025														28.9	24.3	19.6	1.1	16.0	25.0	28.0	35.0
		ELONGACIÓN DEL TALLO	24/05/2025	11/06/2025														28.5	23.7	18.9	5.2	16.0	25.0	28.0	35.0
		INICIO DE PANOJA	12/06/2025	17/06/2025														27.1	23.4	19.7	10.2	12.0	30.0	31.0	45.0
		DESARROLLO DE PANOJA	18/06/2025															27.6	23.6	19.6	34.6	16.0	25.0	31.0	33.0
		FLORACIÓN																				15.0	20.0	25.0	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA																				22.0	30.0	33.0	35.0
		MADURACIÓN PASTOSA																				22.0	30.0	33.0	35.0
MADURACIÓN CÓRNEA																				22.0	30.0	33.0	35.0		


ARROZ

SAN MARTÍN

En la estación La Unión, el cultivo de maíz amarillo duro (var. Atlas 777) continuó en la fase de maduración córnea. Durante el período evaluado, se registraron temperaturas máximas entre 36.2 y 31.0 °C, y mínimas entre 23.8 y 21.0 °C, ambos valores por encima de sus normales. El cultivo mostró un estado regular debido a la escasa ocurrencia de lluvias en etapas críticas del cultivo, que no favorecieron el desarrollo de la mazorca.



Estación La Unión, maíz en fase de maduración córnea.




MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA	
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Tcalta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del Biavo) Maíz atlas 777 siembra 25/03/2025	Huallaga Central	EMERGENCIA	25/03/2025	31/03/2025																		10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm
		APARICIÓN DE HOJAS	1/04/2025	6/05/2025														34.5	28.8	23.0	11.2	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA	7/05/2025	16/05/2025														33.1	27.7	22.3	7.8	10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA	17/05/2025	25/05/2025														34.3	27.9	21.4	4.9	10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA	26/05/2025	6/06/2025														33.3	27.9	22.5	3.5	10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA	7/06/2025	16/06/2025														34.0	27.9	21.7	30.0	10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN CÓRNEA	17/06/2025															33.2	27.9	22.6	5.9	10.0	25.0	33.0	35.0	

CUSCO

En la estación Quebrada Yanatile, el cultivo de café (var. Catimor) continuó en fase de maduración al 100 %, en estado regular. Durante la semana, la temperatura máxima fue de 28.97°C y la mínima 16.65°C, sin presencia de precipitaciones, condiciones que fueron favorables para el proceso de maduración de lo cerezos del café. No obstante, debido a la floración desigual registrada previamente, la maduración de los cerezos se presenta de manera desuniforme.




Estación Quebrada Yanatile, café en fase de maduración.



REGIÓN CUSCO																				
MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ																				
ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR																				
FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
QUEBRADA	REPOSO VEGETATIVO																			
	HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
	BOTÓN FLORAL													32.39	17.37	3.4	24.88	15	25	18 - 22
	FLORACIÓN													33.12	17.34	2	25.23	15	28	18 - 24
	FRUCTIFICACIÓN													30.34	19.09	902.3	24.72	15	28	18 - 24
	MADURACIÓN													28.76	16.92	657.8	22.84	15	28	18 - 24

CAJAMARCA

En la estación Chirinos, las temperaturas se mantuvieron dentro de los rangos normales, con máxima de 21.4°C y mínima de 15.1°C, y un acumulado de precipitaciones de 11.4 mm, condiciones que favorecieron el proceso de maduración del café (var. Marsellesa), presentando buen estado.




Estación Chirinos, cultivo de café en fase de maduración.

CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													24.4	14.1	6.6	19.2
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	14.4	25.1	19.9
				BOTÓN FLORAL													25.6	14.8	33.2	20.2
				FLORACIÓN													24.9	15.2	39.7	20.1
				FRUCTIFICACIÓN													22.9	15.7	1137.8	19.3
				MADURACIÓN													22.2	15.4	191.0	18.8

CAJAMARCA

En la estación Chontali, se registraron temperaturas máximas ligeramente frías (22.8°C) y mínimas ligeramente cálidas (14.7°C), acompañadas de 8.5 mm de precipitación, lo que favoreció el avance del proceso de maduración del café (var. Catimor), impulsado por la humedad constante del suelo.



CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo secano)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													25.6	13.0	1.9	19.3
				HINCHAZÓN DE YEMAS													26.4	13.2	0.0	19.8
				BOTÓN FLORAL													26.3	14.0	28.8	20.2
				FLORACIÓN													25.9	14.8	40.8	20.4
				FRUCTIFICACIÓN													24.9	14.9	1502.9	19.9
				MADURACIÓN													23.0	14.9	103.4	18.9