

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 24 al 30 de junio del 2025

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manítí, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración. Se registró promedios de temperatura máxima de 29.7°C y mínima de 23.4°C, y precipitaciones acumuladas de 69.2mm. Las condiciones climáticas fueron favorables para las labores de cosecha realizadas durante ese periodo.



Estación Manítí, cacao en fase de maduración


MANITÍ																											
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																											
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																											
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO						
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta			
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Manítí, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0			
		Botón Floral																			18.0	21.0	32.0	35.0			
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0			
		Fructificación																			18.0	21.0	32.0	35.0			
		Maduración	15/4/25	30/6/25															29.7	23.4	69.2	26.6	18.0	21.0	32.0	35.0	

LORETO

En la estación Mazán, el cultivo de pijuayo (var. Rojo) se ubicó en fase de floración. Durante la semana, se registró promedios de temperaturas máxima de 29.7°C, mínimas de 23.4°C y temperatura media de 26.6°C. Las condiciones climáticas en este periodo no fueron favorables para el desarrollo del cultivo, debido a las constantes precipitaciones (acumulado de 106 mm).




Estación Mazán, pijuayo en fase de floración



MAZAN																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																										
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta		
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	01/01/25	08/04/25														29.60	23.70	173.60	26.70	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Espata	09/04/25	04/05/25														31.70	24.40	31.5	28.10	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Inflorescencia	05/05/25	02/06/25														28.6	23.1	54.6	25.9	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Floración	03/06/25															29.7	23.4	106.0	26.6	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Fructificación																				14.0	24.0	28.0	35.0	
		Maduración																			14.0	24.0	28.0	35.0		

LORETO

En la estación Puerto Almendras, el cultivo de camu camu (var. HBK MC Vaugh) continuó en fase de maduración, encontrándose próximo a la cosecha. Durante la semana, se registró promedios de temperaturas máxima de 30.6°C, mínimas de 23.0°C, temperatura media de 26.8°C, y precipitaciones con acumulados de 39.0mm.




Estación Puerto Almendras, Camu Camu

PUERTO ALMENDRAS																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU																									
ESTACIÓN PUERTO ALMENDRAS: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta	
Puerto Almendras (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 14-05-2024)	Localidad de Puerto Almendras (río Nanay. Altitud 93msnm)	Reposo vegetativo	30/09/24	27/01/25														33	23.3	87.9	28.2	15.0	21.0	28.0	35.0
		Hinchazón de yemas	28/01/25	30/01/25														32.5	23.2	139.9	27.8	15.0	21.0	28.0	35.0
		Apertura de yemas florales	31/01/25	01/02/25														32.5	23.2	139.9	27.8	15.0	21.0	28.0	35.0
		Botón floral	01/02/25	01/02/25														31.7	23.5	77.8	27.6	15.0	21.0	28.0	35.0
		Floración	02/02/25	08/04/25														30.0	23.6	38.6	26.8	15.0	21.0	28.0	35.0
		Fructificación	09/04/25	04/05/25														32.3	23.9	57.2	28.1	15.0	21.0	28.0	35.0
		Maduración	05/05/25														30.60	23.00	39.00	26.80	15.0	21.0	28.0	35.0	

LORETO

En la estación San Roque, el cultivo de plátano (var. Bellaco) continuó en fructificación, desarrollándose inadecuadamente, por la baja fertilidad de los suelos en la zona. Durante la semana se registró promedios de temperaturas máximas de 30.7°C, mínimas de 22.7°C, temperatura media de 26.7°C, y precipitaciones con acumulados de 59.4mm.




Estación San Roque, plátano en fase de fructificación

SAN ROQUE																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO																										
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta		
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 15-05-2023)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	22/05/23	30/09/23														31.5	22.9	154.9	27.2	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Crecimiento vegetativo	01/10/23	28/01/24														32.2	23.1	113.2	27.7	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Inflorescencia	29/01/24															34.0	23.4	0.1	28.7	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Floración																35.2	24.2	17.5	29.7	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Fructificación	16/09/24																30.7	22.7	59.4	26.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Maduración																			15.0	20.0	32.0	35.0		

PLÁTANO

AMAZONAS

En la estación El Palto, las temperaturas máximas (24.1°C) y mínimas (16.1°C) se mantuvieron dentro de los rangos normales, con un acumulado de precipitaciones de 27.4 mm, condiciones que favorecieron el desarrollo del café (var. Geisha). El cual continuó en fase de crecimiento vegetativo, presentando buen estado.




CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													26.1	16.8	1357.9	21.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS																
				BOTÓN FLORAL																
				FLORACIÓN																
				FRUCTIFICACIÓN																
				MADURACIÓN																

SAN MARTÍN

En la estación Pacayzapa, culminó la fase de maduración del cultivo de café (var. Catimor), realizando las últimas cosechas, con rendimientos cercanos a sus normales. Las plantas iniciaron la foliación e hinchazón de yemas, favorecidas por las lluvias. Se observó proliferación de roya en variedades susceptibles.




Estación Pacayzapa, café culminando fase de maduración



MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2022)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0	
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2024	7/08/2024														31.3	24.4	17.4	7.7	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	8/08/2024	15/08/2024														31.6	24.5	17.4	24.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN	16/08/2024	9/09/2024														33.1	25.1	17.0	2.4	10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN	10/09/2024	5/01/2025														30.7	25.3	19.8	21.7	10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN	6/01/25	30/06/2025													30.2	24.2	18.2	50.5	10.0	18.0	22.0	30.0	

SAN MARTÍN

En la estación Pilluana, el cacao (var. CCN-51) se encontró culminando la fase de maduración, realizándose las cosechas finales. Las precipitaciones favorecieron el desarrollo de los frutos. Se observó mayor incidencia de enfermedades como la monilia y mancha negra.




Estación Pilluana, cacao en fase de maduración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+	
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO															34.8	28.0	21.2	46.3	15.0	23.0	25.0	32.0	
		BOTÓN FLORAL	11/01/2025	20/01/2025														36.2	28.9	21.6	1.4	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	21/01/2025	31/01/2025														34.9	28.1	21.2	50.1	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	1/02/2025	28/04/2025														33.2	26.7	20.1	26.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	29/04/2025	30/06/2025														33.6	26.8	19.9	28.7	15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

En estación Pachiza, el cultivo de cacao (var. CCN-51) se encontró culminando la fase de maduración. Las precipitaciones de la ultima semana favorecieron la maduración del fruto para las ultimas cosechas.




Estación de Pachiza, cacao finalizando fase de maduración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+	
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO															35.7	27.9	20.1	40.8	15.0	23.0	25.0	32.0	
		BOTÓN FLORAL	14/01/2025	23/01/2025														36.1	28.1	20.0	47.8	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	24/01/2025	2/02/2025														35.5	27.9	20.2	51.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	3/02/2025	02/02025														35.5	27.8	20.0	45.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	03/05/2025	30/06/2025														34.9	27.5	20.1	16.0	15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

En la estación Moyobamba, el cultivo de arroz (var. Valor) inició la fase de floración, con buen estado. Se registraron lluvias importantes que permitieron la recarga de las fuentes que agua que abastece de riego a la parcela, además, los días soleados favorecieron una mayor formación de la espiga.




Estación Moyobamba, arroz en fase de floración

MONITOREO ARROZ VALLE DEL ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
Moyobamba	Alto Mayo (zna productor a, altitud 860 m, clima templado)	EMERGENCIA																			10.0	20.0	35.0	45.0	
		PLÁNTULA	12/04/2025	30/04/2025														29.0	24.7	20.4	73.2	16.0	25.0	28.0	35.0
		MACOLLAJE	1/05/2025	23/05/2025														28.9	24.3	19.6	1.1	16.0	25.0	28.0	35.0
		ELONGACIÓN DEL TALLO	24/05/2025	11/06/2025														28.5	23.7	18.9	5.2	16.0	25.0	28.0	35.0
		INICIO DE PANOJA	12/06/2025	17/06/2025														27.1	23.4	19.7	10.2	12.0	30.0	31.0	45.0
		DESARROLLO DE PANOJA	18/06/2025	25/06/2025														27.6	23.6	19.6	34.6	16.0	25.0	31.0	33.0
		FLORACIÓN	26/06/2025															28.9	24.2	19.4	32.3	15.0	20.0	25.0	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA																				22.0	30.0	33.0	35.0
		MADURACIÓN PASTOSA																				22.0	30.0	33.0	35.0
MADURACIÓN CÓRNEA																				22.0	30.0	33.0	35.0		

ARROZ

SAN MARTÍN

En la estación La Unión, el cultivo de maíz amarillo duro (var. Atlas 777) continuó en la fase de maduración córnea, con estado regular, debido a la escasa ocurrencia de lluvias en épocas críticas del cultivo, que no favorecieron el desarrollo de la mazorca. Se registraron precipitaciones significativas, sin embargo en esta etapa del cultivo ya no fueron determinantes.



Estación La Unión, maíz en fase de maduración córnea

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA	
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Tcalta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del Biavo) Maíz atlas 777 siembra 25/03/2025	Huallaga Central	EMERGENCIA	25/03/2025	31/03/2025																		10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm
		APARICIÓN DE HOJAS	1/04/2025	6/05/2025														34.5	28.8	23.0	11.2	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA	7/05/2025	16/05/2025														33.1	27.7	22.3	7.8	10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA	17/05/2025	25/05/2025														34.3	27.9	21.4	4.9	10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA	26/05/2025	6/06/2025														33.3	27.9	22.5	3.5	10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA	7/06/2025	16/06/2025														34.0	27.9	21.7	30.0	10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN Córnea	17/06/2025															34.0	27.9	21.8	29.6	10.0	25.0	33.0	35.0	


MAIZ

JUNÍN



Cultivo de café en fase de fructificación

La estación Pichanaki, reportó una temperatura media mensual de 25.8 °C y un total de precipitaciones mensuales de 82.8 mm. El café (var. Catuay) continuó en fructificación, con nuevas floraciones, influenciado por lluvias superiores al promedio histórico para junio 28.1 mm. El cacao (var. CCN 51) continuó en fructificación, sin avance hacia la maduración, asociado principalmente a deficiencias en el manejo de enfermedades como “Moniliasis” y “Mazorca negra”.



Cultivo de cacao en fase de fructificación

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP	PP REQUERDIO	Inicio	fin
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS											31.4	21.5	26.5	381.1	85.6	3/03/2025	20/04/2025
		BOTON FLORAL											31.9	20.5	26.2	17.6	46.7	21/04/2025	22/04/2025
		FLORACION											30.7	21.4	26.0	22.4	95.7	28/04/2025	6/05/2025
		FRUCTIFICACION											31.7	20.6	26.2	93.1	576.3	12/05/2025	30/06/2025
		MADURACION																	


MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2024-2025																			
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic							
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL																	
		FLORACION																	
		FRUCTIFICACION																	
		MADURACION																	

JUNÍN

En la estación Puerto Ocopa, los cultivos de cacao (var. CCN 51 y criollo) estuvieron en fase de maduración. Durante junio se llevaron a cabo las cosechas y el secado de granos, y se registraron 102.3 mm de precipitación mensual que contribuyó a la buena turgencia de las mazorcas. La temperatura media mensual fue de 25.6 °C, dentro del rango óptimo, que favoreció una maduración continua de los frutos y un desarrollo fisiológico homogéneo. Las temperaturas semanales oscilaron entre 20.0 °C y 32.8 °C, con un acumulado de precipitaciones de 44.1 mm.



Estación Puerto Ocopa, cultivo de cacao en fase de maduración




MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2024-2025														
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic
Puerto Ocopa	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL												
		FLORACION												
		FRUCTIFICACION												
		MADURACION												


CACAO

PUNO

En la estación Tambopata, el cultivo de café se ubicó en fase de maduración, mostrando buen estado, realizándose cosecha de granos a partir del 25 de junio. Durante la semana, se registraron precipitaciones por encima de su normal, favoreciendo el proceso de maduración. No se reportó incidencia de enfermedades fúngicas.




Estación Tambopata, café en fase de maduración



CUSCO

En la estación Quebrada Yanatile, el cultivo de café (var. Catimor) continuó en fase de maduración al 100%, en estado regular. Durante la semana, se registró temperatura máxima de 28.92°C, mínima de 16.80°C, precipitaciones acumuladas de 8.2mm, condiciones óptimas para culminar el proceso de maduración de los cerezos del café. No se descarta la proliferación de Broca del café (*Hypothenemus hampei*), minadores de hoja, roya del café (*Hemileia vastatrix*) y ojo de gallo (*Mycena citricolor*).




Estación Quebrada Yanatile, café en fase de maduración

CAMPANA 2024 - 2025																				
REGIÓN CUSCO																				
MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ																				
ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR																				
FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
QUEBRADA	REPOSO VEGETATIVO																			
	HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
	BOTÓN FLORAL													32.39	17.37	3.4	24.88	15	25	18 - 22
	FLORACIÓN													33.12	17.34	2	25.23	15	28	18 - 24
	FRUCTIFICACIÓN													30.34	19.09	902.3	24.72	15	28	18 - 24
	MADURACIÓN													28.87	16.6	41	22.74	15	28	18 - 24

CAJAMARCA


En la estación Chirinos, las temperaturas se mantuvieron dentro de los rangos normales, con máxima de 21.4°C y mínima de 15.1°C, y un acumulado de precipitaciones de 28.9 mm, condiciones que favorecieron el proceso de maduración del café (var. Marsellesa), presentando buen estado. Las cosechas se realizaron los días del 10 al 12 de junio de 2025.



CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA	10,11 y 12/06/2025 Rend.387kg	REPOSO VEGETATIVO													24.4	14.1	6.6	19.2
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	14.4	25.1	19.9
				BOTÓN FLORAL													25.6	14.8	33.2	20.2
				FLORACIÓN													24.9	15.2	39.7	20.1
				FRUCTIFICACIÓN													22.9	15.7	1137.8	19.3
				MADURACIÓN													22.1	15.4	219.9	18.7

CAJAMARCA

En la estación Chontali, se registraron temperaturas máximas de 22.4°C y mínimas de 14.1°C, acompañadas de 21.8 mm de precipitación, lo que favoreció el avance del proceso de maduración del café (var. Catimor), impulsado por la humedad constante del suelo.



CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo secano)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													25.6	13.0	1.9	19.3
				HINCHAZÓN DE YEMAS													26.4	13.2	0.0	19.8
				BOTÓN FLORAL													26.3	14.0	28.8	20.2
				FLORACIÓN													25.9	14.8	40.8	20.4
				FRUCTIFICACIÓN													24.9	14.9	1502.9	19.9
				MADURACIÓN													22.9	14.8	125.2	18.8