PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Con Punche Perú

Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 08 al 14 de julio del 2025

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:
Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:
Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:
Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:
Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.

SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":
Ingresa al siguiente link para mas información :https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manití, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración. Se registró promedios de temperatura máxima de 30.4°C y mínima de 23.1°C. Las precipitaciones acumularon un total de 16.7 mm (inferior a sus valores normales). Las condiciones climáticas fueron favorables para la maduración del fruto.

Estación Manití, cacao en fase de maduración



MANITÍ
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Manití, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Botón Floral																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Fructificación																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Maduración	15/4/25														30.4	23.1	16.7	26.8	18.0	21.0	32.0	35.0

CACAO

LORETO

En la estación Mazán, el cultivo de pijuayo (var. Rojo) continuó en estado de reposo vegetativo. Se registró promedios de temperaturas máxima de 30.5°C, mínimas de 23.1°C, y precipitaciones con acumulados de 8.8 mm.



Estación Mazán, pijuayo en estado de reposo vegetativo

PIJUAYO

MAZAN
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb		T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	07/07/25															30.50	23.10	8.80	26.80	14.0	24.0	28.0	35.0
		Espata																				14.0	24.0	28.0	35.0
		Inflorescencia																				14.0	24.0	28.0	35.0
		Floración																				14.0	24.0	28.0	35.0
		Fructificación																				14.0	24.0	28.0	35.0
		Maduración																				14.0	24.0	28.0	35.0

LORETO

En la estación Puerto Almendras, el cultivo de camu camu (var. HBK MC Vaugh) inició el reposo vegetativo. Se registraron promedios de temperaturas máxima de 31.1°C, mínimas de 22.0°C, y precipitaciones con acumulados de 8.5 mm.



Estación Puerto Almendras, camu camu en estado de reposo vegetativo

PUERTO ALMENDRAS
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU
ESTACIÓN PUERTO ALMENDRAS: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta
Puerto Almendras (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 14-05-2024)	Localidad de Puerto Almendras (río Nanay. Altitud 93msnm)	Reposo vegetativo	14/07/25														31.1	22.0	8.5	26.6	15.0	21.0	28.0	35.0
		Hinchazón de yemas																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Apertura de yemas florales																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Botón floral																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Floración																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Fructificación																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Maduración																			15.0	21.0	28.0	35.0

LORETO

En la estación San Roque, el cultivo de plátano (var. Bellaco) continuó en fructificación, desarrollándose inadecuadamente por la baja fertilidad de los suelos. Se registró promedios de temperaturas máximas de 31.7°C, mínimas de 21.9°C, y precipitaciones con acumulados de 27.3 mm.

SAN ROQUE
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO
ESTACIÓN SAN ROQUE: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN



Estación San Roque, plátano en fase de fructificación

SAN ROQUE
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA			CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 15-05-2023)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	22/05/23	30/09/23	31.5	22.9	154.9	27.2	15.0	20.0	32.0	35.0
		Crecimiento vegetativo	01/10/23	28/01/24	32.2	23.1	113.2	27.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Inflorescencia	29/01/24		34.0	23.4	0.1	28.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Floración			35.2	24.2	17.5	29.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Fructificación	16/09/24		31.2	20.6	15.0	25.9	15.0	20.0	32.0	35.0
		Maduración							15.0	20.0	32.0	35.0

AMAZONAS

En la estación El Palto, el cultivo de café (var. Geisha) continuó en crecimiento vegetativo, con buen estado. Durante la semana, las temperaturas máximas (24.8°C) y mínimas (15.3°C) fueron ligeramente frías, sin ocurrencia de lluvias. No obstante, gracias a las últimas lluvias acumuladas que mantienen el suelo con humedad, se ha podido continuar con el desarrollo del cultivo.



CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													26.1	16.7	1367.8	21.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS																
				BOTÓN FLORAL																
				FLORACIÓN																
				FRUCTIFICACIÓN																
				MADURACIÓN																

SAN MARTÍN

En la estación Pacayzapa, el cultivo de café (var. Catimor) se encontró en foliación y, en algunos casos, en hinchazón de yemas. Durante la semana, se registraron temperaturas promedio máxima de 29.3°C y mínima de 16.7°C. Las condiciones climáticas de los últimos días, podrían generar estrés hídrico en el cultivo debido a la ausencia de lluvias, afectando la producción de nuevas yemas.



Estación Pacayzapa, café en fase de hinchazón de yemas

CAFÉ

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMIC			
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2012)	Alto Mayo (altiyud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2025														27.2	21.6	15.9	21.3	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL																			10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN																			10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN																			10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN																			10.0	18.0	22.0	30.0

SAN MARTÍN

En la estación Pilluana, el cacao (var. CCN-51) se encontró finalizando la fase de maduración, realizándose las cosechas finales. Las temperaturas máximas estuvieron entre 32.0°C y 35.0°C, y las mínimas entre 16.2°C y 18.2°C. La ausencia de precipitaciones podría estar causando estrés hídrico en el cultivo.





Estación Pilluana, cacao en fase final de maduración

CACAO

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO															34.8	28.0	21.2	46.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	11/01/2025	20/01/2025													36.2	28.9	21.6	1.4	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	21/01/2025	31/01/2025													34.9	28.1	21.2	50.1	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	1/02/2025	28/04/2025													33.2	26.7	20.1	26.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	29/04/2025														31.1	23.9	16.6	19.0	15.0	23.0	25.0	32.0

SAN MARTÍN

En la estación Pachiza, el cultivo de cacao (var. CCN-51) se encontró culminando la fase de maduración. Las temperaturas máximas estuvieron entre 34.0°C y 35.0°C, y mínimas entre 19.0°C y 20.6°C. Las precipitaciones estuvieron ausentes, lo que podría afectar al cultivo, reduciendo la calidad de las cosechas.



Estación de Pachiza, cacao finalizando fase de maduración

CACAO

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO															35.7	27.9	20.1	40.8	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	14/01/2025	23/01/2025													36.1	28.1	20.0	47.8	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	24/01/2025	2/02/2025													35.5	27.9	20.2	51.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	3/02/2025	02/02025													35.5	27.8	20.0	45.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	03/05/2025														33.1	26.2	19.3	25.6	15.0	23.0	25.0	32.0

SAN MARTÍN

En la estación Moyobamba, el cultivo de arroz (var. Valor) continuó en fase de maduración lechosa, con buen estado. Se registraron temperaturas máximas entre 27.0°C y 29.8°C, mínimas entre 16.0°C y 18.0°C, sin precipitaciones, condiciones que favorecieron el desarrollo reproductivo del cultivo, debido a la alta radiación de los últimos días



Estación Moyobamba, arroz en fase de maduración lechosa

MONITOREO ARROZ VALLE DEL ALTO MAYO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
Moyobamba	Alto Mayo (zna productora, altitud 860 m, clima templado)	EMERGENCIA																			10.0	20.0	35.0	45.0
		PLÁNTULA	12/04/2025	30/04/2025													29.0	24.7	20.4	73.2	16.0	25.0	28.0	35.0
		MACOLLAJE	1/05/2025	23/05/2025													28.9	24.3	19.6	1.1	16.0	25.0	28.0	35.0
		ELONGACIÓN DEL TALLO	24/05/2025	11/06/2025													28.5	23.7	18.9	5.2	16.0	25.0	28.0	35.0
		INICIO DE PANOJA	12/06/2025	17/06/2025													27.1	23.4	19.7	10.2	12.0	30.0	31.0	45.0
		DESARROLLO DE PANOJA	18/06/2025	25/06/2025													27.6	23.6	19.6	34.6	16.0	25.0	31.0	33.0
		FLORACIÓN	26/06/2025	5/07/2025													28.9	24.2	19.4	32.3	15.0	20.0	25.0	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA	6/07/2025														26.9	21.9	16.9	15.2	22.0	30.0	33.0	35.0
		MADURACIÓN PASTOSA																			22.0	30.0	33.0	35.0
		MADURACIÓN CÓRNEA																			22.0	30.0	33.0	35.0

SAN MARTÍN

En la estación La Unión, el cultivo de maíz amarillo duro (var. Atlas 777) continuó en fase de maduración córnea, con estado regular, ya que las lluvias no fueron oportunas en la etapa crítica del cultivo, sin embargo, favorecieron las labores de cosecha. Se registraron temperaturas máximas entre 31.4°C y 33.8°C, mínimas entre 18.6°C y 21.0°C.



Estación La Unión, maíz en fase de maduración córnea

MAIZ

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Tcalta	PP POR ETAPA
La Unión (Valle del Biavo) Maiz atlas 777 siembra 25/03/2025	Huallaga Central	EMERGENCIA	25/03/2025	31/03/2025																	10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm
		APARICIÓN DE HOJAS	1/04/2025	6/05/2025													34.5	28.8	23.0	11.2	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA	7/05/2025	16/05/2025													33.1	27.7	22.3	7.8	10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA	17/05/2025	25/05/2025													34.3	27.9	21.4	4.9	10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA	26/05/2025	6/06/2025													33.3	27.9	22.5	3.5	10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA	7/06/2025	16/06/2025													34.0	27.9	21.7	30.0	10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN CÓRNEA	17/06/2025														34.0	27.9	21.8	29.6	10.0	25.0	33.0	35.0	

HUÁNUCO

En la estación Aucayacu, el cultivo de cacao (var. CCN51) inició la fase de fructificación, con buen estado. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas promedio de 30.2°C, mínimas de 19.7°C. con un acumulado de precipitaciones de 1.7 mm. Se registró una incidencia del 7% de *Moniliophthora perniciosa (*escoba de bruja).



Estación Aucayacu, cacao en fase de fructificación

CACAO

MONITOREO CACAO ZONA DE PRODUCCIÓN AUCAYACU

														semana del 08 al 14 de julio				
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	PP	T media	ÓPTIMO TÉRMICO
AUCAYACU	JOSE CRESPO Y CASTILLO	BOTON FLORAL																	RANGO DE TEMPRERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C
		FLORACION																	Entre 10-15 °C varios procesos fisiologicos se inhiben,
		FRUCTIFICACION													30.2	19.7	1.7	25.0	Temperatura minima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

HUÁNUCO

En la estación Tulumayo, el cultivo de cacao (var. CCN 51) continuó en fase de fructificación, con estado regular. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas promedio de 30.8°C, mínimas de 18.6°C, sin ocurrencia de precipitaciones. Se registró una incidencia del 6% de *Carmenta foraseminis* (mazorquero del cacao).



Estación Tulumayo, cacao en fase de fructificación

CACAO

MONITOREO CACAO ZONA DE PRODUCCIÓN TULUMAYO

														semana del 08 al 14 de julio				
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	PP	T media	ÓPTIMO TÉRMICO
TULUMAYO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	BOTON FLORAL																	RANGO DE TEMPRERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C
		FLORACION																	Entre 10-15 °C varios procesos fisiologicos se inhiben,
		FRUCTIFICACION													30.8	18.6	0.0	24.7	Temperatura minima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

HUÁNUCO

En la estación Huánuco, el cultivo de palto (var. Hass) se mantuvo en fase de fructificación. Durante la semana, se registraron temperaturas promedio máximas de 26.4°C y mínimas de 9.2°C. Las precipitaciones estuvieron ausentes, sin embargo, se ha aplicado un riego complementario para el normal desarrollo de los frutos. Se registró una incidencia del 10% de queresa *Hemiberlesia lataniae*.



Estación Huánuco, palto en fase de fructificación

PALTO

MONITOREO PALTO VAR. HASS CP. HUANUCO 2024-2025

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	semana del 08 al 14 de julio Tmax	Tmin	PP	T media	ÓPTIMO TÉRMICO
HUANUCO	HUANUCO	FOLIACION																	Rango de temperaturas max 25.5°C, T min 9.9°C, Tprom 17.6°C
		FLORACION																	Rango de temperaturas max 25.9°C, T min 10.6°C, Tprom 18.3°C
		FRUCTIFICACION													26.4	9.2	0.0	17.8	Rango de temperaturas max 25.6°C, T min 10.5°C, Tprom 18.1°C
		MADURACION																	Rango de temperaturas max 24.5°C, T min 9.0°C, Tprom 16.8°C

HUÁNUCO

En la estación La Divisoria, el cultivo de café (var. Catimor) permaneció en fase de maduración, con estado regular. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas promedio de 22.1°C y mínimas de 14.8°C, sin ocurrencia de precipitaciones. Se registró una incidencia del 50% de *Mycena citricolor* (Ojo de gallo).



Estación La Divisoria, cafeto en fase de maduración

MONITOREO CAFE ZONA DE PRODUCCIÓN LA DIVISORIA

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	semana del 08 al 14 de julio Tmax	Tmin	PP	T media	ÓPTIMO TÉRMICO
LA DIVISORIA	HERMILIO VALDIZAN	HINCHAZON DE YEMAS																	RANGO DE TEMPERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C
		BOTON FLORAL																	Entre 10-32 °C varios procesos fisiologicos se inhiben
		FLORACION																	Temperatura optima 21°C
		FRUCTIFICACION																	Temperatura minima absoluta critica 10 °C
		MADURACION													22.1	14.8	0	18.5	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

JUNÍN

En la estación Pichanaki, se registró una temperatura media de 26.4°C durante los primeros cinco días de la segunda decadiaria de julio. Esta superó el rango óptimo para el café (var. Catuay), pudiendo generar una maduración prematura de los frutos. En el cacao (var. CCN 51), las temperaturas registradas fueron adecuadas para el desarrollo del fruto. No se registraron lluvias, pudiendo afectar el llenado de frutos y generar caída prematura en ambos cultivos.

Cultivo de café en fase de fructificación



Cultivo de cacao en fase de fructificación

MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026

ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP	PP REQUERDIO
SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS											31.4	21.5	26.5	381.1	85.6
	BOTON FLORAL											31.9	20.5	26.2	17.6	46.7
	FLORACION											30.7	21.4	26.0	22.4	95.7
	FRUCTIFICACION											31.5	20.3	25.9	123.3	576.3

MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2024-2025

ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic
SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL										
	FLORACION										
	FRUCTIFICACION										
	MADURACION										

CAFÉ

CACAO

JUNÍN

En la estación Puerto Ocopa, el cultivo de cacao (var. CCN 51) inició la fase de floración, favorecido por la temperatura media de 26.5 °C, registrada durante los primeros cinco días de la segunda decadiaria de julio. La ausencia de lluvias, combinada con temperaturas nocturnas ligeramente elevadas, podría comprometer el proceso de cuajado y limitar la disponibilidad de agua en un momento crítico del desarrollo reproductivo.



Estación Puerto Ocopa, cacao en fase de floración

CACAO

MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL -2025

ZONA	FENOLOGÍA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic
SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL												
	FLORACION												
	FRUCTIFICACION												
	MADURACION												

CUSCO

En la estación Quebrada Yanatile, el cultivo de café (var. Catimor) permaneció en fase de botón floral, con estado regular. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 13.20°C y 28.73°C. La ausencia prolongada de lluvias podría aumentar el riesgo de aborto floral y limitar el desarrollo foliar y la formación de nuevos brotes, comprometiendo fases posteriores del cultivo.



Estación Quebrada Yanatile, café en fase de botón floral

DEPARTAMENTO CUSCO

MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ

ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR

FENOLOGÍA													CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
REPOSO VEGETATIVO																			
HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
BOTÓN FLORAL													28.14	13.63	0	20.89	15	25	18 - 22
FLORACIÓN																	15	28	18 - 24
FRUCTIFICACIÓN																	15	28	18 - 24
MADURACIÓN																	15	28	18 - 24

CAJAMARCA

En la estación Chirinos, el cultivo de café (var. Marsellesa) continuó en fase de maduración, con buen estado. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas normales (22.0°C) y mínimas ligeramente frías (13.6°C), con lluvias que alcanzaron los 11.2 mm, condiciones que favorecieron el proceso de maduración del café.



CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA	10,11 y 12/06/2025 Rend.387kg	REPOSO VEGETATIVO													24.4	14.1	6.6	19.2
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	14.4	25.1	19.9
				BOTÓN FLORAL													25.6	14.8	33.2	20.2
				FLORACIÓN													24.9	15.2	39.7	20.1
				FRUCTIFICACIÓN													22.9	15.7	1137.8	19.3
				MADURACIÓN													22.0	15.1	246.4	18.5

CAJAMARCA

En la estación Chontali, el cultivo de café (var. Catimor) permaneció en fase de maduración, con buen estado. Durante la semana, se registraron temperaturas promedio máximas de 23.1°C y mínimas de 12.5°C, con ausencia de lluvias, condiciones favorables para la maduración del fruto, así como su recolección y secado. Se realizaron cosechas con un rendimiento de 658 kg.



CAMPAÑA 2024 -2025				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo secano)	CATIMOR	04 y 05/07/25 630kg	REPOSO VEGETATIVO													25.6	13.0	1.9	19.3
				HINCHAZÓN DE YEMAS													26.4	13.2	0.0	19.8
			08,09 y 10/07/25 658kg	BOTÓN FLORAL													26.3	14.0	28.8	20.2
				FLORACIÓN													25.9	14.8	40.8	20.4
				FRUCTIFICACIÓN													24.9	14.9	1502.9	19.9
				MADURACIÓN													22.7	14.3	154.5	18.5

CAFÉ