

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 29 de julio al 04 de agosto del 2025

**Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM**

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manití, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración. Se registró promedios de temperatura máxima de 31.3°C y mínima de 23.5°C (cálidas). Las precipitaciones acumularon valores inferiores a su climatología. Las condiciones climáticas fueron favorables para el desarrollo de las mazorcas.




Estación Manatí, cultivo de cacao en maduración

MANITÍ																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																										
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLOGICAS DE CACAO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta		
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06- 2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Maniti, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0		
		Botón Floral																				18.0	21.0	32.0	35.0	
		Floración																				18.0	21.0	32.0	35.0	
		Fructificación																				18.0	21.0	32.0	35.0	
		Maduración	15/4/25																31.3	23.5	38.5	27.4	18.0	21.0	32.0	35.0

CACAO

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, las plantaciones de Pijuayo continuaron en reposo vegetativo con estado bueno. Durante el periodo, las condiciones térmicas diurnas registraron valores habituales a su climatología 31.3°C y nocturnas cálidas 23.6°C. Además, de lluvias sobre sus normales que acumularon 31.5 mm., favorables para el avance de la campaña agrícola.




Estación Mazán, cultivo de pijuayo en reposo vegetativo

MAZAN																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																										
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta		
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	07/07/25														31.30	23.60	31.50	27.50	14.0	24.0	28.0	35.0		
		Espata																			14.0	24.0	28.0	35.0		
		Inflorescencia																			14.0	24.0	28.0	35.0		
		Floración																			14.0	24.0	28.0	35.0		
		Fructificación																			14.0	24.0	28.0	35.0		
		Maduración																		14.0	24.0	28.0	35.0			

PIJUAYO

LORETO

En la estación San Roque, se registró temperaturas máximas y mínimas promedio entre 31°C y 23.2°C (noches cálidas) con lluvias (65.3 mm). Condiciones climáticas que continuaron favorables para el cultivo de plátano var. Bellaco que continuo en fructificación con estado regular su desarrollo está siendo lento debido a la baja fertilidad de los suelo.




SAN ROQUE																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO																										
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta		
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 15-05-2023)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	22/05/23	30/09/23													31.5	22.9	154.9	27.2	15.0	20.0	32.0	35.0		
		Crecimiento vegetativo	01/10/23	28/01/24														32.2	23.1	113.2	27.7	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Inflorescencia	29/01/24															34.0	23.4	0.1	28.7	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Floración																35.2	24.2	17.5	29.7	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Fructificación	16/09/24															31.0	23.2	65.3	27.1	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Maduración																				15.0	20.0	32.0	35.0	



PLÁTANO

SAN MARTÍN

En la estación Pacayzapa, las condiciones climáticas se mantuvieron poco favorables para las plantaciones de café variedad Catimor, las cuales continuaron en hinchazón de yemas y botón floral con estado bueno. Las temperaturas máximas se registraron con valores por debajo de su normal y mínimas por encima de lo normal. No obstante, en lo que va de agosto se han registrado días secos que reducen la formación de estaquillas florales.




Estación de Pacayzapa, cultivo de café

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMIC				
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMA	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2012)	Alto Mayo (altiyud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0	
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2025	31/07/2025														28.0	23.0	18.0	20.8	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	1/08/2025															30.0	24.2	18.3	0.0	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN																				10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN																				10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN																				10.0	18.0	22.0	30.0

SAN MARTÍN

En la zona de Pachiza, las condiciones climáticas reportadas fueron favorables para las plantaciones de cacao de la variedad CCN-51, las cuales se encontraron en reposo vegetativo y foliación con estado bueno. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 36°C y 35°C en la máxima y de 21°C a 20°C en la mínima. En el periodo no se registraron lluvias hecho que favoreció las labores de limpieza y poda. En otras zonas vienen reportando la fase de floración y fructificación por lo que estas condiciones climáticas serian poco favorables.



Estación de Pachiza, cultivo de cacao en reposo vegetativo


MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO	1/08/2025														25.4	22.9	20.3	0.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL																			15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN																			15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN																			15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN																			15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

En la estación La Unión, el cultivo de maíz amarillo duro, variedad Atlas 777, sembrado el 25 de marzo bajo condiciones de secano, continuo en la fase de maduración córnea con estado regular, debido a la escasa ocurrencia de lluvias en etapas críticas del cultivo que no favorecieron el desarrollo de la mazorca. En los últimos días no se han registrado precipitaciones lo que viene favoreciendo la labor de secado de la mazorca y cosecha



Estación de La Unión, cultivo de maíz

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Tcalta	PP POR ETAPA
La Unión (Valle del Biavo) Maíz atlas 777 siembra 25/03/2025	Huallaga Central	EMERGENCIA																			10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm
		APARICIÓN DE HOJAS																			10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA																			10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA																			10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA																			10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA																			10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN CÓRNEA	17/06/2025															35.2	28.6	22.0	0.0	10.0	25.0	33.0	35.0


MAIZ

JUNÍN

En la estación Pichanaki, el cultivo de café (var. Catuay) presentó buen estado en fase de fructificación, mientras que el cacao (var. CCN-51) se encontró en floración, ambos con estado bueno. Las condiciones meteorológicas registradas durante el periodo fueron favorables para el desarrollo agrícola, con temperaturas dentro de los rangos históricos y precipitaciones ligeramente inferiores al promedio climatológico, las cuales permitieron mantener adecuados niveles de humedad en el suelo para sustentar el crecimiento y desarrollo de los frutos.



Cultivo de café en fructificación




Cultivo de cacao en floración

MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS											31.4	21.5	26.5	381.1
		BOTON FLORAL											31.9	20.5	26.2	17.6
		FLORACION											30.7	21.4	26.0	22.4
		FRUCTIFICACION											31.7	20.2	26.0	182.7

MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2024-2025																
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic				
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL														
		FLORACION														
		FRUCTIFICACION														

CUSCO

En la estación de Quebrada Yanatile, el cultivo de café variedad Catimor se encuentra en la fase de botón floral, en estado regular. Las condiciones climáticas registradas presentaron una amplitud térmica habitual a su climatología, con temperaturas extremas de 29.78°C (máxima) y 16.02°C (mínima), acompañadas de escasas precipitaciones (3.2) que ayudan a reducir el déficit hídrico.



Estación Quebrada Yanatile, cultivo de café en botón floral

DEPARTAMENTO CUSCO																				
MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ																				
ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR																				
FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
QUEBRADA	REPOSO VEGETATIVO																			
	HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
	BOTÓN FLORAL													28.96	14.34	7.4	21.65	15	25	18 - 22
	FLORACIÓN																	15	28	18 - 24
	FRUCTIFICACIÓN																	15	28	18 - 24
	MADURACIÓN																	15	28	18 - 24