

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 16 al 22 de setiembre del 2025



Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

HUÁNUCO

En la estación de Aucayacu, las plantaciones de cacao de la variedad CCN51 continuaron en fructificación con estado regular. Durante la semana, se registraron temperaturas de 32.3°C en la máxima 21°C en la mínima, junto a lluvias que acumularon 21 mm. Condiciones favorables para el desarrollo de las mazorcas.



Estación de Aucayacu, cultivo de cacao en fructificación



MONITOREO CACAO ZONA DE PRODUCCIÓN AUCAYACU

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA													semana 16 al 22 set				ÓPTIMO TÉRMICO
			Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	PP	T media	
AUCAYACU	JOSE CRESPO Y CASTILLO	BOTON FLORAL																	RANGO DE TEMPRERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C
		FLORACION																	Entre 10-15 °C varios procesos fisiologicos se inhiben,
		FRUCTIFICACION													32.3	21	38.5	26.7	Temperatura mínima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

CACAO

HUÁNUCO

En la estación La Divisoria, las condiciones climáticas son favorables para las plantaciones de café variedad CATIMOR que se encontraron en fructificación con estado bueno. Durante el periodo, se registraron precipitaciones de 28.8 mm. y temperaturas entre sus normales climáticas. Sin embargo, aún mantiene la incidencia de ojo de pollo «*Mycena citricolor*».



Cultivo de café en floración

MONITOREO CAFE ZONA DE PRODUCCIÓN LA DIVISORIA																				
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	semana del 16 al 22 set				ÓPTIMO TÉRMICO	
															Tmax	Tmin	PP	T media		
LA DIVISORIA	HERMILIO VALDIZAN	HINCHAZON DE YEMAS																	RANGO DE TEMPERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C	
		BOTON FLORAL																	Entre 10-32 °C varios procesos fisiologicos se inhiben	
		FLORACION																	Temperatura optima 21°C	
		FRUCTIFICACION														24.3	16.5	28.8	20.4	Temperatura minima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																		PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO





CAFÉ

CAJAMARCA

En el distrito cafetalero de Chirinos, las temperaturas máximas y mínimas se mantuvieron dentro de los rangos normales, registrándose 8.6 mm. de lluvia durante el período. Estas condiciones han favorecido el inicio de la fase de floración en algunas plantas de café, que se encuentran en buen estado gracias a las precipitaciones recientes. En la zona de Chontali, las temperaturas máximas estuvieron por debajo de los valores normales, mientras que las mínimas se mantuvieron dentro de los rangos habituales. En esta área se registraron 12.2 mm. de lluvia, lo que ha favorecido el desarrollo de la fase de botón floral.




Plantaciones de café, Estación Chirinos



CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		TMáx.	TMin.	Pp.	TMed.												
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													22.5	14.6	115.9	18.5
				HINCHAZÓN DE YEMAS												22.6	14.9	31.4	18.8	
				BOTÓN FLORAL												23.3	15.1	16.5	19.2	
				FLORACIÓN												25.6	15.4	0.0	20.5	
				FRUCTIFICACIÓN																
				MADURACIÓN																

AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas), tanto las temperaturas máximas como mínimas se situaron por debajo de los valores habituales, con un acumulado de 43.3 mm de lluvia. Estas condiciones continúan beneficiando el inicio de la floración en algunas plantas de café variedad Geisha, que mantienen buen estado.



Plantaciones de café, Estación Palto


CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													25.9	15.5	44.3	20.7
				FRUCTIFICACIÓN																
				MADURACIÓN																

JUNÍN

En la estación Pichanaki, el cultivo de café (var. Catuay) presentó buen estado en fase de fructificación, mientras que el cacao (var. CCN-51) se encontró en botón floral con estado bueno. Las condiciones meteorológicas registradas durante el periodo fueron favorables para el desarrollo agrícola, con temperaturas dentro de los rangos históricos con presencia de días cálidos y precipitaciones ligeras, las cuales permitieron mantener los niveles de humedad en el suelo para sustentar el crecimiento y desarrollo de los frutos.




Cultivo de café en fructificación



Cultivo de cacao en botón floral

MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																		
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL													32.9	20.2	26.6	125.5

MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																		
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS													31.4	21.5	26.5	381.1
		BOTON FLORAL													32.6	20.9	26.7	19.1
		FLORACION													31.3	21.2	26.3	86.1
		FRUCTIFICACION													32.3	20.2	26.3	271.3




CAFÉ



CACAO

CUSCO

En la estación de Quebrada Yanatile, el cultivo de café variedad Catimor se encuentra en fase de fructificación, presentando desarrollo regular debido a un manejo agronómico inadecuado. Las condiciones climáticas mostraron una amplitud térmica acorde a su climatología, con temperaturas extremas de 32.5°C (máxima) y 17.5°C (mínima). No obstante, las precipitaciones acumularon 1.42 mm hecho que podría causar la caída de frutos.



Estación Quebrada Yanatile, cultivo de café

[illegible]