PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 23 al 29 de setiembre del 2025

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:
Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:
Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:
Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:
Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.

SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":
ingresa al siguiente link para mas información :https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manití, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración final. En el periodo, se registró promedios de temperatura máxima de 32.3°C y mínima de 22.3°C (entre sus normales climatológicas). Las precipitaciones acumularon 69mm condiciones climáticas que favorecieron el desarrollo de mazorcas.

CACAO

MANITÍ

MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO

ESTACIÓN MANITÍ: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN



Estación Manatí, cultivo de cacao en maduración

MANITÍ

MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO

ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Manití, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Botón Floral																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Fructificación																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Maduración	15/04/2025														32.3	22.3	69.0	27.3	18.0	21.0	32.0	35.0

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, las plantaciones de Pijuayo continuaron en espata con estado bueno. Durante el periodo, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas registraron valores normales y ligeramente cálida, con temperaturas de 32.3°C y nocturnas de 23.4°C. Además, de lluvias bajo sus valores normales que acumularon 76.6 mm favorables para el avance de la fase.

Estación Mazán, cultivo de pijuayo en espata

MAZÁN
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO
ESTACIÓN MAZÁN: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN



PIJUAYO

MAZAN
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	07/07/25	01/09/25																	14.0	24.0	28.0	35.0
		Espata	02/09/25														32.3	23.4	76.6	27.9	14.0	24.0	28.0	35.0
		Inflorescencia																			14.0	24.0	28.0	35.0
		Floración																			14.0	24.0	28.0	35.0
		Fructificación																			14.0	24.0	28.0	35.0
		Maduración																			14.0	24.0	28.0	35.0

LORETO

En la estación San Roque, las temperaturas máximas y mínimas se mostraron sobre sus normales climáticas, con promedios de 32.9 °C y 22.7 °C, respectivamente. Las precipitaciones fueron superior a lo habitual, registrándose solo 80.5 mm. Condiciones favorables para el cultivo de plátano var. Bellaco, que se encuentra en fase de retoño, y para el camu camu en crecimiento vegetativo; ambos con buen estado.

Estación San Roque, cultivo de plátano



Estación San Roque, cultivo camu camu

MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA: FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	CONDICIONES CLIMATICAS: T° Max.	T° Min.	Pp.	T° Med.	REQUERIMIENTO TÉRMICO: Tc baja	Top-	Top+	Tc alta
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 07-08-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	07/08/25														32.9	22.7	80.5	27.8	15.0	20.0	32.0	35.0
		Crecimiento vegetativo																			15.0	20.0	32.0	35.0
		Inflorescencia																			15.0	20.0	32.0	35.0
		Floración																			15.0	20.0	32.0	35.0
		Fructificación																			15.0	20.0	32.0	35.0
		Maduración																			15.0	20.0	32.0	35.0

SAN ROQUE
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA: FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	CONDICIONES CLIMATICAS: T° Max.	T° Min.	Pp.	T° Med.	REQUERIMIENTO TÉRMICO: Tc baja	Top-	Top+	Tc alta
San Roque (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 15-07-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Crecimiento vegetativo	12/08/25														32.9	22.7	80.5	27.8	15.0	21.0	28.0	35.0
		Hinchazón de yemas																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Apertura de yemas florales																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Botón floral																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Floración																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Fructificación																			15.0	21.0	28.0	35.0
		Maduración																			15.0	21.0	28.0	35.0

HUÁNUCO

En la estación de Aucayacu, las plantaciones de cacao de la variedad CCN51 continuaron en fructificación en estado regular. Durante la semana, se registraron temperaturas de 30.7°C en la máxima y 21°C en la mínima, junto a lluvias que acumularon 48mm. Condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo de las mazorcas.



Estación de Aucayacu, cultivo de cacao en fructificación

CACAO

MONITOREO CACAO ZONA DE PRODUCCIÓN AUCAYACU

															semana 23 al 29 set				
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	PP	T media	ÓPTIMO TÉRMICO
AUCAYACU	JOSE CRESPO Y CASTILLO	BOTON FLORAL																	RANGO DE TEMPRERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C
		FLORACION																	Entre 10-15 °C varios procesos fisiologicos se inhiben,
		FRUCTIFICACION													30.7	21.0	48.7	25.9	Temperatura minima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

HUÁNUCO

En la estación La Divisoria, las condiciones climáticas son favorables para las plantaciones de café variedad CATIMOR que se encontraron en fructificación con estado bueno. No obstante, se siguen observando floraciones. Durante el periodo, se registraron precipitaciones de 43.9 mm. y temperaturas entre sus normales climáticas. Sin embargo, aún mantiene la incidencia de ojo de pollo «*Mycena citricolor*».



Cultivo de café en inicios de fructificación

MONITOREO CAFE ZONA DE PRODUCCIÓN LA DIVISORIA

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	semana del 23 al 29 set Tmax	Tmin	PP	T media	ÓPTIMO TÉRMICO
LA DIVISORIA	HERMILIO VALDIZAN	HINCHAZON DE YEMAS																	RANGO DE TEMPERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C
		BOTON FLORAL																	Entre 10-32 °C varios procesos fisiologicos se inhiben
		FLORACION													23.2	15.8	43.9	19.5	Temperatura optima 21°C
		FRUCTIFICACION																	Temperatura minima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

CAJAMARCA

En el distrito cafetalero de Chirinos, las temperaturas máximas y mínimas se mantuvieron dentro de los rangos normales, registrándose un acumulado de 18,1 mm de lluvia durante el período. Estas condiciones han favorecido la fase de floración en algunas plantas de café, que se encuentran en buen estado gracias a las precipitaciones recientes. En la zona de Chontali, las temperaturas máximas estuvieron por debajo de los valores normales, mientras que las mínimas se mantuvieron dentro de los rangos habituales. Se registraron 19,2 mm de lluvia, lo cual ha favorecido el desarrollo de la fase de botón floral.

Plantaciones de café, Estación Chirinos





CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													22.5	14.6	115.9	18.5
				HINCHAZÓN DE YEMAS													22.6	14.9	31.4	18.8
				BOTÓN FLORAL													23.3	15.1	16.5	19.2
				FLORACIÓN													23.0	15.5	18.1	19.2
				FRUCTIFICACIÓN																
				MADURACIÓN																

				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo secano)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													23.1	13.6	82.0	18.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS													23.4	14.0	10.0	18.7
				BOTÓN FLORAL													23.9	14.7	32.1	19.3
				FLORACIÓN																0.0
				FRUCTIFICACIÓN																0.0
				MADURACIÓN																0.0

CAFÉ

AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas), las temperaturas máximas se situaron por debajo de los valores habituales, mientras que las mínimas se mantuvieron normales. Se acumuló un total de 10,0 mm de lluvia durante el periodo. Estas condiciones continúan beneficiando a algunas plantas en el inicio de la fructificación del café, variedad Geisha, que mantienen un buen estado general.



Plantaciones de café, Estación Palto

CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													25.8	15.8	54.3	20.8
				FRUCTIFICACIÓN													26.2	16.2	37.0	21.2
				MADURACIÓN																

CAFÉ

JUNÍN

En la estación Pichanaki, el cultivo de café (var. Catuai) continuo en fase de fructificación, mientras que el cacao (var. CCN-51) se encontró en botón floral, ambos con estado bueno. Las condiciones meteorológicas registradas durante el periodo fueron favorables para el desarrollo de la planta, con temperaturas dentro de los rangos históricos y precipitaciones, las cuales permitieron mantener los niveles de humedad en el suelo para sustentar el crecimiento y desarrollo de los frutos.

Cultivo de café en fructificación



Cultivo de cacao en botón floral

MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS													31.4	21.5	26.5	381.1
		BOTON FLORAL													32.6	20.9	26.7	19.1
		FLORACION													31.3	21.2	26.3	86.1
		FRUCTIFICACION													32.3	20.3	26.3	298.5

MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL													33.0	20.3	26.6	152.7

CAFÉ

CACAO

PUNO

En la estación Tambopata, las condiciones climáticas se mantienen favorables para las plantaciones de café de la variedad CATIMOR, las cuales han iniciado la fase de fructificación. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas entre sus normales climáticas y mínimas por encima de su promedio, con valores de 27.80°C y 16.62 °C, respectivamente, acompañadas de precipitaciones que acumularon un total de 21.60 mm.



Plantaciones de café inicio de fructificacion

CEJA DE SELVA - PUNO
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAFÉ
ESTACIÓN TAMBOPATA: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ

FASES FENOLÓGICAS	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ÓPTIMO TÉRMICO
Descanso postcosecha													
Hinchazón de yemas													
Botón floral													
Floración													
Fructificación													
Maduración													

ESTADO DEL CULTIVO *** ● ● ● ●

*** ○ Muy bueno ● Bueno ● Regular ● Malo

CUSCO

En la estación de Quebrada Yanatile, el cultivo de café variedad Catimor se encuentra iniciando la fructificación, presentando desarrollo regular, debido a un manejo agronómico inadecuado. Las condiciones climáticas mostraron una amplitud térmica acorde a su climatología, con temperaturas de 32.5 °C (máxima) y 17.5 °C (mínima) entre sus normales climáticas, aunadas de lluvias que totalizaron 18.5 mm.



Estación Quebrada Yanatile, cultivo de café

DEPARTAMENTO CUSCO

MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ

ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR

	FENOLOGÍA													CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
QUEBRADA YANATILE	REPOSO VEGETATIVO																			
	HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
	BOTÓN FLORAL													29.80	14.53	4.20	22.17	15	25	18 - 22
	FLORACIÓN													29.97	17.01	13.82	23.49	15	28	18 - 24
	FRUCTIFICACIÓN													31.22	16.64	46.70	23.93	15	28	18 - 24
	MADURACIÓN																	15	28	18 - 24

CAFÉ