

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 30 de setiembre al 06 de octubre del 2025

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manití, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración final. En el periodo, se registró promedios de temperatura máxima de 31.1°C y mínima de 22.3°C (entre sus normales climatológicas). Las precipitaciones acumularon 17.4 mm condiciones climáticas que favorecieron el desarrollo de mazorcas.




Estación Manatí, cultivo de cacao en maduración

MANITÍ																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																									
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Manití, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Botón Floral																				18.0	21.0	32.0	35.0
		Floración																				18.0	21.0	32.0	35.0
		Fructificación																				18.0	21.0	32.0	35.0
		Maduración	15/04/2025																31.1	22.3	17.4	26.7	18.0	21.0	32.0

CACAO

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, las plantaciones de Pijuayo se encontraron en inflorescencia con estado bueno. Durante el periodo, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas registraron valores normales y ligeramente cálidas, con temperaturas de 31.1°C y nocturnas de 23.9°C. Además, de lluvias bajo sus valores normales que acumularon 31 mm favorables para el avance de la fase.



Estación Mazán, cultivo de pijuayo en inflorescencia

MAZAN																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																									
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Talta	
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	07/07/25	01/09/25																	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Espata	02/09/25	05/10/25																	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Inflorescencia	06/10/25															31.1	23.9	31.0	27.5	14.0	24.0	28.0	35.0
		Floración																			14.0	24.0	28.0	35.0	
		Fructificación																			14.0	24.0	28.0	35.0	
		Maduración																		14.0	24.0	28.0	35.0		


PIJUAYO

LORETO

En la estación San Roque, las temperaturas máximas y mínimas se mostraron sobre sus normales climáticas, con promedios de 31.6 °C y 23.3 °C, respectivamente. Las precipitaciones fueron habituales a su climatología, registrándose solo 7.7 mm. Condiciones favorables para el cultivo de plátano var. Bellaco, que se encuentra en fase de retoño, y para el camu camu en crecimiento vegetativo; ambos con buen estado.



Cultivo de plátano



Estación San Roque

SAN ROQUE MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO																	
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA												CONDICIONES CLIMÁTICAS			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 07-08-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	07/08/25														31.6 23.3 7.7 27.5
		Crecimiento vegetativo															15.0 20.0 32.0 35.0
		Inflorescencia															15.0 20.0 32.0 35.0
		Floración															15.0 20.0 32.0 35.0
		Fructificación															15.0 20.0 32.0 35.0
		Maduración															15.0 20.0 32.0 35.0

SAN ROQUE MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU																	
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA												CONDICIONES CLIMÁTICAS			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
San Roque (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 15-07-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Crecimiento vegetativo	12/08/25														31.6 23.3 7.7 27.5
		Hinchazón de yemas															15.0 21.0 28.0 35.0
		Apertura de yemas florales															15.0 21.0 28.0 35.0
		Botón floral															15.0 21.0 28.0 35.0
		Floración															15.0 21.0 28.0 35.0
		Fructificación															15.0 21.0 28.0 35.0




PLÁTANO



CAMU CAMU

SAN MARTÍN

En la estación Pacayzapa, las condiciones climáticas fueron favorables para el desarrollo de los cafetales de la variedad Catimor en fase de fructificación. Las temperaturas máximas registradas estuvieron por debajo de lo habitual, con valores de 34°C y 26.8°C, mientras que las mínimas por encima de lo normal, entre 19.4°C y 18°C, con lluvias que acumularon 31.2 mm favorables para el cultivo.




Estación de Pacayzapa, cultivo de café

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMA	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2012)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0	
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2025	31/07/2025														28.0	23.0	18.0	20.8	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	1/08/2025	19/08/2025														30.3	23.8	17.3	2.9	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN	20/08/2025	12/09/2025														29.4	23.5	17.5	17.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN	13/09/2025															30.0	24.5	18.9	31.4	10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN																				10.0	18.0	22.0	30.0

SAN MARTÍN

En la zona de Pilluana, las condiciones climáticas se reportaron favorables para las plantaciones de cacao de la variedad CCN-51, las cuales continuaron en maduración. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 37.2°C y 31.2°C en la máxima y de 21.2°C a 19.2°C en la mínima. Además de lluvias que acumularon 23.9 mm. en Huayabamba y Pachiza continua en la aparición de cojines florales.



Estación de Pachiza, cultivo de cacao

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL


MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																								
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO																			15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL																			15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN																			15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN																			15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	29/04/2025															33.5	27.0	20.4	23.9	15.0	23.0	25.0



CACAO

SAN MARTÍN

En la zona de Pachiza, las condiciones climáticas se reportaron favorables para las plantaciones de cacao de la variedad CCN-51, las cuales se encontraron en floración. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 35.8°C y 30°C en la máxima y de 20.2°C a 19°C en la mínima. Con respecto a las lluvias acumularon 12.2 mm, hecho que favoreció la aparición de los nuevos cojines florales.



Estación de Pachiza, cultivo de cacao en floración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO	1/08/2025															35.0	27.5	19.9	0.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	1/09/2025	25/09/2025														33.1	26.4	19.6	28.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	26/09/2025															33.5	26.7	19.9	12.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN																				15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN																				15.0	23.0	25.0	32.0



CACAO

CAJAMARCA

En el distrito cafetalero de Chirinos, las temperaturas máximas se mantuvieron por debajo de sus valores normales, mientras que las mínimas estuvieron dentro de los rangos habituales. Se registró un acumulado de 26,6 mm de lluvia durante el período, lo cual ha favorecido la fase de fructificación en algunas plantas de café, que se encuentran en estado bueno gracias a las precipitaciones recientes. En la zona de Chontali, las temperaturas máximas también estuvieron por debajo de lo normal, y las mínimas se mantuvieron dentro de los rangos habituales. Se registraron 37,0 mm de lluvia, favoreciendo el desarrollo de la fase de floración del cultivo.



Plantaciones de café, Estación Chirinos




CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													22.5	14.6	115.9	18.5
				HINCHAZÓN DE YEMAS													22.6	14.9	31.4	18.8
				BOTÓN FLORAL													23.0	15.3	34.7	19.2
				FLORACIÓN													22.9	15.5	18.2	19.2
				FRUCTIFICACIÓN													22.7	15.4	26.5	19.1
				MADURACIÓN																

				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo secano)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													23.1	13.6	82.0	18.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS													23.4	14.0	10.0	18.7
				BOTÓN FLORAL													24.0	14.7	40.3	19.4
				FLORACIÓN													23.6	14.8	28.8	19.2
				FRUCTIFICACIÓN																0.0
				MADURACIÓN																0.0

AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas), las temperaturas máximas se situaron por debajo de los valores normales y las mínimas se mantuvieron estables. Durante el período se acumuló un total de 42,5 mm de lluvia. Estas condiciones continúan beneficiando a algunas plantas de café, variedad Geisha, que se encuentran en fase de fructificación y presentan un buen estado general.




Plantaciones de café, Estación Palto

CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													26.1	15.8	74.1	21.0
				FRUCTIFICACIÓN													26.2	16.3	79.5	21.2
				MADURACIÓN																

JUNÍN

En la estación Pichanaki, el cultivo de café (var. Catuay) continuo en fase de fructificación, mientras que el cacao (var. CCN-51) se encontró en botón floral, ambos con estado bueno. Las condiciones meteorológicas registradas durante el periodo continuaron favorables para el desarrollo de la planta, con temperaturas dentro de los rangos históricos y precipitaciones, las cuales permitieron mantener los niveles de humedad en el suelo para sustentar el crecimiento y desarrollo de los frutos.



Cultivo de café en fructificación


Cultivo de cacao en botón floral

MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																		
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS													31.4	21.5	26.5	381.1
		BOTON FLORAL													32.6	20.9	26.7	19.1
		FLORACION													31.3	21.2	26.3	86.1
		FRUCTIFICACION													32.4	20.3	26.4	312.7


MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																		
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL													33.1	20.4	26.8	166.9

PUNO

En la estación Tambopata, las condiciones climáticas se mantienen favorables para las plantaciones de café de la variedad CATIMOR, las cuales han iniciado la fase de fructificación. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas entre sus normales climáticas y mínimas por encima de su promedio, con valores de 29.50°C y 16.80 °C, respectivamente, acompañadas de precipitaciones que acumularon un total de 16.80 mm.




Plantaciones de café inicio de fructificación



CUSCO

En la estación de Quebrada Yanatile, el cultivo de café variedad Catimor continua en fructificación, presentando desarrollo regular, debido a un manejo agronómico inadecuado. Las condiciones climáticas mostraron una amplitud térmica acorde a su climatología, con temperaturas de 29.9 °C (máxima) y 17.21 °C (mínima) entre sus normales climáticas, aunadas de lluvias que totalizaron 32.60 mm.



Estación Quebrada Yanatile, cultivo de café

DEPARTAMENTO CUSCO																
MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ																
ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR																
FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP
QUEBRADA YANATILE	REPOSO VEGETATIVO															
	HINCHAZÓN DE YEMAS															
	BOTÓN FLORAL													29.80	14.53	4.20
	FLORACIÓN													29.97	17.01	13.82
	FRUCTIFICACIÓN													31.00	16.67	83.70
REQUERIMIENTO TÉRMICO														Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta
T. Optima														22.17	15	25
														23.49	15	28
														23.83	15	28
															15	28

