

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 07 al 13 de octubre del 2025

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manatí, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración final. En el periodo, se registró promedios de temperatura máxima de 32°C y mínima de 22.4°C (entre sus normales climatológicas). Las precipitaciones acumularon 12 mm condiciones climáticas que favorecieron el desarrollo de mazorcas.




Estación Manatí, cultivo de cacao en maduración

MANITÍ																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																									
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Manatí, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Botón Floral																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Fructificación																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Maduración	15/04/2025															32.0	22.4	12.0	27.2	18.0	21.0	32.0	35.0

CACAO

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, las plantaciones de Pijuayo se encontraron en espata con estado bueno. Durante el periodo, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas registraron valores normales y ligeramente cálidas, con temperaturas de 32°C y nocturnas de 24°C. Además, de lluvias que acumularon 27.7 mm favorables para el avance de la fase.



Estación Mazán, cultivo de pijuayo en espata

MAZAN																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																									
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	07/07/25	01/09/25																	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Espata	02/09/25															32.0	24.0	27.7	28.0	14.0	24.0	28.0	35.0
		Inflorescencia																			14.0	24.0	28.0	35.0	
		Floración																			14.0	24.0	28.0	35.0	
		Fructificación																			14.0	24.0	28.0	35.0	
		Maduración																		14.0	24.0	28.0	35.0		


PIJUAYO

LORETO

En la estación San Roque, las temperaturas máximas y mínimas se mostraron sobre sus normales climáticas, con promedios de 33 °C y 22.7 °C, respectivamente. Las precipitaciones fueron habituales a su climatología, registrándose solo 9.3 mm. Condiciones favorables para el cultivo de plátano var. Bellaco, que se encuentra en fase de retoño, y para el camu camu en crecimiento vegetativo; ambos con buen estado.



Estación San Roque, cultivo de plátano



Estación San Roque, Camu Camu


MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO																										
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLOGICAS DEL PLÁTANO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLOGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T°Max.	T°Min.	Pp.	T°Med.	Tc.baja	Top.	Top+	Tc.alta		
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 07-08-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	07/08/25														33.0	22.7	9.3	27.9	15.0	20.0	32.0	35.0		
		Crecimiento vegetativo																			15.0	20.0	32.0	35.0		
		Inflorescencia																			15.0	20.0	32.0	35.0		
		Floración																			15.0	20.0	32.0	35.0		
		Fructificación																			15.0	20.0	32.0	35.0		
		Maduración																			15.0	20.0	32.0	35.0		

SAN ROQUE																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU																									
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLOGICAS CAMU CAMU																									
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLOGICAS	INICIO	FINAL	FENOLOGÍA												CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
					Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T°Max	T°Min	Pp	T°Med	Tc.baja	Top	Topa	Tc.alta	
San Roque (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 15-07-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Crecimiento vegetativo	12/08/25															33.0	22.7	9.3	27.9	15.0	21.0	28.0	35.0
		Hinchazón de yemas																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Apertura de yemas florales																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Botón floral																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Floración																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Fructificación																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Maduración																				15.0	21.0	28.0	35.0



HUÁNUCO

En la estación de Aucayacu, las plantaciones de cacao de la variedad CCN51 continuaron en fructificación en estado bueno. Durante la semana, se registraron temperaturas de 30.2°C en la máxima y 20.8°C en la mínima, junto a lluvias que acumularon 67.1 mm. Condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo de las mazorcas.




Estación de Aucayacu, cultivo de cacao en fructificación

MONITOREO CACAO ZONA DE PRODUCCIÓN AUCAYACU																				
															semana 07 al 13 oct					
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	PP	T media	ÓPTIMO TÉRMICO	
AUCAYACU	JOSE CRESPO Y CASTILLO	BOTON FLORAL																	RANGO DE TEMPERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C	
		FLORACION																	Entre 10-15 °C varios procesos fisiologicos se inhiben,	
		FRUCTIFICACION														30.2	20.8	104.2	25.5	Temperatura mínima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																		PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

CACAO

HUÁNUCO

En la estación La Divisoria, las condiciones climáticas son favorables para las plantaciones de café variedad CATIMOR que se encontraron en fructificación con estado bueno. Durante el periodo, se registraron precipitaciones de 60.5 mm. y temperaturas con valores entre sus normales climáticas. Sin embargo, aún mantiene la incidencia de ojo de pollo «*Mycena citricolor*».



Cultivo de café en fructificación



MONITOREO CAFE ZONA DE PRODUCCIÓN LA DIVISORIA																				
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	semana del 07 al 13 oct				ÓPTIMO TÉRMICO	
															Tmax	Tmin	PP	T media		
LA DIVISORIA	HERMILO VALDIZAN	HINCHAZON DE YEMAS																	RANGO DE TEMPERATURAS OPTIMAS 21,5-29,5 °C	
		BOTON FLORAL														22.1	15.9	60.5	19.0	Entre 10-32 °C varios procesos fisiologicos se inhiben
		FLORACION																		Temperatura optima 21°C
		FRUCTIFICACION																		Temperatura minima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																		PRECIPITACIÓN MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO

CAJAMARCA

En el distrito cafetalero de Chirinos, las temperaturas máximas y mínimas se mantuvieron por debajo de sus valores normales. Se registró un acumulado de 18.1 mm de lluvia durante el período, lo cual ha favorecido la fase de fructificación en algunas plantas de café, que se encuentran en buen estado gracias a las precipitaciones recientes. En la zona de Chontali, las temperaturas máximas también estuvieron por debajo de lo normal, y las mínimas se mantuvieron dentro de los rangos habituales. Se registraron 34,0 mm de lluvia, favoreciendo el desarrollo de la fase de floración.



Plantaciones de café, Estación Chirinos




CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													22.5	14.6	115.9	18.5
				HINCHAZÓN DE YEMAS													22.6	14.9	31.4	18.8
				BOTÓN FLORAL													23.0	15.3	34.7	19.2
				FLORACIÓN													22.9	15.5	18.2	19.2
				FRUCTIFICACIÓN													23.6	15.4	44.6	19.5
				MADURACIÓN																

				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo secano)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													23.1	13.6	82.0	18.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS													23.4	14.0	10.0	18.7
				BOTÓN FLORAL													24.0	14.7	40.3	19.4
				FLORACIÓN													25.4	14.0	34.0	19.7
				FRUCTIFICACIÓN																0.0
				MADURACIÓN																0.0

AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas), las temperaturas máximas se situaron por debajo de los valores normales y las mínimas se mantuvieron estables. Durante el período se acumuló un total de 93.4 mm de lluvia. Estas condiciones continúan beneficiando a algunas plantas de café, variedad Geisha, que se encuentran en fase de fructificación y presentan buen estado general.




Plantaciones de café, Estación Palto

CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													26.1	15.8	74.1	21.0
				FRUCTIFICACIÓN													26.7	16.3	172.9	21.5
				MADURACIÓN																

JUNÍN

En la estación Pichanaki, el cultivo de café (var. Catuay) continuo en fase de fructificación, mientras que el cacao (var. CCN-51) continuo en botón floral, ambos con estado bueno. Las condiciones meteorológicas registradas durante el periodo continuaron favorables para el desarrollo de la planta, con temperaturas dentro de los rangos históricos y precipitaciones, las cuales permitieron mantener los niveles de humedad en el suelo y sustentar el crecimiento y desarrollo de los frutos.



Cultivo de café en fructificación


Cultivo de cacao en botón floral

MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																		
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS													31.4	21.5	26.5	381.1
		BOTON FLORAL													32.6	20.9	26.7	19.1
		FLORACION													31.3	21.2	26.3	86.1
		FRUCTIFICACION													32.5	20.3	26.4	333.5


MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																		
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL													33.2	20.5	26.8	187.7

PUNO

En la estación Tambopata, las condiciones climáticas se mantienen favorables para las plantaciones de café de la variedad CATIMOR, las cuales continuaron en fase de fructificación. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas entre sus normales climáticas y mínimas por encima de su promedio, con valores de 27.50°C y 16.76 °C, respectivamente, acompañadas de precipitaciones.




Plantaciones de café inicio de fructificación



CUSCO

En la estación de Quebrada Yanatile, el cultivo de café variedad Catimor continua en fructificación, presentando desarrollo regular, debido a un manejo agronómico inadecuado. Las condiciones climáticas mostraron una amplitud térmica acorde a su climatología, con temperaturas de 29.5 °C (máxima) y 17.35 °C (mínima) entre sus normales climáticas, aunadas de lluvias que totalizaron 32.60 mm, favorables para el desarrollo de cerezas.



Estación Quebrada Yanatile, cultivo de café

DEPARTAMENTO CUSCO																				
MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ																				
ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLOGICAS DEL CAFÉ CATIMOR																				
FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
QUEBRADA YANATILE	REPOSO VEGETATIVO																			
	HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
	BOTÓN FLORAL													29.80	14.53	4.20	22.17	15	25	18 - 22
	FLORACIÓN													29.97	17.01	13.82	23.49	15	28	18 - 24
	FRUCTIFICACIÓN													30.74	16.78	115.50	23.76	15	28	18 - 24
	MADURACIÓN																	15	28	18 - 24

