

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 21 al 27 de octubre del 2025

**Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM**

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En la estación Manítí, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuó en fase de maduración final. En el periodo, se registró promedios de temperatura máxima de 32.8°C y mínima de 22.2°C (entre sus normales climatológicas). Las precipitaciones acumularon 72.9 mm condiciones climáticas que favorecieron el desarrollo de mazorcas.




Estación Manátí, cultivo de cacao

MANITÍ																								
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																								
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																								
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Manítí, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Botón Floral																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Fructificación																			18.0	21.0	32.0	35.0
		Maduración	15/04/2025															32.8	22.2	72.9	27.5	18.0	21.0	32.0

CACAO

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, las plantaciones de Pijuayo se encontraron en fructificación con estado bueno. Durante el periodo, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas registraron valores normales y ligeramente cálidas, con temperaturas de 32.8°C y nocturnas de 23.9°C. Además, de lluvias que acumularon 24.1 mm favorables para el avance de la fase.




Estación Mazán, cultivo de pijuayo en fructificación

MAZAN																											
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																											
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																											
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta			
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	07/07/25	01/09/25																	14.0	24.0	28.0	35.0			
		Espata	02/09/25	05/10/25																	14.0	24.0	28.0	35.0			
		Inflorescencia	06/10/25	08/10/25																	14.0	24.0	28.0	35.0			
		Floración	09/10/25	14/10/25																	14.0	24.0	28.0	35.0			
		Fructificación	15/10/25															32.8	23.9	24.1	28.4	14.0	24.0	28.0	35.0		
		Maduración																		14.0	24.0	28.0	35.0				

PIJUAYO

LORETO

En la estación San Roque, las temperaturas máximas y mínimas se mostraron sobre sus normales climáticas, con promedios de 34.1 °C y 23 °C, respectivamente. Las precipitaciones fueron superiores a su climatología, registrándose 114.3 mm. Condiciones favorables para el cultivo de plátano var. Bellaco, que se encuentra en fase de retoño, y para el camu camu en crecimiento vegetativo; ambos con buen estado.



Estación San Roque, plátano



Estación San Roque, Camu Camu


SAN ROQUE																											
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO																											
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO																											
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO							
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max	T° Min	Pp	T°Med	Tc baía	Top	Topr	Tc al			
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 07-08-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	07/08/25														34.1	23.0	114.3	28.6	15.0	20.0	32.0	35.0			
		Crecimiento vegetativo																				15.0	20.0	32.0	35.0		
		Inflorescencia																				15.0	20.0	32.0	35.0		
		Floración																				15.0	20.0	32.0	35.0		
		Fructificación																				15.0	20.0	32.0	35.0		
		Maduración																					15.0	20.0	32.0	35.0	

SAN ROQUE																											
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU																											
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU																											
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO							
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max	T° Min	Pp	T°Med	Tc baía	Top	Topr	Tc al			
San Roque (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 15-07-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Crecimiento vegetativo	12/08/25														34.1	23.0	114.3	28.6	15.0	21.0	28.0	35.0			
		Hinchazón de yemas																				15.0	21.0	28.0	35.0		
		Apertura de yemas florales																				15.0	21.0	28.0	35.0		
		Botón floral																				15.0	21.0	28.0	35.0		
		Floración																				15.0	21.0	28.0	35.0		
		Fructificación																				15.0	21.0	28.0	35.0		
Maduración																					15.0	21.0	28.0	35.0			



LORETO

En la estación Caballococha, el cultivo de cacao variedad Criollo se encontró en fructificación con estado bueno, debido a las lluvias que acumularon 41.5 mm en la semana, además de las condiciones entre sus normales, con temperaturas en la máxima de 32.8°C y mínimas 23.3°C. Condiciones climáticas que promueven el crecimiento y desarrollo de la mazorca.





CABALLOCOCHA																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																									
ESTACIÓN CABALLOCOCHA: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
CABALLOCOCHA (Cultivo de cacao, variedad CRIOLLO, Fecha de siembra: (15-10-17)	Localidad de Caballococha (Río Amazonas, altitud 107msnm)	Boton floral																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Fructificación	2/04/2025															32.8	23.3	41.5	28.1	18.0	21.0	32.0	35.0
		Maduración																				18.0	21.0	32.0	35.0




CACAO

PUNO

En la estación Tambopata, las condiciones climáticas se mantienen favorables para las plantaciones de café de la variedad CATIMOR, las cuales continuaron en fase de fructificación. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas y mínimas entre sus normales, con lluvias de 25.7 que promovieron el crecimiento del grano.



Plantaciones de café inicio de fructificación




CUSCO

En la estación de Quebrada Yanatile, el cultivo de café de la variedad Catimor continúa en la fase de fructificación, presentando un desarrollo regular. Durante la semana, las condiciones climáticas se mantuvieron dentro de sus normales climáticas que aunado de precipitaciones 49.9 mm., promovieron el llenado de los frutos. No obstante, debido a que el cultivo es conducido bajo sombra, se evidenció la aparición de la mancha de hierro, ocasionada por la alta humedad ambiental.



Estación Quebrada Yanatile, cultivo de café



DEPARTAMENTO CUSCO																				
MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ																				
ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR																				
FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
QUEBRADA YANATILE	REPOSO VEGETATIVO																			
	HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
	BOTÓN FLORAL													29.80	14.53	4.20	22.17	15	25	18 - 22
	FLORACIÓN													29.97	17.01	13.82	23.49	15	28	18 - 24
	FRUCTIFICACIÓN													30.63	16.90	217.90	23.77	15	28	18 - 24
	MADURACIÓN																	15	28	18 - 24

CAFÉ