



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!

Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 10 al 16 de febrero del 2026

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, las plantaciones de Pijuayo continuaron en maduración con estado bueno y próximos a la cosechas. Durante el periodo, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas registraron valores entre sus normales y diurnos cálidos, con temperaturas diurnas de 31.7°C y nocturnas de 27.7°C. Además, de lluvias que acumularon 21 mm.



MAZAN																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																										
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	T _{baja}	Top-	Top+	T _{alta}		
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	07/07/25	01/09/25																	14.0	24.0	28.0	35.0		
		Espata	02/09/25	05/10/25																	14.0	24.0	28.0	35.0		
		Inflorescencia	06/10/25	08/10/25																	14.0	24.0	28.0	35.0		
		Floración	09/10/25	14/10/25																	14.0	24.0	28.0	35.0		
		Fructificación	15/10/25	09/12/25																	14.0	24.0	28.0	35.0		
		Maduración	10/12/25															31.7	23.7	21.0	27.7	14.0	24.0	28.0	35.0	




Estación Mazán, cultivo de Pijuayo en maduración

PIJUAYO

LORETO

En la estación San Roque, las temperaturas máximas y mínimas se mostraron entre sus normales climáticas, con promedios de 33.8°C y 23.3°C, respectivamente. Las precipitaciones acumularon 31.6 mm. Condiciones favorables para el cultivo de plátano var. Bellaco, que continua en fase de retoño, y para el camu camu en crecimiento vegetativo; ambos en buen estado.



SAN ROQUE																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO																									
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta	
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 07-08-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	07/08/25															33.8	23.3	31.6	28.6	15.0	20.0	32.0	35.0
		Crecimiento vegetativo																				15.0	20.0	32.0	35.0
		Inflorescencia																				15.0	20.0	32.0	35.0
		Floración																				15.0	20.0	32.0	35.0
		Fructificación																				15.0	20.0	32.0	35.0
		Maduración																				15.0	20.0	32.0	35.0

SAN ROQUE																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU																									
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top.	Top+	Tc alta	
San Roque (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, fecha de siembra: 15-07-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Crecimiento vegetativo	12/08/25															33.8	23.3	31.6	28.6	15.0	21.0	28.0	35.0
		Hinchazón de yemas																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Apertura de yemas florales																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Botón floral																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Floración																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Fructificación																				15.0	21.0	28.0	35.0
		Maduración																				15.0	21.0	28.0	35.0




PLÁTANO



CAMU CAMU

LORETO

En la estación Manití, el cultivo de cacao (var. CCN-51) continuo en la fase de fructificación con estado bueno, las temperaturas máximas promedio de 31.8°C, mínimas de 23°C, además de precipitaciones que acumularon 109.5 mm. No obstante, la alta humedad viene favoreciendo la incidencia de enfermedades como la moniliasis afectando el 10 % de las plantaciones.



MANITÍ																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																									
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top.	Top+	Tcal	
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Maniti, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Botón Floral	24/11/2025	13/12/2025																		18.0	21.0	32.0	35.0
		Floración	14/12/2025	11/01/2026																		18.0	21.0	32.0	35.0
		Fructificación	12/01/2026															31.8	23.0	109.5	27.4	18.0	21.0	32.0	35.0
		Maduración																				18.0	21.0	32.0	35.0





Estación Manité, cultivo de cacao en maduración

CAJAMARCA

En las zonas de monitoreo de Chirinos y Chontali las plantaciones de café de la variedad Marsellesa y Catimor respectivamente, continuaron en fructificación con estado bueno. Las condiciones ambientales en la semana se mostraron favorables, debido a la prevalencia de lluvias reportadas que promueven el llenado y desarrollo de granos. Asimismo, las temperaturas máximas se mostraron por debajo de sus normales y nocturnas entre sus normales climáticas. No obstante, la alta humedad estaría favoreciendo la incidencia de enfermedades como roya amarilla, antracnosis en zonas que carecen de un adecuado manejo agronómico.



Plantaciones de café, Estación Chirinos




CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.												
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													22.5	14.6	115.9	18.5
				HINCHAZÓN DE YEMAS												22.6	14.9	31.4	18.8	
				BOTÓN FLORAL												23.0	15.3	34.7	19.2	
				FLORACIÓN												22.9	15.5	18.2	19.2	
				FRUCTIFICACIÓN												22.6	15.8	775.4	19.2	
				MADURACIÓN																

				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.												
CHONTALI	CAFÉ (Bajo secano)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													23.1	13.6	82.0	18.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS												23.4	14.0	10.0	18.7	
				BOTÓN FLORAL												24.0	14.7	40.3	19.4	
				FLORACIÓN												25.2	14.7	83.0	19.9	
				FRUCTIFICACIÓN												25.3	14.9	797.3	20.1	
				MADURACIÓN																

AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas) el cultivo de café de la variedad Geisha continua en plena fructificación presentando estado bueno. Las lluvias (54.6 mm) en la semana favorecieron el llenado y desarrollo de las bayas.




CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS														TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													26.1	15.8	74.1	21.0
				FRUCTIFICACIÓN														16.4	899.9	
				MADURACIÓN																



CAFÉ

HUÁNUCO

En la CO-La Divisoria, distrito de Hermilio Valdizán, el cultivo de café variedad Catimor, se encuentra en la fase fenológica de fructificación. Durante la semana, las condiciones continuaron favorables, con disponibilidad hídrica en el suelo y temperaturas dentro de lo requerido por el cultivo. Sin embargo, continua apreciándose afectaciones por la presencia de ojo de gallo (*Mycena citricolor*), además de la presencia de líquenes en tallo.




		MONITOREO CAFE ZONA DE PRODUCCIÓN LA DIVISORIA													semana del 10 al 16 de febrero				ÓPTIMO TÉRMICO
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	T (MEDIA)	PP (mm)	
LA DIVISORIA	HERMILO VALDIZAN	HINCHAZON DE YEMAS																	RANGO DE TEMPERATURAS ÓPTIMAS 21,5-29,5 °C
		BOTON FLORAL																	Entre 10-32 °C varios procesos fisiologicos se inhiben
		FLORACION																	Temperatura optima 21°C
		FRUCTIFICACION													21.7	16.2	19.0	48.3	Temperatura mínima absoluta critica 10 °C
		MADURACION																	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO



Estación La Divisoria, cultivo de café

HUÁNUCO

En la zona de Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, el cultivo de cacao variedad CCN 51, continuo en la fase fenológica de fructificación. Durante la semana, las condiciones climáticas han sido favorables, debido a las lluvias que han proporcionan la humedad necesaria para el llenado y crecimiento de la mazorca, además de las temperaturas entre sus normales.




MONITOREO CACAO ZONA DE PRODUCCIÓN AUCAYACU																					
																		semana del 10 al 16 de febrero			
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	T media	PP(mm)	ÓPTIMO TÉRMICO		
AUCAYACU	JOSE CRESPO Y CASTILLO	BOTON FLORAL																	RANGO DE TEMPERATURAS ÓPTIMAS 21,5-29,5 °C		
		FLORACION																	Entre 10-15 °C varios procesos fisiologicos se inhiben,		
		FRUCTIFICACION														30	21.5	25.8	126.3	Temperatura mínima absoluta crítica 10 °C	
		MADURACION																		PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO	



Estación Aucayacu, cultivo de Cacao

HUÁNUCO

En la estación de Tulumayo, distrito de José Crespo y Castillo, las plantaciones de cacao variedad CCN 51, continuaron en la fase fenológica de maduración. Las precipitaciones en la semana vienen generando daños por exceso de humedad, como asfixia radicular y el incremento de enfermedades fungosas. Con respecto a las temperaturas diurnas y nocturnas estas se mantuvieron alrededor de sus normales.




MONITOREO CACAO ZONA DE PRODUCCIÓN TULUMAYO																					
		semana del 10 al 16 de febrero																			
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Tmax	Tmin	T MEDIA	PP (mm)	ÓPTIMO TÉRMICO		
TULUMAYO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	BOTON FLORAL																	RANGO DE TEMPERATURAS OPTIMA 21,5-29,5 °C		
		FLORACION																	Entre 10-15 °C varios procesos fisiologicos se inhiben,		
		FRUCTIFICACION																	Temperatura mínima absoluta critica 10 °C		
		MADURACION														30.1	21.4	25.8	54.8	PRECIPITACION MINIMA DE 1200 mm BIEN DISTRIBUIDAS EN EL AÑO	



Estación Tulumayo, cultivo de cacao

CUSCO

En las zonas de monitoreo de Quebrada Yanatile, el café (variedad Catimor bajo sombra) se encontró en la fase de maduración. Este desarrollo ha sido favorecido por la prevalencia de precipitaciones (65.8 mm) y temperaturas que se mantienen dentro de sus rangos normales. No obstante, la persistencia de la alta humedad relativa derivada de las lluvias continua propiciando la aparición de 'mancha de hierro', antracnosis entre otras en algunas plantas con deficiente manejo agronómico y nutricional.



DEPARTAMENTO CUSCO																				
MONITOREO DE CULTIVO DE CAFÉ																				
ESTACIÓN QUEBRADA YANATILE: FASES FENOLÓGICAS DEL CAFÉ CATIMOR																				
FENOLOGIA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO		
ESTACION	FASES	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tmax	Tmin	PP	Tmed.	Tc. Baja	Tc. Alta	T. Optima
QUEBRADA YANATILE	REPOSO VEGETATIVO																			
	HINCHAZÓN DE YEMAS																	0	15	18 - 22
	BOTÓN FLORAL													29.80	14.53	4.20	22.17	15	25	18 - 22
	FLORACIÓN													29.97	17.01	13.82	23.49	15	28	18 - 24
	FRUCTIFICACIÓN													30.16	17.35	996.70	23.75	15	28	18 - 24
	MADURACIÓN													29.84	17.81	65.80	23.83	15	28	18 - 24



Plantaciones de café, Estación Quebrada Yanatile



CAFÉ