



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 17 al 23 marzo del 2026

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

SAN MARTÍN

En la región San Martín, el cultivo de café continúa en fase de maduración, con estado bueno, como se observa en la zona de Pacayzapa. Durante la semana, las temperaturas máximas y mínimas estuvieron sobre sus normales y entre sus habituales climáticas, mientras que las precipitaciones se mostraron ausentes en la zona, hecho que incremento la infestación de Broca del café.




Estación Pacayzapa, cultivo de café en maduración

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMA	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta		
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2012)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0		
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2025	31/07/2025														28.0	23.0	18.0	20.8	10.0	18.0	22.0	30.0	
		BOTÓN FLORAL	1/08/2025	19/08/2025														30.3	23.8	17.3	2.9	10.0	18.0	22.0	30.0	
		FLORACIÓN	20/08/2025	12/09/2025														29.4	23.5	17.5	17.5	10.0	18.0	22.0	30.0	
		FRUCTIFICACIÓN	13/09/2025	27/12/2025														30.5	25.1	19.7	12.2	10.0	18.0	22.0	30.0	
		MADURACIÓN	28/12/2025														30.6	25.0	19.4	55.0	10.0	18.0	22.0	30.0		

SAN MARTÍN

El cultivo de cacao en la estación Pilluana se encontró en la fase fenologica de maduración con estado bueno. Durante la semana las temperaturas se mostraron valores sobre sus normales y las lluvias se mostraron deficitarias, lo que podrían estar afectado el normal desarrollo de la mazorcas.




Estación Pilluana, cultivo de cacao en maduración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+	
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO	15/10/2025	20/10/2025													34.2	27.5	20.8	53.4	15.0	23.0	25.0	32.0	
		BOTÓN FLORAL	21/10/2025	15/11/2025														33.5	27.1	20.7	36.1	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	16/11/2025	27/11/2025														34.5	28.3	22.1	41.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	28/11/2025	15/02/2026														31.8	26.2	20.6	57.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	16/02/2026															35.3	28.4	21.4	19.5	15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

El la estacion Pachiza el Cacao de variedad CCN51 se encontro en la fase maduracion. Durante la semana las temperaturas estuvieron sobre sus normales climáticas y las precipitaciones escasas, lo que podria estar influyendo en el desarrollo de la mazorca. Asimismo, en otras zonas de monitoreo se observaron platas en inicio de fructificación.




Estación Pachiza, cultivo de cacao en maduración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																								
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO	1/08/2025														35.0	27.5	19.9	0.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	1/09/2025	25/09/2025													33.1	26.4	19.6	28.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	26/09/2025	20/10/2025													34.0	27.0	20.0	31.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	21/10/2025	20/02/2026													33.5	26.9	20.2	36.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	21/02/2026														33.6	26.9	20.1	29.8	15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

El cultivo de maíz amarillo duro se encuentra actualmente en la fase de aparición de hojas, presentando un estado fitosanitario óptimo. No obstante, durante la última semana las temperaturas superaron sus promedios históricos, mientras que las precipitaciones se mantuvieron por debajo de lo normal. Estas condiciones climáticas podrían inducir estrés hídrico en las plantas, afectando su desarrollo durante esta etapa crítica de crecimiento vegetativo.




Estación La Unión, cultivo de maíz en aparición de hojas

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA	
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Tcalta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del BIAVO) Maíz atlas 777 siembra 15/02/2026	Huallaga Central	EMERGENCIA	20/02/2026	21/02/2026																	10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm	
		APARICIÓN DE HOJAS	22/02/2026															33.1	27.9	22.7	37.6	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA																			10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm	
		ESPIGA																			10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm	
		MADURACIÓN LECHOSA																			10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm	
		MADURACIÓN PASTOSA																			10.0	25.0	33.0	35.0		
		MADURACIÓN CÓRNEA																		10.0	25.0	33.0	35.0			

LORETO

En la estación Manití, se registró promedios de temperaturas máxima de 31,5°C y mínimas de 22.5°C (entre sus normales); las precipitaciones fueron bajo sus valores normales, con acumulados de 29,1 mm. El cultivo de cacao (var. CCN-51) se encuentra en fase de maduración, el periodo fue favorable para el control de moniliasis.




MANITÍ																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																										
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcboja	Top-	Top+	Tcala		
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06- 2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Maniti, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0		
		Botón Floral	24/11/2025	13/12/2025																		18.0	21.0	32.0	35.0	
		Floración	14/12/2025	11/01/2026																		18.0	21.0	32.0	35.0	
		Fructificación	12/01/2026																			18.0	21.0	32.0	35.0	
		Maduración																	31.5	22.5	29.1	27.0	18.0	21.0	32.0	35.0



Estación Maniti, cultivo de cacao en maduración

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, se registró promedios de temperaturas máxima de 31,6°C y mínimas de 24,4°C (entre sus normales); las precipitaciones fueron sobre sus valores normales, con acumulados de 33,5mm. El cultivo de pijuayo se encuentra en fase de maduración con estado bueno.




MAZAN																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																										
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta		
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (río Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	23/03/26															31.6	24.4	33.5	28.0	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Espata																				14.0	24.0	28.0	35.0	
		Inflorescencia																				14.0	24.0	28.0	35.0	
		Floración																				14.0	24.0	28.0	35.0	
		Fructificación																				14.0	24.0	28.0	35.0	
		Maduración																			14.0	24.0	28.0	35.0		



Estación Mazán, cultivo de Pijuayo en maduración

LORETO

En el ámbito de la Estación Puerto Almendras, se registró promedios de temperaturas máxima de 32,8.º C (sobre sus valores normales) y mínimas de 24.1ºC; las precipitaciones fueron bajo sus valores normales, con acumulados de 5 mm. El cultivo de camu camu se encuentra en fase de maduración, desarrollándose adecuadamente en este periodo de creciente de los ríos amazónicos.



PUERTO ALMENDRAS																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU																										
ESTACIÓN PUERTO ALMENDRAS: FASES FENOLOGICAS CAMU CAMU																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES FENOLOGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta		
Puerto Almendras (Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaugh, Fecha de siembra: 14-05-2024)	Localidad de Puerto Almendras (río Nanay. Altitud 93msnm)	Reposo vegetativo	06/03/26															32.8	24.1	5.0	28.5	15.0	21.0	28.0	35.0	
		Hinchazón de yemas																				15.0	21.0	28.0	35.0	
		Apertura de yemas florales																				15.0	21.0	28.0	35.0	
		Botón floral																				15.0	21.0	28.0	35.0	
		Floración																				15.0	21.0	28.0	35.0	
		Fructificación																				15.0	21.0	28.0	35.0	
		Maduración																				15.0	21.0	28.0	35.0	




Estación Puerto Almendras, cultivo de camu camu en reposo vegetativo



CAMU CAMU

LORETO

En la estación San Roque, se registró promedios de temperaturas máxima de 33,7°C y mínimas de 24,7°C, siendo ambas superiores a sus valores normales; las precipitaciones fueron bajo sus valores normales, alcanzando acumulados de 24,3 mm. Los cultivos de plátano y camu camu se encuentran en la fase crecimiento vegetativo, respectivamente. Las condiciones climáticas en este periodo fueron favorables para realizar labores preventivas de plagas y enfermedades.



SAN ROQUE																											
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO																											
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLOGICAS DEL PLÁTANO																											
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO							
		FASES FENOLOGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T ^o Máx	T ^o Mín	Pp	T ^o Med	Tc baja	Top	Top+	Tc alta			
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 07-08-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	07/08/25	08/03/26													34.6	24.7	40.9	29.7	15.0	20.0	32.0	35.0			
		Crecimiento vegetativo	09/03/26															33.7	24.7	24.3	29.2	15.0	20.0	32.0	35.0		
		Inflorescencia																			15.0	20.0	32.0	35.0			
		Floración																			15.0	20.0	32.0	35.0			
		Fructificación																			15.0	20.0	32.0	35.0			
		Maduración																		15.0	20.0	32.0	35.0				

SAN ROQUE																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU																										
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO						
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T _o Máx	T _o Mín	Pp	T _o Med	T _c baja	T _o p	T _o p+	T _c alt		
San Roque Cultivo de camu camu, variedad HBK MC Vaughn, Fecha de siembra: 15-07-2025)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Crecimiento vegetativo	12/08/25														33.7	24.7	24.3	29.2	15.0	21.0	28.0	35.0		
		Hinchazón de yemas																			15.0	21.0	28.0	35.0		
		Apertura de yemas florales																			15.0	21.0	28.0	35.0		
		Botón floral																			15.0	21.0	28.0	35.0		
		Floración																			15.0	21.0	28.0	35.0		
		Fructificación																			15.0	21.0	28.0	35.0		
		Maduración																		15.0	21.0	28.0	35.0			



Cultivo de plátano en crecimiento vegetativo



Cultivo de camu camu en crecimiento vegetativo




CAMU CAMU



PLÁTANO

CAJAMARCA

En las zonas de monitoreo de Chontali las plantaciones de café de la variedad Catimor, continuaron en fructificación con estado bueno. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 12,9°C y 27°C, con una precipitación acumulada de 31 mm. Estas condiciones, asociadas a las lluvias registradas, continúan favoreciendo el crecimiento de las bayas y el buen estado fitosanitario del cultivo de café.




ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS	FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
																	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo seco)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													23.1	13.6	82.0	18.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS													23.4	14.0	10.0	18.7
				BOTÓN FLORAL													24.0	14.7	40.3	19.4
				FLORACIÓN													25.2	14.7	83.0	19.9
				FRUCTIFICACIÓN													25.1	14.8	968.9	20.0
				MADURACIÓN																

CAFÉ

AMAZONAS

En la zona de El Palto, en la región Amazonas, se registraron temperaturas máximas y mínimas dentro de los rangos normales para las áreas cafetaleras. Asimismo, se reportaron precipitaciones acumuladas de 5,0 mm, respectivamente. Estas condiciones, asociadas a las lluvias registradas y la humedad remanente de la semana previa, continúan favoreciendo el adecuado desarrollo fenológico y el buen estado fitosanitario del cultivo de café de la variedad Geisha.



CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													26.1	15.8	74.1	21.0
				FRUCTIFICACIÓN														16.4	1112.2	
				MADURACIÓN																