

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 21 al 27 de noviembre 2023.



Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.



SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":


ingresa al siguiente link para mas información : <https://forms.gle/sD25ahaaj4bzkZMq8> ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

SAN MARTIN

En la zona de Alto Mayo-Pacayzapa, las plantaciones de café variedad Catimor, se encontraron en fructificación con estado bueno, favorecido por las lluvias reportadas durante la tercera década de 13.3 mm. Respecto a las condiciones térmicas estuvieron por encima de sus normales climáticas (T_{máx.} 34.8 °C) y debajo de sus normales (T_{mín.} 18 °C).

RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN - PACAYZAPA



Plantaciones de café en fase de fructificación en la zona-Alto Mayo.


MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMA	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2022)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																29.8	23.5	17.2	20.1	10.0	18.0	22.0	30.0
		HINCHAZÓN DE YEMAS	20/06/2023	25/06/2023														31.0	23.9	16.8	60.0	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	26/07/2023	19/08/2023														31.4	24.8	18.2	10.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN	20/08/2023	24/09/2023														32.5	25.9	19.3	13.6	10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN	25/09/2023																			10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN																				10.0	18.0	22.0	30.0

SAN MARTIN

En la estación Pilluana, las plantaciones de cacao variedad CCN51, se encontraron en la fase de fructificación y maduración mayoritariamente; durante la ultima década, las condiciones térmicas diurnas alrededor de sus normales (Tmax de 38.2) y nocturnas sobre sus normales históricas (Tmin de 21 °C), además, las precipitaciones de 42.6 mm generaron condiciones favorables para el crecimiento del fruto.

TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIONES - PILLUANA




Plantaciones de cacao en fase fenológica de fructificación y maduración en estado bueno en la estación Pilluana.

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Top+	Top+
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO	11/06/2023	20/06/2023																	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	21/06/2023	4/07/2023													34.3	27.1	19.8	8.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	5/07/2023	22/07/2023													33.5	26.8	20.0	4.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	23/07/2023	12/09/2023													32.2	26.0	19.8	20.4	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	13/09/2023														35.6	28.8	22.0	52.9	15.0	23.0	25.0	32.0

SAN MARTÍN

En la estación de la Unión, el cultivo de Maíz variedad híbrido Atlas 777 manejando bajo riego, se encontró en la fase de maduración lechosa e inicios de maduración pastosa con estado bueno, por efecto de las precipitaciones oportunas de 23.5 mm en las fases críticas del cultivo. Además, las condiciones térmicas estuvieron por encima de sus normales (temperatura máxima de hasta 36.8°C y mínima de 22.8 °C).




Cultivo de Maíz en fase de maduración lechosa con estado bueno en la estación Unión

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA	
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Talta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del Biavo)	Huallaga Central Fecha de siembra 09/09/2023	EMERGENCIA	14/09/2023	17/09/2023													34.4	28.1	21.7	68.2	10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm	
		APARICIÓN DE HOJAS	18/09/2023	28/10/2023														35.8	29.0	22.1	25.1	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA	29/10/2023	6/11/2023														33.1	28.5	23.8	49.5	10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA	7/11/2023	14/11/2023														33.1	28.2	23.3	65.1	10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA	15/11/2023	26/11/2023														35.2	29.4	23.6	8.3	10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA	27/11/2023															34.6	29.0	23.4	23.5	10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN CÓRNEA																				10.0	25.0	33.0	35.0	

PUNO

En la estación Tambopata, el cultivo de café variedad Caturra roja, continuo en la fase fructificación, manteniendo estado bueno. En la semana, se registraron lluvias esporádicas, además de condiciones térmicas diurnas y nocturnas cálidas (temperatura máxima de hasta 31.58°C y mínima de 29.71); sin afectar al cultivo por el momento.



Plantaciones de café en fase de fructificación en la estación Tambopata.

