



PERÚ


Ministerio del
Ambiente



BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

N° 311

PRONÓSTICO DE CONDICIONES AGROMETEOROLÓGICAS FAVORABLES PARA LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES



06 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024

- ✓ Roya del café
- ✓ Moho gris de la fresa
- ✓ Antracnosis del mango

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2024 -2025




Roya del café

(*Hemileia vastatrix* Berk. & Broome)

Mapas de pronóstico de las condiciones ambientales para los próximos 4 días


Pronóstico para el: 06/11/2024




Las condiciones agrometeorológicas se presentarían favorables y **muy favorables** para la infección por roya del café en el ámbito de las estaciones meteorológicas del SENAMHI ubicadas en Jepelacio (San Martín), Villa Rica (Pasco) y Satipo (Junín).

En la selva norte se espera que las lluvias se sitúen entre lo normal y por encima de lo normal, temperaturas tanto máximas como mínimas en rangos normales o superiores a lo normal, estas condiciones podría dificultar un adecuado desarrollo fitosanitario en las plantaciones de café.


Pronóstico para el: 07/11/2024



Pronóstico para el: 08/11/2024



Pronóstico para el: 09/11/2024



AMIGA Y AMIGO AGRICULTOR

Los mapas presentan el pronóstico de las condiciones ambientales favorables para que la enfermedad se presente. Este pronóstico es realizado a nivel de estación meteorológica en el ámbito del sector cafetalero.

El boletín genera información correspondiente a condiciones de clima (temperatura, precipitación y humedad relativa) existentes en el campo agrícola, indicando el momento en que se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de roya del café.

MONITOREO Y PRONÓSTICO

Condiciones ambientales para roya del café

Fecha: 09 de octubre al 09 de noviembre del 2024

Ubicación de las estaciones meteorológicas




Índice de riesgo pronosticado

DEPARTAMENTO	ESTACIÓN	ALTITUD	ÍNDICE DE RIESGO*
CAJAMARCA	San Ignacio	1243	0.58
CAJAMARCA	Chirinos	1784	0.58
CAJAMARCA	San Miguel	1529	0.58
CAJAMARCA	Huarango Casado	1612	0.58
CAJAMARCA	San Francisco	1784	0.58
SAN MARTIN	Naranjillo	882	0.5
SAN MARTIN	Moyobamba	879	1
SAN MARTIN	Jepelacio	1057	1
PASCO	Villa Rica	1466	1
JUNÍN	Satipo	577	1
CUSCO	Quillabamba	1001	0.1

* Corresponde al mayor valor alcanzado durante el periodo pronosticado

ÍNDICE DE RIESGO	
0 - 0.5	POCO FAVORABLE
0.5 - 0.75	FAVORABLE
0.5 - 1	MUY FAVORABLE

Caracterización de las condiciones ambientales – Roya del café



Reporte de las 19:00h de un día cualquiera hasta las 19:00h del último día

NOTA: Producto experimental en etapa de evaluación

Condiciones meteorológicas que favorecen la infección y diseminación de la roya del café

 Agua libre
> 6 horas

 Humedad
> 90 %

 Temperaturas
22°C a 25°C

 Vientos

 Lluvias
< 10 mm

Signo de la enfermedad

Recomendaciones:

- Estar informado acerca de las condiciones meteorológicas a través de los [avisos meteorológicos](#)¹ y [pronósticos climáticos](#)² que emite el SENAMHI.
- Si las condiciones meteorológicas son favorables o muy favorables para la incidencia de la roya del café, evaluar el estado fitosanitario del cultivo para la adopción de medidas de control oportuno en caso sea necesario.
- En parcelas que ya fueron cosechadas, proceder al recojo y/o destrucción de restos de la campaña anterior para eliminar posibles fuente de inóculo de la enfermedad.

1 <https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico>


2 <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

- La determinación de las condiciones agrometeorológicas favorables para la roya del café, se realiza con el modelo genérico de infección para patógenos fúngicos foliares (Magarey et al., 2005), teniendo en cuenta los parámetros meteorológicos de: temperatura (°C), precipitación (mm) y humedad relativa (%).
- El modelo utiliza datos de pronóstico por hora obtenido del Modelo numérico GFS (Global Forecast System) de la Agencia de los Estados Unidos NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) con una resolución espacial de 27x27 km.

Moho gris de la fresa (*Botrytis cinerea* Pers.) Costa central – Región Lima


Mapas de pronóstico de las condiciones ambientales para los próximos 4 días

Pronóstico para el: **06/11/2024**




Las condiciones agrometeorológicas serían **poco favorables** para la infección por moho gris; sin embargo, es más probable que las temperaturas mínimas del aire se sitúen entre normal y por debajo de lo normal en la costa norte, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre lo normal y por encima de lo normal, esto podría favorecer un eventual desarrollo del patógeno.


Pronóstico para el: **07/11/2024**



Pronóstico para el: **08/11/2024**



Pronóstico para el: **09/11/2024**



AMIGO AGRICULTOR

Los mapas presentan las condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa) favorables para que la enfermedad se presente en las zonas aledañas a las estaciones meteorológicas del SENAMHI

El boletín genera información correspondiente a condiciones de clima (temperatura y humedad relativa) existentes en el campo agrícola, indicando el momento en que se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de moho gris de la fresa.

MONITOREO Y PRONÓSTICO

Condiciones ambientales para el moho gris de la fresa

Fecha: 09 de octubre al 09 de noviembre del 2024

Ubicación de las estaciones meteorológicas




Índice de riesgo pronosticado

DEPARTAMENTO	ESTACION	ALTITUD	ÍNDICE DE RIESGO*
LIMA	Donoso	127	0.543
LIMA	Puente Magdalena	935	0
LIMA	Carabayllo	179	0.167
LIMA	Donoso	116	0.543

* Corresponde al mayor valor alcanzado durante el periodo pronosticado

ÍNDICE DE RIESGO	
0 - 0.5	POCO FAVORABLE
0.5 - 0.75	FAVORABLE
0.5 - 1	MUY FAVORABLE

Caracterización de las condiciones ambientales – Moho gris de la fresa



■ Poco favorable
 ■ Favorable
 ■ Muy favorable
 ■ Sin dato

Reporte de las 19:00h de un día cualquiera hasta las 19:00h del ultimo día

NOTA: Producto experimental en etapa de evaluación

Condiciones agrometeorológicas que favorecen la infección por moho gris en cultivo de fresa



Humedad relativa
> 90 %

Temperaturas
15°C a 22°C

Recomendaciones:

- Estar informado acerca de las condiciones meteorológicas a través de los [avisos meteorológicos](#)¹ y [pronósticos climáticos](#)² que emite el SENAMHI .
- Si las condiciones meteorológicas son favorables o muy favorables para la incidencia del moho gris, evaluar el estado fitosanitario de los cultivos para la adopción de medidas de control oportuno en caso sea necesario con la finalidad de evitar pérdidas y daños durante la post cosecha del cultivo de fresa.
- En parcelas que ya fueron cosechadas, proceder al recojo y/o destrucción de restos de la cosecha anterior para eliminar posibles fuentes de inóculo de la enfermedad.

1 <https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico>

2 <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>


- La determinación de las condiciones agrometeorológicas favorables para el moho gris, se realiza con la ecuación de Bulger et al., 1988, teniendo en cuenta parámetros meteorológicos de: temperatura (°C) y humedad relativa (%).
- El modelo utiliza datos de pronóstico por hora obtenido del GFS (Global Forecast System) de la Agencia de los Estados Unidos NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) con una resolución espacial de 27x27 km.

Antracnosis del mango (*Colletotrichum gloeosporioides*) Costa central y costa norte

Mapas de pronóstico de las condiciones ambientales para los próximos 4 días

Las condiciones agrometeorológicas serían **poco favorables** para la infección por antracnosis; sin embargo, no se descarta posibles infecciones por el patógeno en hojas y tallos durante el desarrollo reproductivo de las plantaciones de mango en la costa norte debido a que las temperaturas mínimas del aire se sitúen entre normal y por debajo de lo normal, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre lo normal y por encima de lo normal.

Pronóstico para el: **06/11/2024**




Pronóstico para el: **07/11/2024**



Pronóstico para el: **08/11/2024**



Pronóstico para el: **09/11/2024**



AMIGO AGRICULTOR

Los mapas presentan las condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa) favorables para que la enfermedad se presente en las zonas aledañas a las estaciones meteorológicas del SENAMHI

El boletín genera información correspondiente a condiciones de clima (temperatura y humedad relativa) existentes en el campo agrícola, indicando el momento en que se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de la antracnosis del mango.



PERÚ Ministerio del Ambiente




MONITOREO Y PRONÓSTICO

Condiciones ambientales para antracnosis del mango

Fecha: 09 de octubre al 09 de noviembre del 2024

Ubicación de las estaciones meteorológicas




Índice de riesgo pronosticado

DEPARTAMENTO	ESTACION	ALTITUD	ÍNDICE DE RIESGO*
PIURA	Chulucanas	89	0.02
LAMBAYEQUE	Tongorrape	180	0.09
ANCASH	Buena Vista	206	0.15
LIMA	Donoso	127	0.19
LIMA	Carabayllo	179	0.08
LIMA	Canete	116	0.10

* Corresponde al mayor valor alcanzado durante el periodo pronosticado

ÍNDICE DE RIESGO	
0 - 0.15	POCO FAVORABLE
0.15 - 0.5	FAVORABLE
0.5 - 1	MUY FAVORABLE

Caracterización de las condiciones ambientales – Antracnosis del mango



Reporte de las 19:00h de un día cualquiera hasta las 19:00h del último día

NOTA: Producto experimental en etapa de evaluación

Condiciones agrometeorológicas que favorecen la infección por antracnosis en cultivo de mango

Humedad relativa
>90 %

Temperaturas
25°C a 30°C

Recomendaciones:

- Estar informado acerca de las condiciones meteorológicas a través de los [avisos meteorológicos](#)¹ y [pronósticos climáticos](#)² que emite el SENAMHI .
- Si las condiciones meteorológicas son favorables o muy favorables para la incidencia de antracnosis, proceder a evaluar el estado fitosanitario de los cultivos para la adopción de medidas de control oportuno en caso sea necesario, de este modo evitar posibles daños y pérdidas durante la post cosecha del cultivo.
- En parcelas que ya fueron cosechadas, proceder al recojo y/o destrucción de restos de la campaña anterior para eliminar posibles fuentes de inóculo de la enfermedad.

1 <https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico>

2 <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

- La determinación de las condiciones agrometeorológicas favorables para antracnosis, se realiza con la ecuación de Wilson et al., 1990, tomando en cuenta parámetros meteorológicos de: temperatura (°C) y humedad relativa (%).
- El modelo utiliza datos de pronóstico por hora obtenido del GFS (Global Forecast System) de la Agencia de los Estados Unidos NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) con una resolución espacial de 27x27 km.