

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

NOVIEMBRE - ENERO

CULTIVO: MAÍZ

Fuente: Agencia CyTA

Para el periodo noviembre 2023 - enero 2024, en la sierra sur oriental se prevé condiciones térmicas diurnas superiores a lo normal y nocturnas entre normal y superiores a su variabilidad climática. Respecto a las precipitaciones, se prevé valores de lluvias normales a inferiores a su promedio histórico.

ZONA PRODUCTORA DE CUSCO

En la parte central y sur del Cusco para el mes de noviembre se puede apreciar que los niveles de riesgo se encontrarían entre bajo y medio, debido principalmente a las condiciones cálidas diurnas y nocturnas previstas, así como al pronóstico de lluvias dentro y por debajo de lo normal; en aquellas localidades donde se prevé condiciones de ligero incremento de humedad, estas podrían favorecer las plantaciones en curso sembradas bajo condiciones de riego (Caicay, Cusipata, Pisac y Urubamba) de la campaña agrícola 2023-2024. Hacia diciembre y enero, se estima que los niveles de riesgo agroclimático persistan con niveles de medio, especialmente hacia enero debido a la prevalencia de lluvias dentro e inferiores a su promedio histórico que podrían afectar el desarrollo vegetativo (formación de hojas) y reproductivo (floración).



Asimismo, se prevé que el riesgo agroclimático sea de bajo a medio para el inicio de labores de labranza y siembras (campaña agrícola 2023-2024) de los sistemas bajo secano debido a que los probables escenarios de lluvias se encuentre dentro y por debajo de lo esperado (Acomayo, Paruro, Caccta, Colequepata, entre otros).

ZONA PRODUCTORA DE APURÍMAC

En la sierra de Apurímac, los terrenos con monitoreo fenológico se reportan en descanso por lo que el nivel de riesgo agroclimático prevalecería bajo y podría aumentar a medio para aquellas siembras que hayan iniciado en octubre (Tambobamba), debido a que las condiciones térmicas cálidas y lluvias previstas dentro y por debajo de lo normal afectarían la disponibilidad hídrica de las primeras fases vegetativas del maíz amiláceo.

Hacia diciembre y enero, se estima un incremento en los niveles de riesgo agroclimático con prevalencia de medio, puesto que se estima que las plantaciones en pleno crecimiento y desarrollo vegetativo, así como el inicio de algunas siembras (Curahuasi) se vean perjudicadas por la persistencia de condiciones cálidas en su mayoría, y el probable déficit de lluvias, especialmente hacia enero.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ




PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Diciembre 2023



PERÚ Ministerio del Ambiente



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024