

# PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

## SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2025

### CULTIVO: MAÍZ

Fuente: Agencia CyTA

En la sierra sur oriental, para los meses de setiembre y octubre de 2025, se prevé que las temperaturas máximas se mantengan por encima de sus valores normales. Respecto a las temperaturas mínimas, en setiembre se esperan valores superiores a su climatología habitual, mientras que en octubre se proyecta que se ubiquen dentro de sus rangos normales. En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que los acumulados se presenten entre niveles normales a inferiores a lo normal.

#### ZONA PRODUCTORA DE CUSCO

Para la zona productiva del Cusco, durante el mes de setiembre, se prevé un nivel de riesgo agroclimático entre **bajo y medio**. Esta condición se explica por la persistencia de temperaturas cálidas durante el día, las cuales incrementan la evapotranspiración potencial, reduciendo la humedad disponible en el suelo y generando una mayor demanda hídrica. Asimismo, la combinación de altas temperaturas y baja humedad relativa crea condiciones favorables para la proliferación de plagas como el gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*), gusano picador (*Feltia* sp.) y gusano de tierra (*Agrotis* sp.), entre otras. De no aplicarse medidas preventivas, estos factores podrían comprometer el desarrollo inicial del cultivo.

Para el mes de octubre, se estima que el nivel de riesgo agroclimático se mantenga en rangos de **bajo a medio**, debido a que los acumulados de precipitación se prevén por debajo de sus valores normales. Esta condición podría retrasar la instalación de cultivos en sistemas de producción bajo secano, comprometiendo la oportunidad de siembra y el desarrollo inicial del maíz.



*\* Bajo estas circunstancias, se recomienda intensificar los riegos de manera oportuna para asegurar las fases iniciales de germinación, emergencia y establecimiento del cultivo de maíz.*

#### ZONA PRODUCTORA DE APURÍMAC

Para la zona productiva de Apurímac, durante el mes de setiembre, se prevé un nivel de riesgo agroclimático entre **bajo y medio**. Esta condición está asociada a la persistencia de temperaturas diurnas elevadas, lo que reduciría la humedad edáfica disponible, generando una mayor demanda hídrica en los cultivos recientemente instalados. Adicionalmente, la combinación de altas temperaturas con baja humedad relativa favorecería la proliferación de plagas de importancia económica, tales como el gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*), el gusano picador (*Feltia* sp.) y el gusano de tierra (*Agrotis* sp.), entre otros.

Para el mes de octubre, se estima que el nivel de riesgo agroclimático se mantenga en rangos de **bajo a medio**, debido a que los acumulados de precipitación se proyectan por debajo de sus valores normales, lo que incrementaría la probabilidad de estrés hídrico y térmico en plántulas, reduciendo el vigor inicial del cultivo. Asimismo bajo este escenario se podría retrasar la instalación de cultivos en sistemas de producción bajo secano, comprometiendo la sincronización de la siembra.

**PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,**  
**SUSCRIBETE AQUÍ**



## TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción.

**PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN EN OCTUBRE 2025**



PERÚ  
Ministerio  
del Ambiente

