

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

FEBRERO - MARZO 2026

CULTIVO: MAÍZ

Fuente: Agencia CyTA

En la sierra sur oriental, para los meses de febrero y marzo del 2026, se prevé que las temperaturas máximas se mantengan dentro y por encima de sus valores normales. Respecto a las temperaturas mínimas, se esperaría que se encuentren dentro de su climatología. En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que los acumulados se presenten entre dentro y superiores a sus niveles normales.

ZONA PRODUCTORA DE CUSCO

Para la zona productiva del Cusco, durante el mes de **febrero y marzo** se prevé un nivel de riesgo agroclimático entre **bajo y medio**. Debido a las precipitaciones previstas, se espera que las etapas críticas de desarrollo de los cultivos se vean favorecidas por el adecuado aporte de humedad en el suelo, lo cual contribuiría al normal crecimiento y llenado de granos. No obstante, no se descarta la posible incidencia de problemas fitosanitarios asociados a la alta humedad ambiental y a la saturación del suelo, especialmente en parcelas con limitaciones de drenaje. Estas condiciones podrían generar estrés radicular, clorosis por deficiencias inducidas y mayor predisposición al ataque de patógenos fúngicos.

Asimismo, en los valles interandinos como Pisac, Ollantaytambo, Calca y Urubamba, particularmente en los campos destinados a la producción de grano seco, el exceso de humedad y la persistencia de nubosidad podrían retrasar el proceso de maduración fisiológica en las siembras oportunas, prolongando el ciclo del cultivo y afectando la uniformidad y oportunidad de cosecha.

*Sin embargo, para ambos departamentos no se descarta la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, como incremento de la velocidad de viento, lluvias intensas y granizadas de corta duración.

ZONA PRODUCTORA DE APURÍMAC

Para la zona productiva de Apurímac, durante el mes de **febrero y marzo**, se prevé un nivel de riesgo agroclimático entre **bajo y medio**. Se prevé la continuidad de las precipitaciones, las cuales favorecerían la recuperación escalonada del cultivo, principalmente en etapas vegetativas y reproductivas. No obstante, en las zonas altas de Chincheros y Andahuaylas, las lluvias previstas podrían generar problemas de saturación de suelos, especialmente en parcelas con drenaje limitado.

El exceso de humedad, sumado a temperaturas cálidas y a una alta densidad de plantas, podría generar un microclima favorable para la proliferación de plagas y enfermedades. En consecuencia, estas condiciones podrían comprometer el estado fitosanitario y afectar el rendimiento esperado del cultivo.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413

Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



**¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!**



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción.

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN EN MARZO 2026



PERÚ Ministerio del Ambiente



¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!