AÑO: IV
EDICIÓN v
FEBRERO 2024

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO FEBRERO-ABRIL CULTIVO: MAÍZ


Fuente: Agencia CyTA

Para el periodo febrero - abril 2024, en la sierra sur oriental se prevé la prevalencia de condiciones térmicas diurnas y nocturnas superiores a lo normal. Respecto a las precipitaciones, se prevé valores de lluvias de normales a inferiores a su promedio histórico durante febrero y marzo, y una prevalencia de lluvias superiores a su normal hacia abril.

ZONA PRODUCTORA DE CUSCO

En la parte central y sur del Cusco, hacia febrero y marzo, se puede apreciar que los niveles de riesgo se mantendrían entre bajo a medio, condicionado principalmente al régimen térmico cálido previsto así como al pronóstico de lluvias dentro y por debajo de lo normal; en aquellas localidades manejadas bajo riego, las condiciones cálidas favorecería la fase reproductiva (espiga y maduración del grano) de las plantaciones en curso como en Caicay, Cusipata, Pisac y Urubamba de la campaña agrícola 2023-2024. Hacia abril, se estima que los niveles de riesgo agroclimático predominen con valores de medio y alto, debido a que la prevalencia de lluvias superiores a su promedio histórico que podrían condicionar la fase de maduración y cosecha de los cultivos.

En relación a los sistema agrícolas bajo secano, se estima que el riesgo agroclimático sea de medio a alto para el desarrollo de la fase reproductiva debido a que se prevén lluvias dentro y por debajo de lo normal aunado a temperaturas cálidas durante estos meses que continuarían retrasando el desarrollo normal de las plantaciones (Acomayo, Paruro, Caccta, Colquepata, entre otros); sin embargo, las lluvias previstas hacia abril, favorecería el llenado de grano de aquellos cultivo con siembras tardías.

ZONA PRODUCTORA DE APURÍMAC

En la sierra de Apurímac, durante febrero y marzo, se estiman niveles de riesgo medio para localidades como Curahuasi cuyas plantaciones manejadas bajo riego se encuentran en fase de aparición de hojas, por lo que las condiciones de lluvias por debajo de lo normal no generarían mayor afectación durante este periodo. En aquellas localidades donde se haya iniciado siembras tardías (octubre) como en Tambobamba, el riesgo podría incrementarse a alto, debido a que las condiciones térmicas cálidas y lluvias previstas por debajo de lo normal afectarían la disponibilidad hídrica del inicio de floración y la formación de espiga del maíz amiláceo.

Hacia abril, las condiciones de lluvias previstas favorecería el estado de los cultivos manejados bajo secano, por lo que fase de formación y llenado de grano se vería beneficiada (Andahuaylas y Curahuasi); sin embargo, tener en cuenta que el régimen térmico continuaría cálido, afectando a aquellas plantaciones que venían presentando síntomas de marchitez, estimándose un nivel de riesgo prevalecería de medio a alto.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO PERÚ 2024


N
W
E
S
15°0'0"S
15°0'0"S
Riesgo Agroclimático
Febrero 2024
riesagro_maiz
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO
ESCALA: 1:2000000
ELABORACIÓN:
MAPA N°


N
W
E
S
15°0'0"S
15°0'0"S
Riesgo Agroclimático
Marzo 2024
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO
ESCALA: 1:2000000
ELABORACIÓN:
MAPA N°



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Marzo 2024