




Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de febrero de 2026

De acuerdo al [Aviso N°047](#), la franja costera viene registrando lluvias de ligera a moderada intensidad. Este escenario representa un factor de riesgo en las áreas donde se están realizando labores de poda en plantas de arándano como parte del manejo agronómico, por lo que resulta fundamental el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para una adecuada planificación y ejecución de las labores agrícolas.



Tener en cuenta

Próxima Actualización: 25 de febrero de 2026

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

1º Década de febrero de 2026 (1 al 10 de febrero)

El cultivo de arándano se encuentra en su fase de maduración en los campos monitoreados de Lambayeque (Cayaltí)¹ y La Libertad (Chao y San José). Paralelamente, se identifica que en ciertas parcelas la cosecha ya ha concluido y estarían en labores de poda.



Tener en cuenta

- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arándano observado al 10 de febrero del 2026, asimismo en el ámbito de las estaciones, las diferentes variedades de arándano pueden tener fases fenológicas distintas según el manejo agronómico que se le aplique y según los inicios de cada campaña.

¹ Parcelas con monitoreo remoto.

Impactos del clima en el cultivo arándano



En la costa norte, las temperaturas diurnas promedio fueron de 32.6°C y las nocturnas llegaron a 22.3°C. Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron entorno a sus valores normales. Además, se registraron lluvias durante los últimos diez días de 22.3 mm, siendo superior a sus valores habituales. Es fundamental intensificar el monitoreo en áreas recientemente podadas, ya que las heridas de corte constituyen una vía directa de entrada para patógenos. Esta situación se ve agravada durante periodos de lluvias, las cuales favorecen la dispersión, germinación e infección de hongos causantes de enfermedades de la madera en el cultivo de arándano.

La costa central presentó temperaturas diurnas promedio de 29.7°C, mientras que las nocturnas registraron 19.6°C. Las condiciones térmicas diurnas ligeramente cálidas y nocturnas entorno a sus valores normales. Se reportaron precipitaciones de 0.2 mm en la región durante los últimos diez días. Las condiciones térmicas actuales están impulsando el crecimiento vegetativo del cultivo en determinadas zonas, lo cual resalta la importancia de asegurar un manejo nutricional equilibrado y una adecuada provisión hídrica para sostener este desarrollo.

En la costa sur, las temperaturas diurnas y nocturnas reportaron un promedio de 30.6°C y 19.9°C respectivamente. Además, se presentaron condiciones diurnas y nocturnas ligeramente cálidas. Se registró un acumulado de lluvias de 0.5 mm durante los últimos diez días.

En el gráfico N° 1 y 2 se observan las anomalías de temperatura diurna y nocturna en la franja costera como referencia de las localidades donde se encuentra el cultivo de arándano.

