




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de febrero al 05 de marzo de 2026

De acuerdo con el [Aviso N° 060](#), aún vigente, en la costa norte se estarían presentando lluvias ligeras y dispersas. Estas precipitaciones generan un escenario de riesgo en las áreas donde se realizaron labores de poda en plantas de arándano, ya que la humedad incrementa la probabilidad de infecciones. Asimismo, en plantaciones con alta densidad de siembra pueden formarse microclimas que, al combinarse con temperaturas cálidas, crean condiciones favorables para el desarrollo y la proliferación de hongos fitopatógenos asociados al cultivo de arándano. Ante ello es importante el monitoreo de las condiciones agrometeorológicas y su interacción con el cultivo de arándano.



Próxima Actualización: 04 de marzo de 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

2° Década de febrero de 2026 (11 al 20 de febrero)

El cultivo de arándano se encuentra predominantemente en su fase de **brotamiento vegetativo** en los campos monitoreados de Lambayeque (Cayaltí)¹ y La Libertad (Chao y San José).



Tener en cuenta

- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arándano observado al 20 de febrero del 2026, asimismo en el ámbito de las estaciones, las diferentes variedades de arándano pueden tener fases fenológicas distintas según el manejo agronómico que se le aplique y según los inicios de cada campaña.

¹ Parcelas con monitoreo remoto.

Impactos del clima en el cultivo arándano



En la costa norte, las temperaturas diurnas promedio fueron de 32.2 °C y las nocturnas llegaron a 22.9 °C. Las condiciones térmicas diurnas fueron en torno a sus valores normales y nocturnas ligeramente cálidas. Además, se registraron lluvias durante los últimos diez días de 59.4 mm, siendo superior a sus valores habituales. Es fundamental intensificar el monitoreo en áreas recientemente podadas, ya que las heridas facilitan el ingreso de patógenos, especialmente durante los periodos de lluvia. La alta humedad y las temperaturas cálidas crean un microclima favorable para el desarrollo de hongos asociados a enfermedades de la madera en arándanos, aumentando el riesgo y la severidad de las infecciones.

La costa central presentó temperaturas diurnas promedio de 30.8 °C, mientras que las nocturnas registraron 22.9 °C. Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron ligeramente cálidas. Se reportaron precipitaciones de 2.5 mm en la región durante los últimos diez días, superior a sus valores normales. Las temperaturas actuales están estimulando el desarrollo vegetativo del cultivo en ciertos sectores, por lo que es clave asegurar una nutrición balanceada y un suministro de agua acorde a su desarrollo fenológico.

En la costa sur, las temperaturas diurnas y nocturnas reportaron un promedio de 30.6°C y 20.8°C respectivamente. Además, se presentaron condiciones diurnas y nocturnas ligeramente cálidas. Se registró un acumulado de lluvias de 5.3 mm durante los últimos diez días, siendo superior a sus normales.

En el gráfico N° 1 y 2 se observan las anomalías de temperatura diurna y nocturna en la franja costera como referencia de las localidades donde se encuentra el cultivo de arándanos.

