

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO


CULTIVO DE ARÁNDANO



Pronóstico Agrometeorológico

Del 12 al 21 de marzo de 2026

Para el cultivo de arándano que se encuentra en plena etapa de crecimiento vegetativo, y ante el [Aviso N.º 086](#) que anuncia lluvias en la costa norte a partir del sábado 14 de marzo, es clave ajustar la frecuencia de riego. Esta medida busca evitar la formación de microclimas húmedos que favorezcan la aparición de plagas y enfermedades, protegiendo así el normal desarrollo del cultivo.



Próxima Actualización: 25 de marzo de 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

1º Década de marzo de 2026 (01 al 10 de marzo)

En los campos monitoreados remotamente de Lambayeque (Cayaltí)¹ y La Libertad (Chao y San José), el cultivo de arándano se encuentra predominantemente en la fase fenológica de brotación vegetativa, caracterizada por la emisión activa de nuevos brotes y el desarrollo de tejido foliar.



Tener en cuenta

- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arándano observado al 10 de marzo del 2026, asimismo en el ámbito de las estaciones, las diferentes variedades de arándano pueden tener fases fenológicas distintas según el manejo agronómico que se le aplique y según los inicios de cada campaña

¹ Parcelas con monitoreo remoto.

Impactos del clima en el cultivo arándano



En la costa norte, las temperaturas diurnas promedio fueron de 32.3 °C y las nocturnas llegaron a 22.9 °C. Las condiciones térmicas diurnas fueron entorno a sus valores normales y nocturnas ligeramente cálidas. Además, se registraron lluvias durante los últimos diez días de 40.1 mm, siendo superior a sus valores habituales. Durante la brotación del arándano, la planta presenta una alta actividad de crecimiento, emitiendo nuevos brotes y hojas. En esta etapa, es clave garantizar gestionar un adecuado suministro de agua para cubrir sus necesidades hídricas, así como intensificar el monitoreo para aplicar controles oportunos, ya que las temperaturas cálidas crean condiciones ambientales favorables para el incremento de plagas.

La costa central presentó temperaturas diurnas promedio de 30°C, mientras que las nocturnas registraron 20 °C. Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron ligeramente cálidas. Se reportaron precipitaciones de 0.1 mm durante los últimos diez días. El aumento de las temperaturas también impulsa el incremento poblacional de plagas asociadas al cultivo, por lo que se debe reforzar el monitoreo fitosanitario y aplicar controles tempranos de manera preventiva.

En el gráfico N° 1 y 2 se observan las anomalías de temperatura diurna y nocturna en la franja costera como referencia de las localidades donde se encuentra el cultivo de arándanos.

