

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO

CULTIVO DE ARÁNDANO


VOL III
EDICIÓN VIII



Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 de marzo al 02 de abril de 2026

De acuerdo al [Aviso N° 109](#), del jueves 26 al sábado 28 de marzo se prevé incremento de la temperatura diurna en la costa norte (31 °C a 37 °C). Estas condiciones térmicas diurnas cálidas incidirían en los campos de arándano en brotación vegetativa ubicados en Lambayeque (Cayaltí) y La Libertad (Chao y San José), al incrementar la demanda hídrica del cultivo, por lo que se recomienda gestionar adecuadamente el riego para satisfacer sus necesidades durante esta fase fenológica. Además, las temperaturas previstas crean un ambiente propicio para el aumento poblacional de plagas asociadas al cultivo, razón por la cual resulta necesario intensificar el monitoreo fitosanitario y realizar controles oportunos en los campos.



Próxima Actualización: 07 de abril de 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

2º Década de marzo de 2026 (11 al 20 de marzo)

En los campos monitoreados remotamente, el cultivo de arándano se encuentra predominantemente en la fase fenológica de brotación vegetativa. Esta condición se observa en Lambayeque (Cayaltí)¹ y La Libertad (Chao y San José).



Tener en cuenta

- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de arándano observado al 20 de marzo del 2026, asimismo en el ámbito de las estaciones, las diferentes variedades de arándano pueden tener fases fenológicas distintas según el manejo agronómico que se le aplique y según los inicios de cada campaña

¹ Parcelas con monitoreo remoto.

Impactos del clima en el cultivo arándano



En la costa norte, se registraron temperaturas diurnas promedio de 32.9 °C y nocturnas de 23.2 °C, condiciones térmicas ligeramente cálidas que han predominado durante el periodo. En los últimos diez días se acumularon 9.7 mm de lluvia, valor superior al habitual para la zona. Si bien las precipitaciones disminuyeron respecto a la decadiaria anterior, las temperaturas se mantuvieron por encima de los valores normales.

En las áreas productoras de La Libertad y Lambayeque, donde el arándano se encuentra mayoritariamente en fase de brotación, se debe priorizar el suministro oportuno de las necesidades hídricas del cultivo para evitar déficits que afecten el desarrollo vegetativo. Asimismo, las condiciones térmicas cálidas generan un ambiente propicio para la proliferación de plagas, por lo que se recomienda intensificar el monitoreo fitosanitario y realizar controles oportunos que minimicen su impacto en el cultivo de arándano.

La costa central presentó temperaturas diurnas promedio de 29.9°C, mientras que las nocturnas registraron 20.2 °C. Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron ligeramente cálidas. Se reportaron precipitaciones de 0.3 mm durante los últimos diez días. Dado que las temperaturas cálidas se mantienen superior a sus valores habituales el crecimiento poblacional de las plagas asociadas al cultivo se acelera, por lo cual, se debe reforzar el monitoreo fitosanitario y ejecutar controles preventivos de manera oportuna.

En el gráfico N° 1 y 2 se observan las anomalías de temperatura diurna y nocturna en la franja costera como referencia de las localidades donde se encuentra el cultivo de arándanos.

