

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO MENSUAL

DZ 7



**Julio
2025**



**Foto: Floración de la papa
CO-CARUMAS**

VOL. 11 N° 07

Presentación

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú- SENAMHI, mediante la Dirección de Agrometeorología, ostenta un sistema de monitoreo agrometeorológico y fenológico en las principales zonas productoras, donde existe una red de estaciones meteorológicas convencionales que intervienen en el desarrollo de la agricultura sostenible, generando información sobre la influencia que ejercen los factores climáticos en la producción de los cultivos, permitiendo una gestión más eficiente de la actividad agrícola.



DZ 7 TACNA

La Dirección Zonal 07 del SENAMHI realiza el análisis climático mensual, las condiciones actuales de disponibilidad hídrica en el suelo y recomendaciones para el sector.

TOMA EN CUENTA

VARIABLES AGROCLIMÁTICAS:

Valores que sirven para cuantificar algún tipo de relación que mantienen el crecimiento, el desarrollo y la productividad de los cultivos con las condiciones meteorológicas, entre las variables están la temperatura máxima, mínima, precipitación, humedad relativa, horas de sol, vientos, entre otras.

REQUERIMIENTO TÉRMICO:

Es el tiempo térmico o suma de calor y las unidades térmicas son grados/día (°Cd). que induce el desarrollo de la planta.

ÍNDICES DE HUMEDAD:

Índice de humedad del suelo (Ih): es la demanda hídrica del ambiente, el índice de humedad es un indicador expresivo de las relaciones que existen entre la precipitación y la evapotranspiración potencial, como expresión de la demanda de agua ejercida por el medio.

FENOLOGÍA:

Es la ciencia que estudia la relación de los factores climáticos y los seres vivos. Trata de relacionar los diferentes estados de crecimiento, desarrollo y reproductivo de los seres vivos con las condiciones meteorológicas.

EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS:

Son eventos inusuales e impropios de una zona. Son aquellos eventos extremos de temperaturas máximas (olas de calor), temperaturas mínimas (heladas), precipitaciones (granizada), ráfagas de vientos, etc. que inciden en el desarrollo de las diferentes fases fenológicas del cultivo, lo que puede determinar una buena producción, el buen rendimiento o una pérdida total.

SUSCRIBETE AL BOLETÍN AGROCLIMÁTICO:

<http://senamhi.gob.pe>

La tabla N° 1, muestra el promedio mensual de las variables agrometeorológicas de julio del 2025 de los departamentos de Tacna y Moquegua. La temperatura máxima presentó un promedio de 20,4 °C. y una anomalía positiva de +1,4 °C. mientras la temperatura mínima registró una media de 4,8 °C. con una anomalía positiva de +1,1 °C.; asimismo se registró una precipitación deficitaria con una anomalía negativa de -99,4 %. Ver mapas 1 y 2.


TABLA N° 1

RESUMEN DE TEMPERATURAS DEL AIRE, PRECIPITACION Y SUS ANOMALIAS PARA EL MES DE JULIO 2025.

ZONA GEOGRAFICA	ESTACION	TEMPERATURA MAXIMA (°C)		TEMPERATURA MINIMA (°C)		PRECIPITACION (mm)	
		Valor	Anomalía (°C)	Valor	Anomalía (°C)	Valor	Anomalía (%)
TACNA COSTA	CP-La Yarada	20.0	0.2	13.7	0.0	T	-100.0
	CO-Ite	19.3	1.2	13.6	0.4	T	-100.0
	MAP Basadre	19.2	0.2	11.0	0.6	0.6	-84.6
	CO-Calana	22.6	2.7	7.2	-0.3	0.0	-100.0
TACNA SIERRA	CO-Calientes	24.0	2.1	9.7	1.3	0.0	-100.0
	CO-Ilabaya	27.0	2.2	13.2	4.1	0.0	-100.0
	CO-Tarata	22.1	1.8	2.6	0.9	0.0	-100.0
	CO-Susapaya	17.3	0.4	4.8	2.5	0.0	-100.0
	CO-Candarave	17.5	1.8	3.8	2.8	0.0	-100.0
	CO-Talabaya	20.0	3.1	2.7	3.0	0.0	-100.0
	CO-Cairani	16.2	0.1	2.9	1.3	0.0	-100.0
TACNA SIERRA ALTA	CO-Vilacota	11.9	1.1	-10.2	3.3	0.0	-100.0
	CO-Paucarani	11.3	0.4	-8.4	-1.0	0.0	-100.0
	CO-Chuapalca	15.3	1.9	-13.7	-0.1	0.0	-100.0
	CO-Bocatoma	15.1	1.9	-10.7	-1.3	0.0	-100.0
	CO-Frontera	17.2	1.9	-8.7	1.3	0.0	-100.0
MOQUEGUA COSTA	CO-Punta Coles	19.1	0.3	14.9	0.0	0.0	-100.0
	CO-Ilo	22.0	0.7	14.1	1.4	0.0	-100.0
MOQUEGUA SIERRA	CP-Moquegua	28.0	1.5	11.6	2.1	0.0	-100.0
	CO-Yacango	24.9	1.9	10.6	0.4	0.0	-100.0
	CO-Quinistaquillas	29.6	1.3	10.5	1.3	0.0	-100.0
	CO-Omate	26.4	1.6	3.1	-3.3	0.0	-100.0
	CO-Puquina	21.6	1.7	9.4	1.6	0.0	-100.0
	CO-Carumas	20.8	0.9	6.4	3.4	0.0	-100.0


MAPA N° 1

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA JULIO 2025.



MAPA N° 2

TEMPERATURA MINIMA MEDIA JULIO 2025.



SINTESIS

Durante el mes de julio del 2025, se realizó el seguimiento fenológico de los principales cultivos de importancia de los departamentos de Tacna y Moquegua como el olivo, orégano, maíz y papa.

En las zonas alto andinas productoras de maíz de la región, se encuentra en la fase fenológica de maduración pastosa (Puquina) en buen estado, por la presencia de las temperaturas extremas con anomalías positivas, favoreciendo la maduración de los granos del cultivo.

El cultivo de la papa en las zonas altas continuó con la fase fenológica de maduración (Campaña chica) en buen estado por la presencia de las temperaturas extremas con anomalías positivas y se realizó la cosecha con un rendimiento normal de 6400 kg/ha. mientras en la sierra baja presentó la fase fenológica de floración en buen estado por la presencia de las temperaturas extremas con anomalías positivas. El cultivo semipereenne del orégano registró las fases fenológicas de botón floral y crecimiento vegetativo en buen estado, debido a la presencia de las temperaturas extremas sobre sus valores históricos, favoreciendo el desarrollo reproductivo del cultivo.

El cultivo del olivo continuó con la fase fenológica de maduración completa en buen estado (La Yarada), por la presencia de las temperaturas extremas ligeramente sobre sus valores normales y dentro del rango térmico óptimo, favoreciendo la maduración del fruto del olivo. Se realizó la segunda cosecha con un rendimiento sobre lo normal de 808 kg/ha.




FOTO N°01

Cultivo del olivo en la fase fenológica de maduración completa (Distrito de La Yarada Los Palos-Tacna).

MAPA N° 3

Red de estaciones meteorológicas e hidrológicas convencionales y automáticas de Tacna y Moquegua (Dirección Zonal 7).



La red de estaciones meteorológicas e hidrológicas convencionales y automáticas de la Dirección Zonal 7, dispone de 64 estaciones hidrometeorológicas.

En el departamento de Moquegua mediante la alianza estratégica con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto se logró la implementación de la oficina de enlace de SENAMHI Moquegua, con la finalidad que la información hidrometeorológica esté más cerca de los tomadores de decisiones de la región.

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS

Cultivo de maíz variedad Amiláceo.

FIGURA N° 1

Estación CO-Puquina.

Durante el mes de julio del 2025, en las zonas alto andinas del departamento de Moquegua, provincia de General Sanchez Cerro y distrito de Puquina, el cultivo del maíz (sembrío tardío) presentó la fase fenológica de maduración pastosa al 100 %, en buen estado.

Durante el mes de julio del 2025 presentó las temperaturas extremas sobre sus valores normales y dentro del rango térmico óptimo favoreciendo la maduración de los granos del cultivo. La precipitación deficitaria no afecto con el aporte hídrico para el cultivo, por los riegos realizado en forma oportuna

En las zonas altas del departamento de Tacna, Provincia de Tarata y distrito de Tarata el cultivo del maíz presentó en terrenos en descanso.




FIGURA N° 2

Estación CO-Puquina: Comportamiento Pluviométrico.




TABLA N° 2

Estación CO-Puquina: Comportamiento termopluviométrico.

Variables Agroclimáticas	Diciembre 2024			Enero 2025			Febrero 2025			Marzo 2025			Abril 2025			Mayo 2025			Junio 2025			Julio 2025		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Tª máxima (°C)	23.2	23.6	23.2	19.4	21.5	20.1	22.3	16.1	20.3	17.4	20.7	21.6	20.9	21.6	20.6	21.9	21.6	21.8	21.4	20.0	19.3	21.7	22.0	21.1
Normal Tª máxima (°C)	22.3	22.3	21.7	21.0	20.2	20.5	20.1	19.1	18.6	19.9	19.3	20.7	20.7	20.8	21.0	20.9	20.7	20.1	20.3	19.9	20.5	19.7	19.4	20.0
Anomalia Tª máxima (°C)	0.9	1.3	1.5	-1.6	1.3	-0.4	2.2	-3.0	1.7	-2.5	1.4	0.9	0.2	0.8	-0.4	1.0	0.9	1.7	1.1	0.1	-1.2	2.0	2.6	1.1
Tª mínima (°C)	8.3	8.3	7.7	8.5	7.3	8.5	9.2	8.2	9.3	8.0	9.1	9.4	9.3	8.9	8.1	9.6	9.7	9.8	7.9	7.7	7.4	9.4	9.8	8.9
Normal Tª mínima (°C)	7.5	7.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.5	8.2	8.0	8.5	8.2	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	7.7	8.1	7.9	8.3	7.7	7.2	7.6
Anomalia Tª mínima (°C)	0.8	0.6	-0.3	0.5	-0.7	0.4	0.7	0.0	1.3	-0.5	0.9	1.0	0.8	0.5	-0.3	1.2	1.2	2.1	-0.2	-0.2	-0.9	1.7	2.6	1.3
Precipitación Acumulada (pp)	0.4	0.0	0.0	45.0	12.4	19.0	23.9	136.4	10.9	58.1	0.2	1.3	3.2	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Anomalia pp (%)	-20%	-100%	-100%	153%	-58%	-23%	-36%	334%	-52%	169%	-99%	-86%	60%	-100%	400%	0%	-100%	0%	-100%	0%	-100%	-100%	-100%	-100%

FIGURA N° 3

Estación CO-Puquina: Duración de las fase fenológicas: Maíz Amiláceo.



Estados fenológicos	Emergencia	Desarrollo de hojas					Panoja	Espiga	Maduración lechosa	Maduración pastosa	Maduración córnea
Fecha de monitoreo	23-Ene	7-Feb	17-Feb	4-Mar	28-Mar	1-Abr	11-Abr	21-Abr	9-Jun	5-Jul	
Días después de la siembra	9	24	34	49	73	77	87	97	146	172	

IMPACTOS EN LOS CULTIVOS

Cultivo de papa variedad Unica .

FIGURA N° 4

Estación CO-Carumas.

Durante el mes de julio del 2025, en los valle interandinos del departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y distrito de Carumas, el cultivo de la papa presentó la fase la fase de maduración al 100 %, en buen estado (campaña chica). Se registraron las temperaturas extremas con anomalías positivas, favoreciendo el desarrollo de los tubérculos del cultivo de la papa.

Se realizó la cosecha con un rendimiento normal de 6400 kg/ha.

En las zonas altas del departamento de Tacna, Provincia de Candarave y distrito de Cairani el cultivo de la papa, se encuentra en terrenos en descanso.

En la sierra baja del departamento de Tacna, Provincia de Tacna, distrito de Pachía y anexo de Calientes el cultivo de la papa, se encuentra en la fase fenológica de floración en buen estado por la presencia de las temperaturas extremas con anomalías positivas.




FIGURA N° 5

Estación CO-Carumas: Comportamiento Pluviométrico.





TABLA N° 3

Estación CO-Carumas: Comportamiento termoplumiométrico.

Variable	Agosto 2024			Septiembre 2024			Octubre 2024			Noviembre 2024			Diciembre 2024			Enero 2025			Febrero 2025			Marzo 2025			Abril 2025			Mayo 2025			Junio 2025			Julio 2025		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Promedio (°C)	20.6	20.6	20.6	21.1	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2	20.6	21.2	21.2			
Temperatura mínima (°C)	16.2	16.6	16.6	16.7	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6			
Temperatura máxima (°C)	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4			
Promedio (°C)	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24			
Temperatura mínima (°C)	4.3	5.0	4.7	4.4	4.8	5.0	5.4	5.7	6.1	5.8	5.6	5.9	6.0	6.1	5.9	6.0	6.2	6.6	6.2	6.6	6.2	6.6	6.2	6.6	6.2	6.6	6.2	6.6	6.2	6.6	6.2	6.6	6.2			
Temperatura máxima (°C)	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5			
Precipitación (mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Humedad (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

FIGURA N° 6

Estación CO-Carumas: Duración de las fase fenológicas: Papa Unica.



IMPACTOS EN LOS CULTIVOS

Cultivo de orégano variedad Nigra Coposo y Ralo.

Durante el mes de julio del 2025, en las zonas altas del departamento de Tacna, Provincia de Candarave y Distrito de Cairani, el cultivo del orégano continuó con la fase de crecimiento vegetativo en buen estado. Se registró la temperatura mínima con una anomalía positiva y sobre su rango crítico mínimo favoreciendo el crecimiento vegetativo del orégano.

En el departamento de Tacna, provincia de Tarata y el distrito de Estique, el cultivo del orégano presentó la fase fenológica de botón floral en buen estado, debido a la presencia de las temperaturas extremas sobre sus valores históricos.

En las partes altas de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto y distrito de Carumas, el cultivo del orégano continuó con la fase fenológica de brotación al 100 %, en buen estado, por la presencia de las temperaturas extremas con anomalías positivas.

FIGURA N° 7
Estación CO-Cairani.




FIGURA N° 8
Estación CO-Cairani: Comportamiento Pluviométrico.





TABLA N° 4
Estación CO-Cairani: Comportamiento termopluviométrico.

Variables Agroclimáticas	Abril 2025			Mayo 2025			Junio 2025			Julio 2025		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Tª máxima (°C)	15.5	16.2	15.2	16.2	17.2	16.5	15.8	14.8	14.6	16.6	16.4	15.7
Normal Tª máxima (°C)	16.9	17.2	16.9	17.2	17.2	17.0	16.9	17.0	17.0	16.8	16.4	16.4
Anomalia Tª máxima (°C)	-1.4	-1.0	-1.7	-1.0	0.0	-0.5	-1.1	-2.2	-2.4	0.2	0.0	-0.7
Tª mínima (°C)	5.0	3.8	2.8	5.0	4.0	3.5	2.7	2.6	2.3	2.7	2.9	3.0
Normal Tª mínima (°C)	3.6	3.3	2.9	3.1	3.3	2.1	1.9	1.4	1.5	1.5	0.9	0.9
Anomalia Tª mínima (°C)	1.4	0.5	-0.1	1.9	0.7	1.4	0.8	1.2	0.8	1.2	2.0	2.1
Precipitación Acumulada (pp)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
Anomalia pp (%)	60%	-100%	0%	0%	-100%	0%	-100%	0%	-100%	-100%	0%	0%

FIGURA N° 9
Estación CO-Cairani: Duración de las fase fenológicas: Orégano Nigra ralo.



IMPACTOS EN LOS CULTIVOS

Cultivo de olivo variedad Sevillana

Durante el mes de julio del 2025 el cultivo del olivo en el departamento de Tacna, provincia de Tacna y distrito La Yarada Los Palos, presentó la fase fenológica de maduración completa final 60 % en buen estado, debido a la presencia de las temperaturas extremas sobre sus valores normales y dentro del rango térmico óptimo, favoreciendo la maduración del fruto del cultivo. La precipitación deficitaria no afectó con el aporte hídrico por los riegos realizados con más frecuencia y en forma oportuna. Presencia de vientos fuertes provocaron caídas del frutos afectando un 2%.

La temperatura máxima con anomalía positiva favoreció la presencia de las plagas: *Orthesia olivicola* manteniendo en un 10 % de daños a las hojas.

En el valle de Ilo (El Algarrobal), el cultivo del olivo mostró la fase fenológica de aparición de racimos florales inicio al 20% en buen estado por la presencia de las temperaturas extremas sobre sus valores normales y dentro del rango térmico óptimo.

FIGURA N° 10

Estación CP-La Yarada.




FIGURA N° 11

Estación CP-La Yarada: Comportamiento Pluviométrico..





TABLA N° 5

Estación CP-La Yarada. Comportamiento termopluiométrico.

Temperatura	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025
T ^{máx} (°C)	16.5	16.2	16.9	16.7	16.8	17.1	16.9	17.2	17.1	17.3	17.4	17.5
T ^{mín} (°C)	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2
T ^{máx} (°C)	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2
T ^{mín} (°C)	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2
Precipitación (mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Humedad (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

FIGURA N° 12

Estación CP-La Yarada: Duración de las fase fenológicas del olivo: Sevillana.



TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA

MAPA N° 4

Cultivo de Maíz Amiláceo.

Cultivo del Maíz Amiláceo y Opaco mal paso:

Las condiciones ambientales en las zonas altas para el trimestre agosto - octubre del 2025, se pronostica temperaturas extremas con anomalías positivas acompañada de precipitaciones normales, favorecerán la maduración de los granos del maíz amiláceo, que se encuentra en maduración pastosa (sembríos tardíos).

En las zonas costeras, la presencia de las temperaturas extremas alrededor de sus valores normales favorecerán la siembra de la segunda campaña del año 2025 del maíz forrajero.

Cultivo de Papa Imilla y Unica

Cultivo de la Papa Imilla y Unica :


En las zonas altas, las temperaturas extremas sobre sus valores normales favorecerán el inicio de la campaña 2025-2026 del cultivo de la papa que se encuentra en terrenos en descanso.

En la sierra baja las temperaturas extremas con anomalías positivas favorecerán el desarrollo reproductivo del cultivo de la papa, que se encuentra en la fase fenológica de floración.


Cultivo del Olivo Sevillana

Cultivo del Olivo:

En las zonas costeras la presencia de las temperaturas extremas alrededor de sus valores normales favorecerán la maduración de los frutos del olivo que se encuentra en la fase de maduración completa.



MAPA N° 5




TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA

MAPA N° 6

Cultivo del Orégano Nigra Ralo

Cultivo del Orégano:

En las zonas altas la presencia de las temperaturas extremas sobre sus valores normales favorecerán el crecimiento vegetativo del cultivo del orégano que se encuentra en la fase de brotación (Cairani).




EVENTOS AGROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS.

Durante el mes de julio del 2025, se registró una precipitación deficitarias con una anomalía de -99,4 %, afectando las necesidades hídricas de los cultivos. La frecuencia de las heladas aumentaron en la sierra alta, donde se presentaron todos los días en los anexos de Chuapalca, Vilacota y Paucarani. La temperatura extrema más baja se registro en el anexo de Chuapalca con un valor de -17,5 °C (10 de julio del 2025) . Ver mapas N° 7 y 8.


MAPA N° 7

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL JULIO 2025.



MAPA N° 8

FRECUENCIA DE HELADAS DE JULIO 2025.



Presidente Ejecutivo del SENAMHI
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI
Blga. Raquel Hilianova Soto Torres.
[Representante Permanente del Perú ante la Organización Meteorológica Mundial \(OMM\).](#)

Director de Agrometeorología:
Ing. Constantino Alarcón Velazco
calarcon@senamhi.gob.pe

Director Zonal 7
Ing. Eudalda Medina Chávez de del Carpio
emedina@senamhi.gob.pe

Análisis y Redacción:
Ing. Edgar José Janampa Pérez
Especialista Hidrometeorológico DZ 7
ejanampa@senamhi.gob.pe

Responsable SIG (DZ-7):
Ing. Edgar José Janampa Pérez

Colaboración
Ing. María Elena Legua Ramos
Asistente en Procesamiento de Datos
mlegua@senamhi.gob.pe

Próxima actualización: 10 de septiembre del 2025.



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Jr. Cahuide N° 785, Jesus María-Lima
Lima 11 - Perú

Dirección Zonal 7 - DZ 7
Calle 3 Lote 4 y 5 Para Grande Tacna

Central telefónica:
[51 1] 01-6141414

DZ 7
[51 1] 052-480071 Anrxo 301

Consultas y sugerencias:
email
ejanampa@senamhi.gob.pe